



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Haute-Ariege

Rédigé le dimanche 2 juin 2024 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

lundi 03 juin







Tendance pour le mardi 04 juin



risque limité

Maintien d'un risque d'avalanche en neige humide du fait de l'ensoleillement et d'une isotherme 0°C qui franchit les 3500m.

Risque faible évoluant en risque limité.

Départs spontanés : Avalanches de neige humide **Déclenchements skieurs :** En neige humide

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 3 juin 2024 au soir




Quelques départ de neige humide dans les pentes encore bien enneigées

DÉPARTS SPONTANÉS: La neige récente s'étant humidifiée des départs ponctuels spontanés en neige humide (coulées de neige récente, boulettes en pente raide) emportant toute la neige récente se déclenchent dans les pentes suffisamment raides voyant le soleil. Un départ spontané d'une avalanche de fond reste également possible emportant l'ensemble du manteau neigeux. L'ouverture de fissures doit alerter le randonneur. Dans ce cas une grande avalanche peut survenir dans les pentes raides Est à Nord où les cumuls de neige restent importants le plus souvent au dessus de 2500m d'altitude. Dans certaines configurations (pentes très raides, couloirs, etc.), ces avalanches pourront finir leur course nettement en-dessous de la limite d'enneigement.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: La présence de plaques de neige froide est peu probable même à haute altitude. Les éventuelles fines plaques formées par les chutes récentes de neige au-dessus de 2200/2400m se sont humidifiées et ont donc disparu. Un skieur ou un randonneur traversant une pente en neige très humide voire pourrie pourra cependant déclencher une coulée de surface.







Qualité de la neige

Quelques belles accumulations subsistent dans les thalwegs ou dans les vallons orientés Nord à Est. On peut chausser les skis dès 2100 à 2200m voire un peu plus bas dans les vallons traditionnellement froids et encaissés. A partir de 2300/2400m, l'enneigement augmente rapidement. Le manteau neigeux est de type printanier, humidifié sur une grande profondeur, tassé et dense, juste ressaisi au lever du jour. La neige de surface redeviendra rapidement très humide en journée de par la douceur et le soleil matinal.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Haute-Ariege

Rédigé le dimanche 2 juin 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	lun. 27/05				mar. 28/05				mer. 29/05				jeu. 30/05				ven. 31/05				sam. 01/06				dim. 02/06			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	4			2	*	<u></u>	42	-11	*	~]	<u> </u>	4	2	4	-	<u>*</u>		42		4	1	4	4	1	-11_	Ģ J	€	*
Vent (km/h)	35	40	35	30	30	35	40	35	40	45	40	40	50	60	60	50	40	30	30	30	25	25	45	45	35	25	25	25
à 3000m	→	*	→	2	24	4	24	24	4	2	4	2	24	2	24	24	7	4	→	→	Ľ	•	4	2	24	24	2	•
Vent (km/h)	25	25	25	20	20	20	25	25	30	35	30	30	35	40	40	35	30	20	20	20	15	15	25	30	25	20	15	15
à 2000m	→	→	>	1	4	4	2	4	4	2	2	2	4	7	4	4	4	1	→	→	む	も	4	4	4	7	4	→

