



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Thabor

Rédigé le dimanche 24 mars 2024 à 15h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

lundi 25 mars







Tendance pour le mardi 26 mars



Risque en hausse, devenant marqué. Neige par régime de lombarde, nouvelles plaques.

Risque faible.

Départs spontanés: peu probables

Déclenchements skieurs : très rares plaques dures en versants froids de haute altitude.

indices de risque : 5 cres rorc - 4 rorc - 3 marque - 2 limice - 1 raible -- En noir : les pences les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 25 mars 2024 au soir





MANTEAU NEIGEUX BIEN STABLE, TRÈS RARES PLAQUES

DÉPARTS SPONTANÉS : Peu probables, le manteau neigeux est bien stabilisé. L'humidification lundi au soleil est superficielle et ne concerne que des pentes déjà entièrement humidifiées.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Très rares plaques dures en versants froids de haute altitude, plus haut que 2800 m environ. Généralement minces et peu étendues, elles sont présentes là où la neige est restée sèche, sous l'effet du vent fort d'ouest à nord. Elles sont plutôt facilement détectables, et difficilement déclenchables au passage d'un seul skieur.







Qualité de la neige

Avec la douceur prolongée les limites d'enneigement sont remontées et le manteau neigeux devient skiable à partir de 1600/1700 m en ubacs et 2200 en adrets. Au delà de 2200 l'enneigement reste très confortable et souvent excédentaire pour une fin mars.

A la nivôse des Rochilles, on mesure 1m06 de neige, dans la moyenne des 30 années de mesure pour un 24 mars. Manteau neigeux très dense, devenu printanier en orientations ensoleillées, resté sec au-dessus de 2700/2800 m en versants froids.

Lundi matin, excellent regel, puis à nouveau un peu d'humidification de surface au soleil en journée. Corniches encore en place en altitude.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Thabor

Rédigé le dimanche 24 mars 2024 à 15h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

| | lun. 18/03 | | | | mar. 19/03 | | | | mer. 20/03 | | | | jeu. 21/03 | | | | ven. 22/03 | | | | sam. 23/03 | | | | dim. 24/03 | | | |
|-------------|------------|----------|-----|--|------------|----------|-----|-----|------------|----------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|----------|------------|------------|-------------|-----|------------|-----|-----|----------|
| | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h |
| Météo | 4 | - | 4 | The state of the s | ¥ | | | | Ÿ | | <u>~</u>] | N | 4 | | 4 | 1 | Ÿ | 0 | | W | 1 | ~] | Ģ J | -11 | 7 | - | 4 | N. |
| Vent (km/h) | 45 | 45 | 40 | 30 | 35 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 65 | 65 | 55 | 50 | 50 | 50 | 45 |
| à 3000m | 2 | → | 24 | 2 | 24 | → | 7 | Ľ | Ψ | 1 | 7 | 2 | → | 24 | 7 | • | • | ひ | 24 | → | * | → | > | 24 | 4 | 2 | 2 | M |
| Vent (km/h) | 15 | 10 | 25 | 15 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 50 | 55 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 |
| à 2000m | 7 | * | 4 | • | 4 | + | 7 | * | • | ^ | K | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | * | K | 7 | + | K | Z | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | M |

