



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le lundi 18 mars 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr



Estimation des risques

mardi 19 mars







Tendance pour le mercredi 20 mars



risque limité

Maintien d'un risque limité avec la poursuite de la douceur.

Au-dessus de 2200m risque limité, plus bas risque faible.

Départs spontanés: en neige humide.

Déclenchements skieurs: plaques minces en altitude.

Indices de risque: 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir: les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au mardi 19 mars 2024 au soir







ACTIVITÉ NATURELLE EN NEIGE HUMIDE, PLAQUES MINCES EN ALTITUDE

DÉPARTS SPONTANÉS : peu d'activité naturelle le matin. Dès la fin de matinée, quelques avalanches de neige humide, plus nombreuses dans les orientations bien ensoleillées, mais également possibles dans les versants nord-ouest à nord-est jusqu'à 2400/2500 m environ. Départs ponctuels généralement près des rochers en pentes raides, de taille petite à moyenne (taille 1 à 2). Par ailleurs, des avalanches de fonds sont possibles à toute heure de la journée et en cas de présence de reptations.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: des plaques ont pu se former au-dessus de 2400/2500 m avec les faibles chutes de neige ventées lundi matin. Elles sont localisées plutôt dans un large versant nord (ouest à est), généralement minces et peu étendues, mais tout de même facilement déclenchables par un skieur. Elles s'ajoutent aux rares plaques superficielles situées près des crêtes au-dessus de 2500 m et formées par le vent de nord-ouest modéré samedi. De plus, des plaques plus anciennes peuvent persister en versants ombragés d'un large secteur nord d'altitude. Même si elles sont maintenant difficilement sollicitables, elles peuvent mobiliser d'importants volumes de neige dans les zones d'accumulations. Par ailleurs, possibles départs de neige humide sous les skis en cours de journée, généralement de petite taille.







Qualité de la neige

L'enneigement est excédentaire à très excédentaire en haute altitude pour une mi-mars, dans les normales à plus basses altitudes. À la nivôse d'Orcières à 2300 m, on relève 1m78.

On peut chausser les skis vers 1500/1700 m selon les secteurs, mais il y a peu de sous-couche sous 1800 m environ.

Mardi matin, on peut trouver quelques cm de neige fraîche tombés lundi matin au-dessus de 2300/2500 m, alors que la pluie a humidifié le manteau neigeux plus bas. La neige peut encore être localement sèche et poudreuse en versants nord de haute altitude et abrités du vent. Plus bas et en versants bien ensoleillés, manteau neigeux en cycle printanier, humidifié plus ou moins en profondeur. Humidification superficielle en nord jusqu'à 2300/2500 m environ. Faible regel nocturne avec la douceur et le ciel voilé, et reprise de l'humidification en journée.

Attention aux corniches parfois grosses en altitude.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le lundi 18 mars 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	mar. 12/03				mer. 13/03				jeu. 14/03				ven. 15/03				sam. 16/03				dim. 17/03				lun. 18/03			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	*	(4)	₽	W	P	0	<u> </u>	J.	W	4		P	P	4	S	쇌	4	4	4	P	7	√	4	4	4	*	Ģ ³	A.
Vent (km/h)	40	35	30	30	45	25	20	15	10	10	15	20	20	20	20	30	30	40	35	15	20	30	35	30	35	50	40	30
à 3000m	•	4	24	•	•	•	•	•	24	→	→	24	→	24	24	4	2	7	2	•	4	→	→	→	24	→	•	•
Vent (km/h)	20	20	15	10	15	10	10	10	5	5	5	5	5	5	10	15	15	20	15	5	5	0	5	0	15	15	20	10
à 2000m	4	4	7	7	•	7	7	+	↑	K	K	↑	4	>	→	4	7	2	2	•	•	K	→	Ľ	2	7	7	•

