GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

lunes, 2 de marzo de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del martes, día 3 de marzo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Deslizamientos basales

Nieve húmeda

Placas de viento

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	2 / 2 / Limitado	Deslizamientos basales: 2 (N, O, E, S) — 2026-03-02 Nieve húmeda: 1 (N, O, E, S)	Cota más baja caras N
Ribagorzana - Vall Fosca	2 / 1→2 Por la mañana / Limitado	Deslizamientos basales: 2 (N, O, E, S) — 2026-03-02 Nieve húmeda: 1 (N, O, E, S)	Cota más baja caras N
Pallaresa	2 / 1→2 Por la mañana / Limitado	Deslizamientos basales: 2 (N, O, E, S) — 2026-03-02 Nieve húmeda: 1 (N, O, E, S)	Cota más baja caras N

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	1 **Débil**	1	**Nieve húmeda**	2026-03-02
Ter - Freser	2 **Limitado**	1 → 2 Por la mañana	**Deslizamientos basales** **Placas de viento**	2026-03-02
Vertiente norte Cadí - Moixeró	1 **Débil**	1	**Nieve húmeda**	2026-03-02
Prepirineo	1 **Débil**	1	**Nieve húmeda**	2026-03-02



Estado del manto y observaciones recientes

En la red de observación hoy se han vuelto a registrar ligeras pérdidas de espesor, en torno a 2-3 cm. Aún con todo, los espesores se encuentran por encima de lo que sería habitual a estas alturas de la temporada. En máximos en todos los sectores excepto en el Arán y la Ribagorzana.

Por encima de unos 2200 metros se superan los 150-200 cm en muchas zonas, aún más en ventisqueros, hoyas y otras zonas propensas a la acumulación.

En cotas medias y bajas, así como en solanas a mayor altitud, el manto se ha humidificado en profundidad y, por lo general, amanece encostrado. El calentamiento diurno y la intensa radiación van ablandando las costras durante la mañana en las solanas, sometiéndose a un ciclo de rehielo-fusión diario, siendo menos efectivo en umbrías de cotas medias. En umbrías de cotas altas, la nieve se mantiene más seca y aún podemos encontrar placas de viento que no se hayan estabilizado por completo. También en estas zonas podría persistir alguna capa débil enterrada que pueda seguir latente.

Evolución del manto y peligro de aludes para el martes, día 3

Problema de deslizamientos basales y nieve húmeda. Problema de placas de viento en cotas altas.

Tras el ciclo de deslizamientos basales de la semana pasada, estos volverán a reactivarse progresivamente. Son más probables a partir de mediodía, mientras que por la mañana, el manto quizá se presente rehelado. Serán de tamaño 2, mediano, suficiente para enterrar a

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

una persona, puntualmente mayor. Se desprenden de terreno soleado, de fuerte pendiente, liso y herboso o rocoso, y al pie de paredes rocosas. Se debe evitar el terreno bajo grietas, que pueden indicar condiciones de deslizamiento del manto sobre el suelo.

Mañana martes podrán caer algunos chubascos de nieve por encima de 1700-1900 m, con vientos del sur y este, con lo que se podrían formar algunas placas de viento. Así, en cotas altas podría caer algún alud de placa de viento, de tamaño 1, pequeño, sin capacidad de enterrar a una persona, pero sí de hacernos perder el equilibrio. Por debajo de 2000 m podría caer algún alud de nieve húmeda de tamaño también pequeño.

Predicción meteorológica para el martes, día 3

Intervalos nubosos o nuboso. Calima.
Probables precipitaciones débiles y ocasionales, que podrían ser en forma de chubascos y venir acompañadas de barro. Cota de nieve en torno a 1700-1900 metros.
Temperaturas mínimas en ascenso. Máximas sin apenas cambios. Heladas débiles en cotas altas, localmente moderadas en cumbres.
Viento de componentes este y sur, generalmente flojo.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 2500 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 3900 m

Viento a 1500 m: S 10 km/h
Viento a 3000 m: S 20 km/h

Evolución para el miércoles día 4

Nivel de peligro en ligero ascenso.

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.