






Matin



Après-midi



Degré de danger 2 - Limité




Tendance: danger d'avalanche constant →

le Samedi 02 05 2026



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



Neige mouillée à surveiller.

Avec le réchauffement le danger d'avalanches augmente progressivement en cours de journée. Les avalanches humides peuvent se déclencher spontanément sur les pentes très raides et atteindre une taille moyenne de manière isolée.

Des accumulations de neige soufflée se sont formées avec la neige fraîche et le vent dans les derniers jours à haute altitude et en haute montagne. Quelques endroits dangereux se situent sur les pentes très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2600 m.

Des avalanches peuvent être déclenchées avec en général une surcharge importante et atteindre une taille moyenne.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

En dessous d'environ 2500 m il y a peu de neige. Les conditions météorologiques printanières entraînent une humidification rapide du manteau neigeux. La surface de la neige regèle à peine et se ramollit rapidement.



Sur les pentes raides exposées au nord-ouest, au nord et au nord-est au-dessus d'environ 2500 m: Dans la partie inférieure du manteau neigeux ancien des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes.

Tendance


Le danger d'avalanches subsiste.



Degré de danger 2 - Limité



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



Le danger d'avalanches de neige mouillée et de glissement augmente en cours de journée et atteint le degré 2, "limité".

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Le manteau neigeux est humide, avec une croûte de regel souvent porteuse à la surface. La surface de la neige se ramollit en cours de journée. Le soleil et la chaleur entraînent en cours de journée à toutes les expositions par endroits une perte de solidité au sein du manteau neigeux. Ceci surtout sur les pentes raides ensoleillées à haute altitude et en haute montagne.



Degré de danger 2 - Limité



AM:



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Samedi 02 05 2026

PM:




Tendance: danger d'avalanche constant →

le Samedi 02 05 2026



Avalanches mouillées
(Neige humide)



Le danger d'avalanches humides et mouillées augmente en cours de journée.

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait être étudié avec une attention particulière sur le terrain.

La surface de la neige est gelée et porteuse se ramollit en cours de journée. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches augmente progressivement en cours de journée. Des avalanches et coulées mouillées sont possibles, également de taille moyenne. Ceci surtout sur les pentes très raides ensoleillées en haute montagne.

A côté du danger d'ensevelissement, il faut aussi penser au danger d'être emporté et de chuter. Les randonnées devraient être commencées et terminées tôt.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Dans les derniers deux jours il est tombé au-dessus d'environ 2800 m 5 cm de neige, localement jusqu'à 15 cm. Au-dessus d'environ 3300 m, sur les pentes à l'ombre: Le manteau neigeux est sec, avec une surface constituée de neige meuble, qui repose sur une croûte souvent porteuse. Ceci surtout le matin. En dessous d'environ 2800 m: Le manteau neigeux est assez homogène, avec une croûte de regel à la surface. Ceci surtout après une nuit claire.

Le soleil et la chaleur entraînent en cours de journée une humidification croissante du manteau neigeux.



Surtout sur les pentes raides ensoleillées en dessous d'environ 2500 m il n'y a que peu de neige.




Degré de danger 2 - Limité

AM:



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Samedi 02 05 2026



Neige
ancienne
(Sous-couche
fragile
persistante)



2800m




Avalanches
mouillées
(Neige
humide)




2500m

PM:



Tendance: danger d'avalanche constant →


le Samedi 02 05 2026



Neige
ancienne
(Sous-couche
fragile
persistante)



2800m



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



2500m

Il est tombé localement au-dessus d'environ 2600 m de 5 à 15 cm de neige. La surface de la neige n'est gelée et porteuse qu'à haute altitude et se ramollit en cours de journée. Dans la partie inférieure du manteau neigeux des couches fragiles isolées susceptibles d'être déclenchées sont présentes sur les pentes à l'ombre.

Les endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent sur les pentes raides à l'ombre au-dessus d'environ 2800 m.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire la probabilité de déclenchement d'avalanches



mouillées augmente surtout sur les pentes raides à l'ombre en dessous d'environ 2800 m.
Des avalanches de moyenne taille sont possibles.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.1: sous-couche fragile persistante

md.10: situation de printemps

La surface de la neige se ramollit en cours de journée.

Sur les pentes raides à l'ombre au-dessus d'environ 2800 m: Dans la partie inférieure du manteau neigeux ancien des couches fragiles isolées susceptibles d'être déclenchées sont présentes.

En dessous d'environ 2200 m il y a en général trop peu de neige pour les sports d'hiver.



Degré de danger 2 - Limité

AM:



Tendance: danger d'avalanche constant →


le Samedi 02 05 2026



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



PM:




2200m

Tendance: danger d'avalanche constant →


le Samedi 02 05 2026



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



Des avalanches humides et mouillées sont le danger principal.

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait être étudié avec une attention particulière sur le terrain.

Le mélange de pluie et de neige a entraîné à toutes les expositions en dessous d'environ 2800 m une humidification nette du manteau neigeux.

Jusqu'à la matinée il fait un temps partiellement nuageux. La surface de la neige ne regèle assez pour être porteuse qu'en haute altitude et se ramollit en cours de journée.

Le danger d'avalanches humides et mouillées augmente un peu en cours de journée. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire en cours de journée des avalanches et coulées mouillées sont toujours à attendre, également de taille moyenne, prudence surtout sur les pentes extrêmement raides exposées au nord en dessous d'environ 2900 m et sur les pentes très raides exposées à l'est, au sud et à l'ouest à haute altitude.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps



Il est tombé au-dessus d'environ 2800 m de 0 à 2 cm de neige. Il est tombé de la pluie jusqu'à 2800 m. La forte humidité de l'air entraîne généralement un tassement rapide du manteau neigeux.

Dans les derniers jours il faisait doux. Cette situation a entraîné en dessous d'environ 2900 m une humidification croissante du manteau neigeux.

Avec les fortes variations de température le manteau neigeux s'est solidifié. Ceci surtout sur les pentes raides ensoleillées à haute altitude et à toutes les expositions à moyenne altitude.

Presque plus d'avalanches ont été annoncées.

On trouve des hauteurs de neige très différentes à petite échelle.

Spécialement sur les pentes ensoleillées en dessous d'environ 2600 m il n'y a pas de neige. Sur les pentes à l'ombre sous la limite de la forêt il y a très peu de neige.

Dans la partie inférieure du manteau neigeux des couches fragiles isolées sont présentes, surtout en haute montagne.

Tendance

Il fait un temps généralement ensoleillé. La surface de la neige regèle et devient porteuse et se ramollit rapidement. Augmentation légère du danger d'avalanches humides avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.



Degré de danger 2 - Limité


AM:



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Samedi 02 05 2026

PM:



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Samedi 02 05 2026



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



Augmentation du danger d'avalanches mouillées en cours de journée.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente un peu en cours de journée. Des avalanches mouillées peuvent de manière isolée être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver, notamment sur les pentes très raides ensoleillées au-dessus d'environ 2500 m, ceci aussi sur les pentes très raides à l'ombre en dessous d'environ 2500 m dans les combes et couloirs. Des avalanches sont de manière isolée de taille moyenne.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent être déclenchées de manière isolée et généralement avec une surcharge importante, surtout sur les pentes très raides à l'ombre, surtout au-dessus d'environ 2500 m.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

md.1: sous-couche fragile persistante

Le rayonnement nocturne est généralement bon. La surface de la neige regèle et devient porteuse et se ramollit en cours de journée.

Sur les pentes à l'ombre au-dessus d'environ 2500 m: Dans la partie inférieure du manteau neigeux ancien des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes en altitude.

En dessous d'environ 2000 m il n'y a pas de neige. Entre environ 2000 et 2500 m on ne trouve plus que peu de neige, surtout sur les pentes très raides à l'ombre dans les combes et couloirs.


Tendance



Après une nuit claire, il règne le matin généralement des conditions favorables. Augmentation progressive du danger d'avalanches mouillées avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.




Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant →
le Samedi 02 05 2026



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



Attention à la neige mouillée et glissante.

Spécialement à haute altitude des avalanches de glissement et coulées mouillées de petite et rarement moyenne taille sont toujours possibles surtout à partir des zones de départ pas encore déchargées.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

En dessous d'environ 1800 m il n'y a que peu de neige. Dans les combes et couloirs à haute altitude on observe encore beaucoup de neige. Les conditions météorologiques printanières entraînent une humidification croissante du manteau neigeux.



Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Samedi 02 05 2026

Le manteau neigeux est généralement stable.

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait être étudié avec une attention particulière sur le terrain.

Aussi à haute altitude et en haute montagne: Avec les fortes variations de température le manteau neigeux s'est solidifié. Augmentation légère du danger de coulées humides et mouillées avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.

Les randonnées devraient être terminées à temps.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Le manteau neigeux est assez homogène, avec une croûte de regel porteuse à la surface. Ceci surtout le matin par nuit claire.

Le soleil et la chaleur entraînent en cours de journée surtout à moyenne et haute altitude une humidification croissante du manteau neigeux.

Sur les pentes raides ensoleillées en dessous d'environ 2500 m il n'y a que peu de neige.



Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant

le Samedi 02 05 2026



Il n'y a que peu de neige.

Des avalanches mouillées ne sont presque plus possibles. Prudence sur les pentes extrêmement raides à l'ombre. Des avalanches sont uniquement petites.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.3: pluie

md.10: situation de printemps

La surface de la neige est regelée sur une faible épaisseur et se ramollit rapidement.


On ne trouve plus que peu de neige.

Tendance

Danger d'avalanches faible.



Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant

le Samedi 02 05 2026



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire les endroits dangereux se multiplient en cours de journée.

Le danger d'avalanches mouillées augmente en cours de journée. Les endroits dangereux se situent surtout au pied des parois rocheuses, ainsi que dans les combes et couloirs. Des avalanches de neige mouillée et de glissement isolées sont possibles.

Manteau neigeux


Snow cover is absent or patchy in many areas, up to the highest altitudes on the southern slopes; in general, the snowpack is increasingly thinning. Le rayonnement nocturne est assez bon. Les conditions météorologiques entraînent en cours de journée une saturation d'eau croissante du manteau neigeux. Dans le manteau neigeux des couches fragiles très isolées sont présentes sur les pentes à l'ombre.

Tendance

Il fait un temps ensoleillé. Réchauffement continu.



Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant

le Samedi 02 05 2026



Danger d'avalanches faible.

Le danger d'avalanches humides et mouillées est présent dès le matin. À partir des zones de départ pas encore déchargées des avalanches mouillées isolées sont possibles, mais en général uniquement de petite taille.

Prudence sur les pentes extrêmement raides à l'ombre.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps


Au-dessus d'environ 2000 m il y a encore peu de neige. Ceci dans les combes et couloirs sur les pentes à l'ombre. Le rayonnement nocturne est généralement très peu présent. La surface de la neige se ramollit rapidement.

Tendance

Danger d'avalanches faible.



Degré de danger 1 - Faible




Tendance: danger d'avalanche constant →

le Samedi 02 05 2026



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



La surface de la neige ne regèle assez pour être porteuse qu'en haute altitude et se ramollit dès la matinée.

La surface de la neige regèle à peine et se ramollit en cours de journée.

Les avalanches sont de manière isolée petites.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Avec les températures douces le manteau neigeux s'est solidifié. Avec le réchauffement diurne le danger d'avalanches humides et mouillées augmente.

