GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

martes, 3 de marzo de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del miércoles, día 4 de marzo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Deslizamientos basales

Nieve húmeda

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	2 Limitado	**Deslizamientos basales** 2 N O E S **Nieve húmeda** 2200 1 N O E S	2026-03-03 N S Cota más baja caras N
Ribagorzana - Vall Fosca	2 Limitado	**Deslizamientos basales** 2 N O E S **Nieve húmeda** 2200 1 N O E S	2026-03-03 N S Cota más baja caras N
Pallaresa	2 Limitado	**Deslizamientos basales** 2 N O E S **Nieve húmeda** 2200 1 N O E S	2026-03-03 N S Cota más baja caras N

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	1 **Débil**	1	**Nieve húmeda** 2200 N O E S 1	2026-03-03 N S Cota más baja caras N
Ter - Freser	2 **Limitado**	2	**Deslizamientos basales** 2200 N O E S 2 **Nieve húmeda** 2200 N O E S 1	2026-03-03 N S Cota más baja caras N
Vertiente norte Cadí - Moixeró	1 **Débil**	1	**Nieve húmeda** 2200 N O E S 1	2026-03-03 N S Cota más baja caras N
Prepirineo	1 **Débil**	1	**Nieve húmeda** 2200 N O E S 1	2026-03-03 N S Cota más baja caras N

Estado del manto y observaciones recientes

En la red de observación hoy se han vuelto a registrar ligeras pérdidas de espesor, en torno a 2-4 cm. Aún con todo, los espesores se encuentran por encima de lo que sería habitual a estas alturas de la temporada. En máximos en todos los sectores excepto en el Arán y la Ribagorzana.
Por encima de unos 2200 metros se superan los 150-200 cm en muchas zonas, aún más en ventisqueros, hoyas y otras zonas propensas a la acumulación.
En cotas medias y bajas, así como en solanas a mayor altitud, el manto se ha humidificado en profundidad y, por lo general, amanece encostrado. Las costras se ablandan durante la mañana en las solanas, sometidas a un ciclo de rehielo-fusión diario, menos efectivo en umbrías de cotas medias. En umbrías de cotas altas, la nieve se mantiene más seca y aún podemos encontrar placas de viento que no se hayan estabilizado por completo. También en estas zonas podría persistir alguna capa débil enterrada que pueda seguir latente.

Evolución del manto y peligro de aludes para el miércoles, día 4

Problema de deslizamientos basales y nieve húmeda. Problema de placas de viento en cotas altas.

Los deslizamientos basales volverán a reactivarse progresivamente. Son más probables a partir de mediodía. Serán de tamaño 2, mediano, suficiente para enterrar a una persona, puntualmente mayor. Se desprenden de terreno soleado, de fuerte pendiente, liso y herboso o rocoso, y al pie de paredes rocosas. Se debe evitar el terreno bajo grietas, que pueden indicar

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

condiciones de deslizamiento del manto sobre el suelo.

Mañana miércoles podrán caer algunos chubascos de nieve por encima de 1900-2100 m, con vientos del sur y este, con lo que se podrían formar algunas placas de viento preferentemente en orientaciones norte. Así, en cotas altas podría caer algún alud de placa de viento, de tamaño 1, pequeño, sin capacidad de enterrar a una persona, pero sí de hacernos perder el equilibrio. Por debajo de 2200-2300 m podría caer algún alud de nieve húmeda de tamaño también pequeño.

Predicción meteorológica para el miércoles, día 4

Nuboso en los macizos orientales. En los occidentales, poco nuboso por la mañana aumentando a intervalos nubosos por la tarde. Calima.
No se descartan precipitaciones ocasionales por la tarde en los macizos occidentales. Se esperan generalmente débiles en el área oriental. Podrían ser en forma de chubascos y venir acompañadas de barro. Cota de nieve: 1900-2100 metros.
Temperaturas sin apenas cambios. Heladas débiles en cotas altas, localmente moderadas en cumbres.
Viento flojo o moderado de componentes este y sur.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 2600 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4000 m

Viento a 1500 m: SE 10 km/h
Viento a 3000 m: S 30 km/h

Evolución para el jueves día 5

Nivel de peligro en ascenso.

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.