www.meteomont.com

ESERCITO Meteomont

per la sicurezza in montagna

SETTORE ALPI VENOSTE E PASSIRIE, MONTI SARENTINI, ORTLES CEVEDALE, BRENTA ADAMELLO, DOLOMITI S-OCC., GIUDICARIE BONDONE-BALDO

Bollettino Valanghe nr. 138- emesso dal Reparto Comando del Comando Truppe Alpine alle ore 14:00 del 22/04/2026

per le esigenze dei reparti in attivita' in ambiente montano innevato in collaborazione con il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare e AINEVA

PREVISIONE (1) per il giorno 23/04/2026



STATO MANTO NEVOSO: Strati superficiali di neve umida-bagnata a debole coesione su strati basali debolmente consolidati. Il manto nevoso è in generale moderatamente consolidato. Nel settore di competenza il manto nevoso ha uno spessore che varia, a seconda della zona e delle esposizioni, dai 10 agli 105 cm ad una quota media di 2000/2300 m. Il sole e il calore causeranno al di sotto dei 3000 m circa un progressivo impregnamento del manto nevoso. Sui pendii ripidi esposti a ovest, nord ed est in quota, al di sopra dei 2500 m, nella parte basale del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli sfaccettati. A quota alte, sono ancora presenti alcuni accumuli eolici che poggiano ancora su uno strato di neve vecchia sfavorevole. Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri. Al di sotto dei 2000 m di quota la presenza di neve è praticamente assente.

SOTTO SETTORE	METEO		ESPOSIZIONI PIÙ CRITICHE	QUOTE PIÙ CRITICHE	TENDENZA (2) del PERICOLO per i giorni successivi	AVVERTENZE
	CIELO	FENOMENI				
MONTE BONDONE E BALDO		—	ALL	2500 m	STAZIONARIO	Il rialzo termico diurno richiede una attenta valutazione temporale dell'escursione che eviti l'attraversamento di pendii ripidi nelle ore più calde della giornata. Meteomont rammenta ARTVA, pala e sonda sempre al seguito.
GRUPPO BRENTA ADAMELLO		—	ALL	2500 m	STAZIONARIO	Nel settore di competenza, il pericolo valanghe è MODERATO (2) . Il manto nevoso rimane particolarmente variabile a distanza di pochi metri soprattutto in alta quota. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe di neve bagnata aumenterà ulteriormente. Le valanghe bagnate possono in alcuni punti distaccarsi in seguito al passaggio di un singolo di un escursionista, sia sui pendii ombreggiati molto ripidi al di sotto dei 2500 m circa, come anche sui pendii soleggiati ripidi in quota. Sono possibili valanghe spontanee. Le valanghe possono coinvolgere la neve vecchia debole e, a livello isolato, raggiungere grandi dimensioni. Al di sopra dei
GRUPPO ORTLES CEVEDALE		—	ALL	2500 m	STAZIONARIO	
ALPI VENOSTE PASSIRIE		—	ALL	2500 m	STAZIONARIO	

MONTI SARENTINI			ALL	2500 m	STAZIONARIO	2500 m di quota il pericolo principale risiede nella vecchia neve e negli accumuli eolici di nuova e vecchia formazione che possono subire un distacco al passaggio di un singolo sciatore sui pendii più ripidi. Valutare quindi con attenzione le classiche zone di accumulo, conche canaloni, zone sotto cresta o riparate dal vento e salti di roccia. I punti pericolosi aumentano con l'aumento di quota. Al di sotto dei 2000 m di quota la presenza del manto nevoso è praticamente assente.
DOLOMITI SUD-OCCIDENTALI			ALL	2500 m	STAZIONARIO	

1*	Il presente bollettino è uno strumento di valutazione regionale del pericolo valanghe. La sua consultazione non può escludere in alcun modo la necessaria capacità di valutazione locale del pericolo (singolo pendio) che è pertanto richiesta ad ogni utente.
2*	L'indicazione della tendenza non può sostituire la previsione per la cui disponibilità si rimanda alla consultazione di bollettini aggiornati.