www.meteomont.com

ESERCITO

Meteomont

per la sicurezza in montagna

PREVISIONI MONTANE SETTORE ALPI BREONIE AURINE-PUSTERESI DOLOMITI N-OR. DOLOMITI N-OCC.

Bollettino Valanghe nr. 64- emesso dal 6° rgt alpino
alle ore 14:00 del 06/02/2026

per le esigenze dei reparti in attività in ambiente montano innevato in collaborazione con il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare e AINEVA

PREVISIONE (1) per il giorno 07/02/2026



STATO MANTO NEVOSO: Strati di neve fresca asciutta a debole coesione su strati basali debolmente consolidati. Il manto nevoso è debolmente consolidato su molti pendii ripidi. La quantità di neve al suolo è variabile a seconda della quota e dell'esposizione. La precipitazione che ha attraversato il settore ha portato fino a 30cm di neve nella zona delle Dolomiti di Sesto, mentre altrove i quantitativi di neve fresca variano dai 10 ai 15 cm. La neve nuova poggia su uno strato intermedio e basale di neve sfavorevole formato da cristalli sfaccettati. Gli accumuli di neve ventata, saranno poco riconoscibili a causa della nuova nevicata e risultano ancora instabili.

SOTTO SETTORE	METEO		ESPOSIZIONI PIÙ CRITICHE	QUOTE PIÙ CRITICHE	TENDENZA (2) del PERICOLO per i giorni successivi	AVVERTENZE
	CIELO	FENOMENI				
DOLOMITI NORD-OCCIDENTALI			ALL	2000	STAZIONARIO	In considerazione dei recenti apporti di neve fresca, è richiesta una grande capacità di valutazione locale ed individuazione dell'itinerario. Meteomont rammenta ARTVA, pala e sonda sempre al seguito. Per la giornata di domani previsto tempo variabile, con presenza di residua nuvolosità in mattinata. Dal pomeriggio progressivo miglioramento. Le temperature saranno in ulteriore lieve aumento, con quota dello zero termico a circa 1700m e venti in quota deboli da sud ovest. Il grado di pericolo sarà ancora FORTE (GRADO 4) nelle Dolomiti Nord Orientali, mentre MARCATO (GRADO 3) sul restante settore. La principale fonte di pericolo è rappresentata dalla neve vecchia. Alle quote superiori al limite del bosco e nei pendii in ombra, i cristalli sfaccettati presenti negli strati basali del manto nevoso possono rappresentare punti di innesco di valanghe, anche a distanza: queste potranno localmente trascinare l'intero manto nevoso presente. Queste zone di instabilità possono essere individuate anche grazie ai classici rumori di
ALPI BREONIE			ALL	2000	STAZIONARIO	

ALPI AURINE E PUSTERESI			ALL	2000	STAZIONARIO	"whum" oppure alla presenza di fessurazioni sulla superficie del manto nevoso. I punti pericolosi sono più numerosi all'aumentare della quota e potrebbero essere localmente difficili da individuare. Gli accumuli eolici di recente formazione a tutte le esposizioni al di sopra del limite del bosco, possono risultare instabili e distaccabili ancora in seguito al passaggio di un singolo sciatore in quanto poggiano su strati sfavorevoli: prestare pertanto attenzione alle classiche zone di accumulo, alle conche, ai canaloni, alle zone di cresta o di cambio di pendenza dalle quote medie a salire. I distacchi possono raggiungere medie dimensioni. Ripresa dell'attività valanghiva spontanea, di piccole o medie dimensioni, di neve a debole coesione soprattutto nei pendii esposti ai quadranti meridionali, a causa del soleggiamento e del rialzo termico diurno. Viste le condizioni del manto nevoso presente, si raccomanda una attenta valutazione locale del pericolo valanghe (singolo pendio) e delle condizioni di stabilità del manto nevoso presente.
DOLOMITI N-OR. DOLOMITI N-OCC		MODERATA	ALL	2000	DIMINUZIONE	

1*	Il presente bollettino è uno strumento di valutazione regionale del pericolo valanghe. La sua consultazione non può escludere in alcun modo la necessaria capacità di valutazione locale del pericolo (singolo pendio) che è pertanto richiesta ad ogni utente.
2*	L'indicazione della tendenza non può sostituire la previsione per la cui disponibilità si rimanda alla consultazione di bollettini aggiornati.