




Matin



Après-midi



Degré de danger 2 - Limité


AM:



Tendance: danger d'avalanche constant →


leDimanche 03 05 2026

PM:




Tendance: danger d'avalanche constant →

leDimanche 03 05 2026



Avalanches mouillées
(Neige humide)



Le danger d'avalanches humides et mouillées augmente en cours de journée.

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait être étudié avec une attention particulière sur le terrain.

La surface de la neige est gelée et porteuse se ramollit en cours de journée. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches augmente progressivement en cours de journée. Des avalanches et coulées mouillées isolées sont possibles. Ceci surtout sur les pentes très raides ensoleillées en haute montagne.

A côté du danger d'ensevelissement, il faut aussi penser au danger d'être emporté et de chuter. Les randonnées devraient être commencées et terminées tôt.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Au-dessus d'environ 3300 m, sur les pentes à l'ombre: Le manteau neigeux est sec, avec une surface constituée de neige meuble, qui repose sur une croûte souvent porteuse. Ceci surtout le matin. En dessous d'environ 2800 m: Le manteau neigeux est assez homogène, avec une croûte de regel à la surface. Ceci surtout après une nuit claire.

Le soleil et la chaleur entraînent en cours de journée une humidification croissante du manteau neigeux. Surtout sur les pentes raides ensoleillées en dessous d'environ 2500 m il n'y a que peu de neige.



Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Dimanche 03 05 2026

Le manteau neigeux est généralement stable.

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait être étudié avec une attention particulière sur le terrain.

Aussi à haute altitude et en haute montagne: Avec les fortes variations de température le manteau neigeux s'est solidifié. Augmentation légère du danger de coulées humides et mouillées avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.

Les randonnées devraient être terminées à temps.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Le manteau neigeux est assez homogène, avec une croûte de regel porteuse à la surface. Ceci surtout le matin par nuit claire.

Le soleil et la chaleur entraînent en cours de journée surtout à moyenne et haute altitude une humidification croissante du manteau neigeux.

Sur les pentes raides ensoleillées en dessous d'environ 2500 m il n'y a que peu de neige.

