GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

viernes, 17 de abril de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del sábado, día 18 de abril

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Nieve húmeda

Deslizamientos basales

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	2 Limitado	Nieve húmeda: 2 / Deslizamientos basales: 2	2026-04-17 Cota más baja caras N
Ribagorzana - Vall Fosca	2 Limitado	Nieve húmeda: 2 / Deslizamientos basales: 2	2026-04-17 Cota más baja caras N
Pallaresa	2 Limitado	Nieve húmeda: 2 / Deslizamientos basales: 2	2026-04-17 Cota más baja caras N

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	2	2	**Nieve húmeda**	2	2026-04-17
			Deslizamientos basales	2	Cota más baja caras N
		Limitado			
Ter - Freser	2	2	**Nieve húmeda**	2	2026-04-17
			Deslizamientos basales	2	Cota más baja caras N
		Limitado			
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2	2	**Nieve húmeda**	2	2026-04-17
			Deslizamientos basales	2	Cota más baja caras N
		Limitado			
Prepirineo	2	2	**Nieve húmeda**	2	2026-04-17
			Deslizamientos basales	2	Cota más baja caras N
		Limitado			

Estado del manto y observaciones recientes

El tiempo primaveral sigue haciendo merma en un manto en claro retroceso, en el que el proceso de humidificación es cada vez más notable y afecta a todas las altitudes, registrándose pérdidas diarias de 1-10 cm en la red de observación. Como consecuencia, la cubierta nivosa ha ido retrocediendo a altitudes cada vez más elevadas, siendo más o menos continua a partir de los 1800-2000 metros en umbrías y los 2100-2300 metros en solanas. Los espesores se van incrementando a medida que ascendemos, estando todavía muy por encima de lo que cabría esperar a estas alturas de la temporada. A unos 2200 metros se

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

pueden encontrar entre 100 y 200 cm, aún más en ventisqueros, hoyas y otras zonas propensas a la acumulación.
El manto es de tipo primaveral, está muy humedecido y en proceso de fusión. El rehielo nocturno es débil, cada vez menos efectivo y está restringido a la alta montaña. Las costras superficiales que se forman durante la noche tienden a fundirse rápidamente con el calentamiento diurno.

Evolución del manto y peligro de aludes para el sábado, día 18

Problemas de nieve húmeda y deslizamientos basales. Problema de placas de viento en cotas altas.

Mañana las temperaturas continuarán ascendiendo y las heladas quedarán restringidas a las cumbres. Así mismo se esperan algunas precipitaciones, en forma líquida hasta unos 2700 metros, que podrán contribuir a una humidificación todavía más intensa del manto. Con todo esto, los problemas de nieve húmeda se presentarán ya desde el comienzo del día, afectando pronto a todas las orientaciones e incrementándose durante las horas centrales. En laderas suficientemente inclinadas, serán probables las purgas espontáneas o provocadas de tamaño pequeño (peligro de caída) o mediano (capaz de enterrar a una persona), más probables y frecuentes en solanas a partir del mediodía y en zonas próximas a afloramientos rocosos.
Además, en zonas de manto delgado sobre laderas herbosas o de roca lisa muy inclinadas, también se esperan deslizamientos basales de tamaño generalmente mediano, sin descartar que se pueda alcanzar el tamaño localmente grande (capaz de enterrar a un grupo de personas).
Todavía podría quedar alguna placa de viento en umbrías por encima de los 2400 metros que no se haya estabilizado del todo. Ante una sobrecarga débil (paso de un esquiador) estas podrían colapsar y provocar aludes de tamaño pequeño o más raramente mediano.

Predicción meteorológica para el sábado, día 18

Nuboso o con intervalos nubosos de nubes medias, altas y de evolución diurna. Se esperan chubascos desde las horas centrales, más probables en la mitad occidental, donde en algún caso podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo. Cota de nieve en torno a 2600-2800 metros. Tormentas acompañando a los chubascos. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles en las cumbres de mayor altitud. Viento flojo de dirección variable con algún intervalo de moderado de componentes norte y oeste en cotas altas. En áreas de chubasco podrá soplar fuerte y racheado.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 3400 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4900 m

Viento a 1500 m: SW 10 km/h
Viento a 3000 m: NW 10 km/h

Evolución para el domingo día 19

Nivel de peligro sin cambios o en ligero ascenso.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.