





Matin



Après-midi



## Degré de danger 2 - Limité



Le bulletin d'avalanches pour la saison 2025-2026 se termine aujourd'hui. Nous continuerons à vous tenir informés via les blogs d'Aineva : <https://bollettini.aieva.it/blog>.

Des avalanches humides et mouillées sont le danger principal.

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait être étudié avec une attention particulière sur le terrain.

Dimanche il fait un temps nuageux. Un regel de la neige en surface est possible, mais incertain. Ce phénomène sera localisé et dépendra de l'épaisseur et de l'altitude des nuages durant la nuit. Il pourrait avoir un impact sur la randonnée. La surface de la neige ne regèle assez pour être porteuse qu'en haute altitude et se ramollit en cours de journée.

Le danger d'avalanches humides et mouillées augmente au sein du degré de danger. Avec le réchauffement diurne en cours de journée des avalanches et coulées mouillées sont toujours possibles, également de taille moyenne, prudence surtout sur les pentes extrêmement raides exposées au nord en dessous d'environ 3100 m et sur les pentes très raides exposées à l'est, au sud et à l'ouest à moyenne et haute altitude. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute.

## Manteau neigeux

### Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Dans les derniers jours il faisait doux. Cette situation a entraîné en dessous d'environ 2900 m une humidification croissante du manteau neigeux.

Avec les fortes variations de température le manteau neigeux s'est solidifié. Seules des avalanches isolées ont encore été annoncées sur les pentes extrêmement raides.

On trouve des hauteurs de neige très différentes à petite échelle.

Spécialement sur les pentes ensoleillées en dessous d'environ 2600 m il n'y a pas de neige. Sur les pentes à l'ombre sous la limite de la forêt il y a très peu de neige. Sur les pentes à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt on trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très différentes.

Dans la partie inférieure du manteau neigeux des couches fragiles isolées sont présentes, surtout en haute montagne.




## Tendance

Temps instable de lundi à mercredi. Augmentation légère du danger d'avalanches sèches et mouillées avec la neige fraîche et le vent. Des accumulations de neige soufflée en général petites se forment jusqu'à mercredi surtout en haute montagne. Quelques endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent à proximité des crêtes et des cols. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute.

Avec le réchauffement diurne en cours de journée des avalanches et coulées mouillées sont possibles, également de taille moyenne.



## Degré de danger 2 - Limité



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le Lundi 04 05 2026



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



## Des avalanches de neige meuble mouillée sont le danger principal.

En dessous d'environ 2200 m on observe moins de neige que d'habitude.

Après une nuit claire, il règne le matin généralement des conditions assez favorables, puis le danger d'avalanches mouillées et de glissement augmente. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire la probabilité de déclenchement d'avalanches mouillées augmente progressivement surtout sur les pentes raides au-dessus d'environ 2300 m. En matinée également, des avalanches de neige mouillée et de glissement isolées, puis en cours de journée plus nombreuses sont possibles. Le danger d'avalanches augmente au sein du degré de danger. Les avalanches mouillées sont généralement plutôt petites. Spécialement sur les pentes très raides il faut compter avec des avalanches isolées de taille moyenne. Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2300 m. Ce sont surtout les bases de parois rocheuses qui sont délicates.

Les randonnées, descentes hors-piste et montées en refuge devraient être commencées et terminées tôt. Avec le refroidissement le danger d'avalanches diminue progressivement en soirée.

Des couches fragiles en partie inférieure du manteau neigeux peuvent être déclenchées de manière isolée et généralement avec une surcharge importante sur les pentes à l'ombre. Seulement de rares avalanches de petite à moyenne taille sont possibles surtout sur les pentes très raides à l'ombre.

## Manteau neigeux

### Modèles de danger

md.10: situation de printemps


Le rayonnement nocturne est bon. Le manteau neigeux est humide, avec une croûte de regel porteuse à la surface.

Il fait très doux en général. Ces conditions provoquent une très rapide fragilisation du manteau neigeux. Le soleil et la chaleur entraînent en cours de journée généralement une perte de solidité au sein du manteau neigeux. La surface de la neige se ramollit dès la matinée.





## Degré de danger 2 - Limité



Le bulletin d'avalanches pour la saison 2025-2026 se termine aujourd'hui. Nous continuerons à vous tenir informés via les blogs d'Aineva : <https://bollettini.aieva.it/blog>.

**Des avalanches humides et mouillées sont le danger principal.**

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait être étudié avec une attention particulière sur le terrain.

Dimanche il fait un temps nuageux. Un regel de la neige en surface est possible, mais incertain. Ce phénomène sera localisé et dépendra de l'épaisseur et de l'altitude des nuages durant la nuit. Il pourrait avoir un impact sur la randonnée. La surface de la neige ne regèle assez pour être porteuse qu'en haute altitude et se ramollit en cours de journée.

Le danger d'avalanches humides et mouillées augmente au sein du degré de danger. Avec le réchauffement diurne en cours de journée des avalanches et coulées mouillées sont toujours possibles, également de taille moyenne, prudence surtout sur les pentes extrêmement raides exposées au nord en dessous d'environ 3100 m et sur les pentes très raides exposées à l'est, au sud et à l'ouest à moyenne et haute altitude. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute.

## Manteau neigeux

### Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Dans les derniers jours il faisait doux. Cette situation a entraîné en dessous d'environ 2900 m une humidification croissante du manteau neigeux.

Avec les fortes variations de température le manteau neigeux s'est solidifié. Seules des avalanches isolées ont encore été annoncées sur les pentes extrêmement raides.

On trouve des hauteurs de neige très différentes à petite échelle.



Spécialement sur les pentes ensoleillées en dessous d'environ 2600 m il n'y a pas de neige. Sur les pentes à l'ombre sous la limite de la forêt il y a très peu de neige. Sur les pentes à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt on trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très différentes.

Dans la partie inférieure du manteau neigeux des couches fragiles isolées sont présentes, surtout en haute montagne.

## Tendance

Temps instable de lundi à mercredi. Augmentation légère du danger d'avalanches sèches et mouillées avec la neige fraîche et le vent. Des accumulations de neige soufflée en général petites se forment jusqu'à mercredi surtout en haute montagne. Quelques endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent à proximité des crêtes et des cols. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute.

Avec le réchauffement diurne en cours de journée des avalanches et coulées mouillées sont possibles, également de taille moyenne.





## Degré de danger 2 - Limité

**AM:**



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le Lundi 04 05 2026



Neige  
ancienne  
(Sous-couche  
fragile  
persistante)



2800m



Avalanches  
mouillées  
(Neige  
humide)





2700m

**PM:**



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le Lundi 04 05 2026



Neige  
ancienne  
(Sous-couche  
fragile  
persistante)



2800m



Avalanches  
mouillées  
(Neige  
humide)



2500m

La surface de la neige regèle et devient porteuse et se ramollit en cours de journée. Dans la partie inférieure du manteau neigeux des couches fragiles isolées susceptibles d'être déclenchées sont présentes sur les pentes à l'ombre.

Les endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent sur les pentes raides à l'ombre au-dessus d'environ 2800 m.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire la probabilité de déclenchement d'avalanches mouillées augmente surtout sur les pentes raides à l'ombre en dessous d'environ 2800 m.



Des avalanches de moyenne taille sont possibles.

## Manteau neigeux

### Modèles de danger

md.1: sous-couche fragile persistante

md.10: situation de printemps

La surface de la neige se ramollit en cours de journée.


Sur les pentes raides à l'ombre au-dessus d'environ 2800 m: Dans la partie inférieure du manteau neigeux ancien des couches fragiles isolées susceptibles d'être déclenchées sont présentes.

En dessous d'environ 2200 m il y a en général trop peu de neige pour les sports d'hiver.



## Degré de danger 2 - Limité


**AM:**



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

leLundi 04 05 2026

**PM:**



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

leLundi 04 05 2026



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



Le danger d'avalanches humides et mouillées augmente en cours de journée.

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait être étudié avec une attention particulière sur le terrain.

La surface de la neige est gelée et porteuse se ramollit en cours de journée. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches augmente progressivement en cours de journée. Des avalanches et coulées mouillées ne sont plus possibles que de façon isolée. Ceci surtout sur les pentes très raides ensoleillées en haute montagne.

A côté du danger d'ensevelissement, il faut aussi penser au danger d'être emporté et de chuter. Les randonnées devraient être commencées et terminées tôt.

## Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.10: situation de printemps

Au-dessus d'environ 3500 m, sur les pentes à l'ombre: Le manteau neigeux est sec, avec une surface constituée de neige meuble, qui repose sur une croûte souvent porteuse. Ceci surtout le matin. En dessous d'environ 2800 m: Le manteau neigeux est assez homogène, avec une croûte de regel à la surface. Ceci surtout après une nuit claire.


La chaleur entraîne en cours de journée une humidification croissante du manteau neigeux.

Surtout sur les pentes raides ensoleillées en dessous d'environ 2500 m il n'y a que peu de neige.



## Degré de danger 2 - Limité

**AM:**



**Tendance: danger d'avalanche constant** →  
le Lundi 04 05 2026




Neige  
ancienne  
(Sous-couche  
fragile  
persistante)



2800m

**PM:**




2600m

**Tendance: danger d'avalanche constant** →  
le Lundi 04 05 2026




Avalanches  
mouillées  
(Neige  
humide)



2600m



Neige  
ancienne  
(Sous-couche  
fragile  
persistante)



2800m

Des couches fragiles dans la neige ancienne demandent de la prudence.  
Neige mouillée à évaluer de manière critique.

Avec le réchauffement le danger d'avalanches augmente progressivement en cours de journée. Les avalanches humides peuvent se déclencher spontanément sur les pentes très raides et atteindre une taille moyenne de manière isolée.

Des accumulations de neige soufflée se sont formées avec le vent vendredi à haute altitude. Quelques endroits dangereux se situent sur les pentes très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2600 m.

Des avalanches peuvent être déclenchées avec en général une surcharge importante et atteindre une taille moyenne.

## Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.10: situation de printemps

En dessous d'environ 2500 m il y a peu de neige. Les conditions météorologiques printanières entraînent



une humidification rapide du manteau neigeux. La surface de la neige ne regèle assez pour être porteuse qu'en haute altitude et se ramollit rapidement.


Sur les pentes raides exposées au nord-ouest, au nord et au nord-est au-dessus d'environ 2500 m: Dans la partie inférieure du manteau neigeux ancien des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes.

## Tendance

Le matin, il règne généralement des conditions favorables. Augmentation du danger d'avalanches mouillées avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.



## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: danger d'avalanche constant**

le Lundi 04 05 2026



### Danger d'avalanches faible.

Le danger d'avalanches humides et mouillées est présent dès le matin. À partir des zones de départ pas encore déchargées des avalanches mouillées isolées sont possibles, mais en général uniquement de petite taille.

Prudence sur les pentes extrêmement raides à l'ombre.

### Manteau neigeux

#### Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Au-dessus d'environ 2000 m il y a encore peu de neige. Ceci dans les combes et couloirs sur les pentes à l'ombre. Le rayonnement nocturne est généralement très peu présent. La surface de la neige se ramollit rapidement.


### Tendance

Danger d'avalanches faible.





## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: danger d'avalanche constant**

le Lundi 04 05 2026



Avalanches  
mouillées  
(Neige  
humide)



Attention à la neige mouillée et glissante.

Error: Incomplete joker sentence

## Manteau neigeux


**Modèles de danger**

md.10: situation de printemps

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement sur le manteau neigeux. La surface de la neige se ramollit rapidement. En général le manteau neigeux sera totalement mouillé.



## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

leLundi 04 05 2026



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



La surface de la neige ne regèle assez pour être porteuse qu'en haute altitude et se ramollit dès la matinée.

La surface de la neige regèle à peine et se ramollit en cours de journée.

Les avalanches sont de manière isolée petites.

## Manteau neigeux


**Modèles de danger**

md.10: situation de printemps

Avec les températures douces le manteau neigeux s'est solidifié. Avec le réchauffement diurne le danger d'avalanches humides et mouillées augmente.



## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le Lundi 04 05 2026

### Le manteau neigeux est généralement stable.

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait être étudié avec une attention particulière sur le terrain.

Aussi à haute altitude et en haute montagne: Avec les fortes variations de température le manteau neigeux s'est solidifié. Augmentation légère du danger de coulées humides et mouillées avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.

Les randonnées devraient être terminées à temps.

### Manteau neigeux

#### Modèles de danger

md.10: situation de printemps


Le manteau neigeux est assez homogène, avec une croûte de regel porteuse à la surface. Ceci surtout le matin par nuit claire.

La chaleur entraîne en cours de journée surtout à moyenne et haute altitude une humidification croissante du manteau neigeux.

Sur les pentes raides ensoleillées en dessous d'environ 2500 m il n'y a que peu de neige.



## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: danger d'avalanche constant**

le Lundi 04 05 2026



Avalanches  
mouillées  
(Neige  
humide)



The publication of the Friuli Venezia Giulia Avalanche Bulletin ends today and will resume next winter, tentatively in early December. In the coming period, any "Information Notes" will be published to provide updates on snow and weather conditions in our region.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire les endroits dangereux se multiplient en cours de journée.

Le danger d'avalanches mouillées augmente en cours de journée. Les endroits dangereux se situent surtout au pied des parois rocheuses, ainsi que dans les combes et couloirs. Des avalanches de neige mouillée et de glissement isolées sont possibles.

### Manteau neigeux


Snow cover is absent or patchy in many areas, up to the highest altitudes on the southern slopes; in general, the snowpack is increasingly thinning. Le rayonnement nocturne est assez bon. Les conditions météorologiques entraînent en cours de journée une saturation d'eau croissante du manteau neigeux. Dans le manteau neigeux des couches fragiles très isolées sont présentes sur les pentes à l'ombre.

### Tendance

Il fait un temps nuageux.



## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: danger d'avalanche constant**

le Lundi 04 05 2026



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



### Augmentation légère du danger d'avalanches mouillées en cours de journée.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente un peu en cours de journée. Des avalanches mouillées peuvent de manière isolée être déclenchées par des personnes, notamment sur les pentes très raides ensoleillées au-dessus d'environ 2500 m, ceci aussi sur les pentes très raides à l'ombre en dessous d'environ 2500 m dans les combes et couloirs. Des avalanches sont de manière isolée de taille moyenne.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent être déclenchées de manière isolée et généralement avec une surcharge importante, surtout sur les pentes très raides à l'ombre, surtout au-dessus d'environ 2500 m.

Sur la surface de neige dure il existe en terrain raide un risque de chute.

Ceci est la dernière carte de dangers de l'hiver 2025/26. Les informations et annonces actuelles sont publiées sur notre blog. On souhaite à tous les utilisateurs du rapport avalanche Euregio une saison estivale sans accident.

### Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.10: situation de printemps

md.1: sous-couche fragile persistante

Le rayonnement nocturne est généralement bon. La surface de la neige regèle et devient porteuse et se ramollit en cours de journée.

Sur les pentes à l'ombre au-dessus d'environ 2500 m: Dans la partie inférieure du manteau neigeux ancien des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes en altitude.

En dessous d'environ 2000 m il n'y a pas de neige. Entre environ 2000 et 2500 m on ne trouve plus que peu de neige.




## Tendance

Le matin, il règne généralement des conditions favorables. Augmentation légère du danger d'avalanches mouillées avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.



## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: danger d'avalanche constant**

leLundi 04 05 2026



Il n'y a que peu de neige.

Des avalanches mouillées ne sont presque plus possibles. Prudence sur les pentes extrêmement raides à l'ombre. Des avalanches sont uniquement petites.

Ceci est la dernière carte de dangers de l'hiver 2025/26. Les informations et annonces actuelles sont publiées sur notre blog. On souhaite à tous les utilisateurs du rapport avalanche Euregio une saison estivale sans accident.

## Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.10: situation de printemps

La surface de la neige est gelée et porteuse et se ramollit rapidement.


On ne trouve plus que peu de neige.

## Tendance

Danger d'avalanches faible.



## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le Lundi 04 05 2026



Avalanches  
mouillées  
(Neige  
humide)



Attention à la neige mouillée et glissante. Ceci est la dernière carte de dangers de l'hiver 2025/26. Le prochain bulletin d'avalanche paraîtra le 1 décembre, voire plus tôt si une évolution inattendue de la situation avalancheuse se produit.

Spécialement à haute altitude des avalanches de glissement et coulées mouillées de petite et rarement moyenne taille sont toujours possibles surtout à partir des zones de départ pas encore déchargées.

## Manteau neigeux

### Modèles de danger

md.10: situation de printemps

En dessous d'environ 1800 m il n'y a que peu de neige. Dans les combes et couloirs à haute altitude on observe encore beaucoup de neige. Les conditions météorologiques printanières entraînent une humidification croissante du manteau neigeux.

