GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

domingo, 1 de marzo de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del lunes, día 2 de marzo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Deslizamientos basales

Placas de viento

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	2 Limitado	Deslizamientos basales: 2 (N, O, E, S) Placas de viento: 2 (N, O, E, S) a 2000	2026-03-01 N / S: Cota más baja caras N
Ribagorzana - Vall Fosca	2 Limitado	Deslizamientos basales: 2 (N, O, E, S) Placas de viento: 2 (N, O, E, S) a 2000	2026-03-01 N / S: Cota más baja caras N
Pallaresa	2 Limitado	Deslizamientos basales: 2 (N, O, E, S) Placas de viento: 2 (N, O, E, S) a 2000	2026-03-01 N / S: Cota más baja caras N

2 → 1 Durante el día (2000)

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	2 2 / 2000 / 1→2 Durante el día **Limitado**	**Deslizamientos basales** 2 **Placas de viento** 2000 2	2026-03-01 N S Cota más baja caras N
Ter - Freser	2 2 **Limitado**	**Deslizamientos basales** 2 **Placas de viento** 2000 2	2026-03-01 N S Cota más baja caras N
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2 2 / 2000 / 1→2 Durante el día **Limitado**	**Deslizamientos basales** 2 **Placas de viento** 2000 2	2026-03-01 N S Cota más baja caras N
Prepirineo	2 2 / 2000 / 1→2 Durante el día **Limitado**	**Deslizamientos basales** 2 **Placas de viento** 2000 1	2026-03-01 N S Cota más baja caras N

Estado del manto y observaciones recientes

En las últimas 24 horas se han registrado algunas precipitaciones débiles y ocasionales, en forma de nieve a partir del entorno de los 1700-1800 metros, pudiendo haber añadido algunos centímetros de nieve reciente en cotas altas. En cualquier caso, en la red de observación hoy se han vuelto a registrar nuevas pérdidas de espesor, aunque menos significativas que en los días anteriores. Aún con todo, los espesores se encuentran por encima de lo que sería habitual a estas alturas de la temporada. Por encima de unos 2200 metros se superan los 150-200 cm en muchas zonas, aún más en ventisqueros, hoyas y otras zonas propensas a la

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

acumulación.
En cotas medias y bajas, así como en solanas a mayor altitud, el manto se ha humidificado en profundidad y, por lo general, amanece encostrado. El calentamiento diurno y la intensa radiación van ablandando las costras durante la mañana en las solanas, sometiéndose a un ciclo de rehielo-fusión diario, siendo menos efectivo en umbrías de cotas medias. En umbrías de cotas altas, la nieve se mantiene más seca y aún podemos encontrar placas de viento que no se hayan estabilizado por completo. También en estas zonas podría persistir alguna capa débil enterrada que pueda seguir latente.

Evolución del manto y peligro de aludes para el lunes, día 2

Problema de nieve húmeda y deslizamientos basales. Problema de placas de viento y capas débiles persistentes en cotas altas.

En cotas medias y bajas, se espera que el rehielo no sea tan efectivo como en días anteriores, siendo probables los aludes espontáneos de nieve húmeda desde primeras horas, de tamaño 1 (pequeño) ó 2 (mediano), así como los deslizamientos basales en zonas herbosas o de roca lisa, que podrían movilizar una cantidad de nieve considerable y alcanzar localmente el tamaño 3 (grande). Cabe mencionar que, con el avance del día, el calentamiento diurno y el efecto de la insolación harán que el manto sea cada vez más inestable y, por tanto, más probable el desencadenamiento de este tipo de aludes, especialmente en las solanas.
En cotas altas, se espera que se sigan formando nuevas placas de viento, que se añadirán a las formadas en los días anteriores, preferentemente en orientaciones norte y este, debido al arrastre por el viento de la nieve recién caída en las últimas jornadas. Estas estructuras de nueva formación podrán colapsar ante sobrecargas débiles (paso de un sólo esquiador), generando aludes de tamaño 1 (pequeño) o localmente 2 (mediano). Además, todavía quedan placas de formación más antigua en todas las orientaciones que siguen sin estabilizarse por completo, sobre todo en umbrías, las cuales podrían reaccionar ante sobrecargas grandes (paso de dos o más esquiadores), sin descartar en algún caso débiles (un solo esquiador). En caso de que estas últimas colapsen, serían posibles los aludes de tamaño 2 (mediano), o incluso 3 (grande) en caso de afectar a niveles inferiores y fracturar alguna capa débil en profundidad.

Predicción meteorológica para el lunes, día 2

Poco nuboso con nubes altas, salvo algunas brumas y nieblas localizadas, aumentando la nubosidad por la tarde, cuando la visibilidad se podrá ver localmente reducida. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso en cotas altas, y algunos ligeros descensos en fondos de valles. Máximas en ligero ascenso o sin cambios. Heladas débiles, moderadas en cotas altas y en fondos de valles. Viento de componente sur, flojo o moderado. Más intenso en cotas altas y zonas expuestas, especialmente del Ripollès y Prepirineo, donde soplará ocasionalmente fuerte y predominará el sudoeste.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 2300 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4000 m

Viento a 1500 m: SW 15 km/h
Viento a 3000 m: SW 30 km/h

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Evolución para el martes día 3

Nivel de peligro con pocos cambios.

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.