GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

aemet Agencia Estatal de Meteorología

sábado, 28 de febrero de 2026

Pronóstico hasta las 24 horas del domingo, día 1 de marzo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)



Problemas de aludes

Deslizamientos basales

Placas de viento

Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m)
Arán - Franja norte Pallaresa	2 — **Limitado**	**Deslizamientos basales** 2 — N, O, E, S **Placas de viento** 2 — 2000 — N, O, E, S	2026-02-28 N / S Cota más baja caras N
Ribagorzana - Vall Fosca	2 — 2 / 2000 / 1→2 Durante el día — **Limitado**	**Deslizamientos basales** 2 — N, O, E, S **Placas de viento** 2 — 2000 — N, O, E, S	2026-02-28 N / S Cota más baja caras N
Pallaresa	2 — 2 / 2000 / 1→2 Durante el día — **Limitado**	**Deslizamientos basales** 2 — N, O, E, S **Placas de viento** 2 — 2000 — N, O, E, S	2026-02-28 N / S Cota más baja caras N

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Catalán

Perafita - Puigpedrós	2 2 / 2000 / 1→2 Durante el día **Limitado**	**Deslizamientos basales** **Placas de viento**	2026-02-28 Cota más baja caras N
Ter - Freser	2 2 **Limitado**	**Deslizamientos basales** **Placas de viento**	2026-02-28 Cota más baja caras N
Vertiente norte Cadí - Moixeró	2 2 / 2000 / 1→2 Durante el día **Limitado**	**Deslizamientos basales** **Placas de viento**	2026-02-28 Cota más baja caras N
Prepirineo	2 2 / 2000 / 1→2 Durante el día **Limitado**	**Deslizamientos basales** **Placas de viento**	2026-02-28 Cota más baja caras N

Estado del manto y observaciones recientes

Hoy se han vuelto a registrar nuevas pérdidas de espesor significativas, tal como lleva sucediendo en las jornadas anteriores, debido a la intensa insolación y el ambiente templado con temperaturas anormalmente altas. Estos procesos han sido más intensos en solanas de cotas bajas. Aún con todo los espesores se encuentran por encima de lo que sería habitual a estas alturas de la temporada. Por encima de unos 2200 metros se superan los 150-200 cm en muchas zonas, aún más en ventisqueros, hoyas y otras zonas propensas a la acumulación.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

En cotas medias y bajas, así como en solanas a mayor altitud, el manto se ha humidificado en profundidad y, por lo general, amanece encostrado. El calentamiento diurno y la intensa radiación van ablandando las costras durante la mañana en las solanas, sometiéndose a un ciclo de rehielo-fusión diario, siendo menos efectivo en umbrías de cotas medias. En umbrías de cotas altas, la nieve se mantiene más seca y aún podemos encontrar placas de viento que no se hayan estabilizado por completo. También en estas zonas podría persistir alguna capa débil enterrada que pueda seguir latente.

Evolución del manto y peligro de aludes para el domingo, día 1

Problema de nieve húmeda y deslizamientos basales. Problema de placas de viento y capas débiles persistentes en cotas altas.

A lo largo del día de hoy se esperan algunas nevadas que podrán añadir unos pocos centímetros de nieve nueva, sin descartar que se puedan alcanzar localmente los 5 cm en cotas altas. Estas tenderán a remitir en el transcurso de la tarde hoy, siendo posibles algunas purgas y coladas de nieve reciente que cesarán de cara al día de mañana. Las nevadas de mañana no serán significativas y no se esperan nuevos acumulados de espesor.

Además, durante los días de hoy y mañana se espera que soplen vientos moderados de componentes oeste y sur en cotas altas, que podrían formar algunas placas de viento nuevas a sotavento (en caras este y norte). Estas estructuras de nueva formación podrán colapsar ante sobrecargas débiles (paso de un sólo esquiador), generando aludes en todo caso de tamaño 1 (pequeño), añadiéndose a otras de formación más antigua en todas las orientaciones que siguen sin estabilizarse por completo, sobre todo en umbrías, las cuales podrían reaccionar ante sobrecargas grandes (paso de dos o más esquiadores), localmente menores. En caso de que estas últimas colapsen, serían posibles los aludes de tamaño 2 (mediano), o incluso 3 (grande) en caso de afectar a niveles inferiores y fracturar alguna capa débil en profundidad.

En cotas medias y bajas, serán probables los aludes de nieve húmeda de tamaño 1 (pequeño) ó 2 (mediano), así como los deslizamientos basales en zonas herbosas o de roca lisa, que podrían movilizar una cantidad de nieve considerable y alcanzar localmente el tamaño 3 (grande). Cabe mencionar que se espera que mañana se formen numerosas costras de rehielo que aportarán estabilidad al manto durante la madrugada, pero que tenderán a desaparecer en el transcurso de la mañana debido al calentamiento diurno y a la insolación. Así, con el avance del día, el manto se hará cada vez más inestable, especialmente en solanas.

Predicción meteorológica para el domingo, día 1

Intervalos de nubes bajas, localmente asociadas a brumas y nieblas, tendiendo a despejar por la tarde. Probables precipitaciones débiles y ocasionales durante la primera mitad del día en los macizos orientales, asociadas a la nubosidad baja, sin descartarse alguna de manera más dispersa en el resto. Cota de nieve en torno a 1500-1700 metros aproximadamente. Temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso. Máximas con pocos cambios, salvo en el norte del Arán, donde ascenderán ligera o moderadamente. Heladas débiles o moderadas, localmente notables en cotas altas. Viento flojo de dirección variable, con intervalos de moderado de componente oeste en cotas altas, sin descartar alguna racha de viento en zonas de la divisoria con Francia.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 2000 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 3500 m

Viento a 1500 m: SW 15 km/h
Viento a 3000 m: W 20 km/h

Evolución para el lunes día 2

Nivel de peligro sin cambios.

Escala europea de peligro de aludes

Débil | Limitado | Notable | Fuerte | Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente | Placas de viento | Capas débiles persistentes | Nieve húmeda | Deslizamientos basales | Sin problema evidente

Nota1: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

Nota2: Los BPA se elaboran en base a información meteorológica así como al estado del manto nivoso a través de sondeos puntuales. Se advierte a los usuarios de la variabilidad de esta información al extrapolarla a zonas extensas de montaña. Por ello, AEMET no se hace responsable de su uso para la toma de decisiones que conciernen a la seguridad personal, ni de los riesgos físicos o materiales de ellas derivadas.

AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.