Vendredi 17.04.2026

Publié 16 04 2026, 17:00

Matin



Après-midi



1	2	3	4	5
faible	limité	marqué	fort	très fort

Degré de danger 3 - Marqué

AM:





2500m

Tendance: danger d'avalanche constant
leSamedi 18 04 2026

Neige ancienne (Sous-couche fragile persistante)

2500m

PM:





3000m

Tendance: danger d'avalanche constant
leSamedi 18 04 2026

Avalanches mouillées (Neige humide)

3000m

Neige ancienne (Sous-couche fragile persistante)

2500m

Augmentation du danger d'avalanches mouillées en cours de journée.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente notoirement en cours de journée. Des avalanches mouillées peuvent par endroits être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver. Ceci sur les pentes très raides à l'ombre en dessous d'environ 2500 m comme sur les pentes très raides ensoleillées en altitude. Des avalanches spontanées sont possibles l'après-midi. Des avalanches peuvent se déclencher dans la neige ancienne fragile et atteindre une grande taille de manière isolée.

Des avalanches sèches peuvent aussi être déclenchées déjà de manière isolée avec une surcharge faible, notamment sur les pentes très raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est au-dessus d'environ 2500 m. Ce sont spécialement les transitions entre les endroits peu enneigés et les endroits très enneigés qui sont défavorables. Les endroits dangereux sont difficilement identifiables.

Manteau neigeux

Modèles de danger md.10: situation de printemps md.1: sous-couche fragile persistante

La surface de la neige regèle et devient porteuse et se ramollit en cours de journée. Le soleil et la chaleur entraînent en dessous d'environ 3000 m une saturation d'eau croissante du manteau neigeux.
Sur les pentes raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est: Dans la partie inférieure du manteau neigeux ancien des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes en altitude.

Tendance

Le rayonnement nocturne est bon. Les conditions de randonnées sont en général favorables le matin en altitude. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente en cours de journée.

Degré de danger 3 - Marqué

AM:





2500m

Tendance: danger d'avalanche constant
leSamedi 18 04 2026

Neige ancienne (Sous-couche fragile persistante)

2500m

PM:





3000m

Tendance: danger d'avalanche constant
leSamedi 18 04 2026

Avalanches mouillées (Neige humide)

3000m

Neige ancienne (Sous-couche fragile persistante)

2500m

Augmentation du danger d'avalanches mouillées en cours de journée.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente notoirement en cours de journée. Des avalanches mouillées peuvent par endroits être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver. Ceci sur les pentes très raides à l'ombre en dessous d'environ 2500 m comme sur les pentes très raides ensoleillées en altitude. Des avalanches spontanées sont possibles l'après-midi. Des avalanches peuvent se déclencher dans la neige ancienne fragile et atteindre une grande taille de manière isolée.

Des avalanches sèches peuvent aussi être déclenchées déjà de manière isolée avec une surcharge faible, notamment sur les pentes très raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est au-dessus d'environ 2500 m. Ce sont spécialement les transitions entre les endroits peu enneigés et les endroits très enneigés qui sont défavorables. Les endroits dangereux sont difficilement identifiables.
Les accumulations de neige soufflée plus entièrement fraîches peuvent être déclenchées de manière isolée par un seul amateur de sports d'hiver surtout sur les pentes très raides à l'ombre en haute montagne.

Manteau neigeux

Modèles de danger md.10: situation de printemps md.1: sous-couche fragile persistante

La surface de la neige regèle et devient porteuse et se ramollit en cours de journée. Le soleil et la chaleur entraînent en dessous d'environ 3000 m une saturation d'eau croissante du manteau neigeux.
Sur les pentes raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est: Dans la partie inférieure du manteau neigeux ancien des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes en altitude.

Tendance

Le rayonnement nocturne est bon. Les conditions de randonnées sont en général favorables le matin en altitude. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente en cours de journée.

Degré de danger 2 - Limité

AM:





2500m

Tendance: danger d'avalanche constant
leSamedi 18 04 2026

Neige ancienne (Sous-couche fragile persistante)

2500m

PM:



Tendance: danger d'avalanche constant
leSamedi 18 04 2026

Avalanches mouillées (Neige humide)

3000m

Neige ancienne (Sous-couche fragile persistante)

2500m

Augmentation du danger d'avalanches mouillées en cours de journée.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente en cours de journée. Des avalanches mouillées peuvent par endroits être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver. Ceci sur les pentes très raides à l'ombre en dessous d'environ 2500 m comme sur les pentes très raides ensoleillées en altitude.

Quelques endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent sur les pentes très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2500 m. Ce sont spécialement les transitions entre les endroits peu enneigés et les endroits très enneigés qui sont défavorables. Les endroits dangereux sont difficilement identifiables.

Manteau neigeux

Modèles de danger md.10: situation de printemps | md.1: sous-couche fragile persistante

La surface de la neige est gelée et porteuse et se ramollit en cours de journée. Le soleil et la chaleur entraînent en dessous d'environ 3000 m un ramollissement progressif du manteau neigeux.

Sur les pentes raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est: Dans la partie inférieure du manteau neigeux ancien des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes en altitude.

Tendance

Le rayonnement nocturne est bon. Les conditions de randonnées sont en général favorables le matin en altitude. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente en cours de journée.

Degré de danger 1 - Faible



1

Tendance: danger d'avalanche constant
leSamedi 18 04 2026

Avalanches mouillées (Neige humide)

N S

2000m

Neige mouillée à surveiller.

Des avalanches mouillées ne sont plus possibles que de façon isolée. Prudence sur les pentes extrêmement raides à l'ombre. Des avalanches sont de manière très isolée de taille moyenne.

Manteau neigeux

Modèles de danger md.10: situation de printemps | md.1: sous-couche fragile persistante

La surface de la neige regèle et devient porteuse et se ramollit en cours de journée.

Tendance

Danger d'avalanches faible. Neige mouillée à surveiller.