





Estimation des risques pour le :

JEUDI 07 MAI

INSTABILITÉS EN PLACE EN HAUTE ALTITUDE DANS LA NEIGE RÉCENTE, PARFOIS ÉPAISSES.



Au-dessus de 2800m indice de risque marqué, plus bas indice limité.

Départs spontanés : en neige humide au soleil.

Déclenchements provoqués : plaques encore faciles à déclencher à haute altitude, parfois épaisses.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique :



neige fraîche



neige humide

Déclenchements provoqués :

- au dessus de 2800 m, des plaques sont en place dans la neige récente modérément ventée tombée mardi et mercredi. Plus fréquentes et sensibles en versants nord, elles restent possibles dans les autres orientations, mais elles se stabilisent rapidement au soleil en cours de journée. D'aspect friable, ou parfois plus durci par le vent de sud modéré qui a transporté la neige, elles peuvent être recouvertes par la neige tombée pendant les averses mercredi après-midi et difficiles à détecter. En haute montagne, les cassures peuvent être épaisses et mobiliser d'importants volumes de neige, générant des avalanches de taille moyenne, plus rarement grande (taille 2 à 3). A plus basse altitude, la neige récente se densifie rapidement, et le risque de plaques diminue fortement.

- un skieur évoluant tardivement dans une pente raide ensoleillée peut provoquer un départ superficiel de neige humide sous les skis.

Départs spontanés : quelques départs ponctuels en pentes raides, par humidification de la neige récente au fil de la course du soleil, provoquant des avalanches généralement de taille petite à moyenne (taille 1 à 2). Quelques départs linéaires de plus grande taille sont possibles en haute montagne au dessus de 2700/2800 m, par humidification d'une plaque ventée en place, ou par départ en cascade en cas de déstabilisation d'une couche fragile persistante enfouie à la base du manteau neigeux en versants nord. Avalanches de taille 2 à 3.

Qualité de la neige

Enneigement déficitaire pour la période.

Hauteurs de neige observées : 221 cm à la Nivôse des Écrins à 2970 m.

Limite d'enneigement skiable : très localement vers 1700 m en ubacs de fond de vallée en cœur de massif, plutôt 1900/2000 dans les autres ubacs et 2300/2500 m en adrets.

État de la neige en surface : jeudi matin, on trouve 60/80 cm de neige récente restée froide au dessus de 2600/2800 m environ, localement modérément ventée. L'épaisseur de neige récente, déjà plus lourde, diminue rapidement en dessous de 2500 m. Elle repose sur un manteau neigeux printanier ou de névé.

Aperçu météo pour le jeudi 07 mai

nuit



matin



après-midi



soir



Journée ensoleillée, avec faible risque d'averses par évolution diurne dans l'après-midi.

Pluie-Neige

2200 m

Iso 0 °C

2400 m

2500 m

2700 m

2600 m

Vent 2000 m

→ 10 km/h

↖ 10 km/h

↑ 20 km/h

↻ 5 km/h

Vent 3000 m


→ 25 km/h

↖ 15 km/h


→ 15 km/h

↑ 10 km/h

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du vendredi 08 mai



Indice de risque limité

Indice de risque en baisse : le bon ensoleillement prévu jeudi devrait contribuer à stabiliser la couche de neige fraîche présente en surface du manteau neigeux.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>

