




Matin



Après-midi





Degré de danger 2 - Limité

AM:



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Lundi 04 05 2026



Neige
ancienne
(Sous-couche
fragile
persistante)



2800m



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)





2700m

PM:



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Lundi 04 05 2026



Neige
ancienne
(Sous-couche
fragile
persistante)



2800m



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



2500m

La surface de la neige regèle et devient porteuse et se ramollit en cours de journée. Dans la partie inférieure du manteau neigeux des couches fragiles isolées susceptibles d'être déclenchées sont présentes sur les pentes à l'ombre.

Les endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent sur les pentes raides à l'ombre au-dessus d'environ 2800 m.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire la probabilité de déclenchement d'avalanches mouillées augmente surtout sur les pentes raides à l'ombre en dessous d'environ 2800 m.



Des avalanches de moyenne taille sont possibles.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.1: sous-couche fragile persistante

md.10: situation de printemps


La surface de la neige se ramollit en cours de journée.

Sur les pentes raides à l'ombre au-dessus d'environ 2800 m: Dans la partie inférieure du manteau neigeux ancien des couches fragiles isolées susceptibles d'être déclenchées sont présentes.

En dessous d'environ 2200 m il y a en général trop peu de neige pour les sports d'hiver.



Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Lundi 04 05 2026



Avalanches mouillées
(Neige humide)



La surface de la neige ne regèle assez pour être porteuse qu'en haute altitude et se ramollit dès la matinée.

La surface de la neige regèle à peine et se ramollit en cours de journée.

Les avalanches sont de manière isolée petites.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Avec les températures douces le manteau neigeux s'est solidifié. Avec le réchauffement diurne le danger d'avalanches humides et mouillées augmente.

