

Protocolo de Ensaio Clínico

Informação Administrativa

Título do Estudo

Eficácia de uma Intervenção Digital Multimodal (MindMove) na Redução de Sintomas Depressivos em Estudantes Universitários: Um Estudo Controlado Randomizado

Título Abreviado

MindMove: Ensaio Clínico em Saúde Mental Digital

Autores e Afiliações

Investigadores Principais: - Ana Sofia Bermudes Moreira, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - Flávio Ferreira Lino Vieira, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - Gabriela Gonçalves Carneiro, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - Maria Leonor Pereira Fernandes, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Instituição: Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Contacto: Email: up202505760@up.pt

Identificação do Ensaio

Tipo de estudo: Ensaio clínico randomizado, controlado, paralelo

Data de início prevista: 21 de março de 2026

Data de conclusão prevista: 27 de março de 2026

1 Introdução

1.1 Racional

A transição para o ensino superior é um período de vulnerabilidade crítica, marcado por exigências académicas e isolamento social, resultando numa prevalência crescente de sintomas depressivos [9]. Estima-se que cerca de

um terço dos universitários experiencie mal-estar psicológico significativo [3], contudo, as barreiras ao cuidado tradicional — como o estigma, o custo e as longas listas de espera nos serviços de psicologia — impedem que a maioria procure ajuda.

Atualmente, o suporte convencional limita-se a consultas presenciais escassas ou materiais informativos passivos. Embora as intervenções digitais (dMHIs) tenham demonstrado eficácia na literatura [8, 6], existe um gap no que toca a ferramentas multimodais que integrem a Terapia Cognitivo-Comportamental digital (dCBT) [2] com a monitorização de estilos de vida (sono e atividade física) especificamente para a população académica portuguesa.

O MindMove preenche esta lacuna ao oferecer uma solução escalável que atua na janela de oportunidade [2] de sintomas ligeiros a moderados (PHQ-9 entre 5-14), prevenindo a progressão para quadros clínicos graves. A escolha do comparador (lista de espera com material estático) justifica-se por representar o standard of care atual em muitos serviços universitários, onde o apoio imediato não está disponível. Espera-se que este estudo demonstre que a monitorização ativa e o suporte guiado por app resultam numa redução superior dos sintomas face à leitura passiva de brochuras.

1.2 Objetivos

O presente estudo visa investigar a viabilidade e a eficácia preliminar de uma intervenção digital baseada em *mHealth* para o apoio à saúde mental no contexto académico.

1.2.1 Objetivo Primário

Avaliar a eficácia da aplicação **MindMove** na redução dos sintomas depressivos em estudantes universitários, medida pela variação média no score da escala **PHQ-9** (*Patient Health Questionnaire-9*) [10], entre o momento inicial (baseline) e o final da intervenção (8 semanas), em comparação com um grupo de controlo em lista de espera.

1.2.2 Objetivos Secundários

Os objetivos secundários deste estudo são:

1. **Sintomatologia Ansiosa:** Avaliar a redução dos níveis de ansiedade através da variação da escala **GAD-7** (*Generalized Anxiety Disorder-7*) [12].
 2. **Bem-estar Holístico:** Monitorizar o impacto da intervenção na qualidade do sono, via **PSQI** (*Pittsburgh Sleep Quality Index*) [5], e nos níveis de atividade física semanal (minutos de atividade moderada a vigorosa).
 3. **Viabilidade e Adesão:** Determinar a taxa de adesão (*engagement* [4] — frequência de uso da app), taxa de retenção e taxa de abandono (*dropout*) ao longo das 8 semanas.
 4. **Experiência do Utilizador:** Avaliar o nível de satisfação, usabilidade (SUS - *System Usability Scale*) e aceitabilidade das funcionalidades específicas da aplicação MindMove.
-

2 Métodos

2.1 Desenho do Estudo

O estudo configura-se como um **ensaio clínico controlado e randomizado (RCT)** [11], de grupos paralelos, com ocultação da alocação. Trata-se de um estudo piloto (fase de pré-teste) monocêntrico, a realizar no Serviço de Psicologia da Universidade do Porto.

O desenho segue uma razão de **randomização de 1:1** com 30 participantes, onde os participantes são alocados ou para o braço de intervenção (App MindMove) ou para o braço de controlo (Lista de Espera com brochuras informativas). A duração total da participação individual é de **10 semanas** (2 semanas de recrutamento/triagem e 8 semanas de intervenção ativa). O estudo foca-se na avaliação de resultados *superiority* da intervenção digital face ao cuidado passivo.


Características do desenho:

- **Tipo de Ensaio:** RCT Paralelo, Superioridade.
- **Alocação:** Randomização estratificada por gravidade inicial (PHQ-9) para garantir equilíbrio entre grupos.

- **Setting:** Contexto universitário real (Universidade do Porto), facilitando a validade ecológica.
- **Cegamento:** Devido à natureza da intervenção (App), o cegamento dos participantes não é possível, mas a análise estatística será realizada por um investigador "cego" à alocação dos grupos (*single-blind analysis*).

Timeline e Fluxo do Estudo:

Fase	Duração	Descrição
Recrutamento	Semanas -2 a 0	Divulgação digital e física; triagem online (Informed Consent + PHQ-9).
Baseline (T0)	Dia 0	Avaliação completa (PHQ-9, GAD-7, PSQI); Randomização automatizada.
Intervenção	Semanas 1-8	Grupo I: Uso da App MindMove (protocolo 3x/semana). Grupo C: Acesso a brochuras PDF sobre higiene do sono e saúde mental.
Mid-term (T1)	Semana 4	Avaliação intermédia de segurança, adesão e sintomas (PHQ-9).
Post-test (T2)	Semana 8	Avaliação final de todos os outcomes primários e secundários.
Follow-up	Semana 12	(Opcional) Avaliação de manutenção de ganhos após término da intervenção.



Nota: Como este protocolo não foi efetivamente realizado, as informações que constam deste esquema são fictícias e servem um propósito meramente ilustrativo.

Figura 1: Fluxograma CONSORT ilustrando a previsão da progressão dos participantes através das fases do ensaio clínico.




Figura 2: Diagrama de atividades do percurso do participante no estudo clínico.

2.2 População do Estudo

2.2.1 Critérios de Inclusão

Serão elegíveis para participação neste estudo indivíduos que cumpram **todos** os seguintes critérios:

1. Idade compreendida entre os 18 e os 30 anos (inclusive).
2. Estatuto ativo de estudante universitário (matriculado numa instituição de ensino superior no ano letivo a decorrer).
3. Presença de sintomas depressivos ligeiros a moderados, confirmados e mensurados por uma pontuação entre 5 e 14 no *Patient Health Questionnaire-9* (PHQ-9) no momento do rastreio.
4. Posse de *smartphone* pessoal (sistema operativo Android ou iOS) com acesso diário à internet e capacidade técnica para instalar e operar a aplicação "MindMove".
5. Literacia e proficiência na língua portuguesa suficientes para ler, compreender e executar os módulos de Terapia Cognitivo-Comportamental digital (dCBT) e os exercícios guiados.
6. Capacidade legal e disponibilidade mental para fornecer consentimento informado voluntário antes de qualquer procedimento do estudo.
7. Disponibilidade e compromisso para interagir diariamente com a aplicação (ex: *mood tracking*) durante a totalidade do período de intervenção.

2.2.2 Critérios de Exclusão

Serão excluídos do estudo indivíduos que apresentem **qualquer** dos seguintes critérios:

1. Diagnóstico prévio ou atual de Depressão Major ou outras patologias psiquiátricas graves (ex: perturbação bipolar, esquizofrenia).
2. Toma atual de qualquer medicação antidepressiva ou envolvimento em psicoterapia formal regular iniciada nos últimos 30 dias.
3. Ideação suicida ativa, objetivamente verificada por uma pontuação de 1 ou superior na questão 9 do questionário PHQ-9.

4. Histórico ativo de abuso de substâncias ou álcool que, de acordo com o critério do investigador, possa comprometer a adesão aos exercícios de ativação comportamental.
5. Inexistência de condições tecnológicas básicas (falta de *smartphone* próprio ou ausência prolongada de ligação à internet).
6. Participação simultânea num outro ensaio clínico ou estudo focado na saúde mental ou em intervenções de base tecnológica.

2.2.3 Processo de Recrutamento

O recrutamento adotará uma estratégia de amostragem de conveniência no contexto académico, utilizando uma abordagem dupla. Primeiramente, estabelecer-se-ão protocolos com os Serviços de Saúde e Apoio Psicológico de várias faculdades, cujos profissionais poderão referenciar diretamente estudantes que apresentem queixas subclínicas enquadráveis. Em segundo lugar, será conduzida uma campanha de divulgação ativa através do envio de e-mails institucionais, afixação de cartazes nos *campi* universitários e publicações nas redes sociais das Associações de Estudantes locais. Os materiais de divulgação incluirão um código QR e um *link* para uma plataforma segura (*landing page* do estudo), onde os interessados poderão consultar a folha de informação, assinar o consentimento informado digital e preencher o questionário de triagem inicial (incluindo o PHQ-9) para validação automática de elegibilidade.

2.3 Métodos: Intervenções

2.3.1 Grupo de Intervenção

Os participantes randomizados para o grupo de intervenção receberão acesso à aplicação móvel do projeto.

Funcionalidades principais:

1. **Monitorização Ativa:** O utilizador deve registar diariamente dados de saúde (ex: sintomas ou sinais vitais) na interface da app.
2. **Sistema de Alertas:** A aplicação fornece feedback em tempo real e notificações push para lembrar a toma de medicação ou registo de dados.

3. **Conteúdo Educativo:** Acesso a uma biblioteca digital com guias sobre a gestão da sua condição de saúde.

Instalação e Suporte:

- **Onboarding:** A instalação será realizada durante a consulta inicial com o apoio da equipa de investigação, incluindo um tutorial de utilização.
- **Suporte Técnico:** Disponibilização de um contacto de e-mail dedicado para resolução de problemas técnicos com resposta em 24 horas.

Cuidado concomitante: Os participantes mantêm o acompanhamento médico habitual, incluindo consultas programadas e medicação prescrita, sem interrupções pelo estudo.




Figura 3: Diagrama de casos de uso da aplicação MindMove.




Figura 4: Diagrama de atividades mapeando a jornada de navegação dos participantes e suas tarefas enquanto utilizadores da aplicação digital.

2.3.2 Grupo Controle

Os participantes do grupo controle receberão o cuidado padrão (Standard of Care).

Descrição:

- Receberão apenas o acompanhamento clínico convencional do Serviço Nacional de Saúde.
- No início do estudo, será entregue um folheto informativo em papel com recomendações gerais.
- Não terão acesso a qualquer ferramenta digital ou app de monitorização durante o período do estudo.

Justificação: Este comparador é utilizado por representar a prática clínica atual, permitindo medir o benefício incremental da solução digital.

2.3.3 Critérios de Descontinuação

Os participantes serão retirados do estudo se:

1. Revogarem o consentimento informado por vontade própria;
2. Apresentarem um agravamento clínico que exija internamento ou impeça o uso da tecnologia;
3. Ocorrer uma violação grave do protocolo (ex: partilha da conta com terceiros).

3 Avaliações e Outcomes (Desfechos)

3.0.1 Outcome Primário

Redução da sintomatologia depressiva

- **Instrumento:** Questionário *Patient Health Questionnaire-9* (PHQ-9), com pontuação total de 0 a 27.
- **Momento de avaliação:** Baseline (T0 - recrutamento) e após 8 semanas de utilização da aplicação "MindMove"(T1).

- **Definição de sucesso:** Redução clinicamente significativa de pelo menos 5 pontos na pontuação total ou descida de categoria de gravidade (ex: de moderada para ligeira).

3.1 Outcomes Secundários

Para avaliar a viabilidade e eficácia da ferramenta digital, serão medidos:

1. **Usabilidade do Sistema:** Medida através do *System Usability Scale* (SUS) aplicado no momento T1 (8 semanas). Um score > 68 indica boa aceitabilidade.
2. **Adesão e Engagement:** Extraído dos logs automáticos da aplicação "MindMove":
 - Média de registos de humor (*mood tracking*) semanais.
 - Percentagem de conclusão dos módulos de Terapia Cognitivo-Comportamental digital.
3. **Bem-estar Geral:** Avaliação da qualidade de vida através do índice *WHO-5 Well-Being Index* em T0 e T1.
4. **Segurança Clínica:** Monitorização de ideação suicida (item 9 do PHQ-9) em cada interação com a app; qualquer pontuação maior ou igual a 1 gera um alerta automático para a equipa de investigação.

4 Análise Estatística

4.1 Tamanho da Amostra

Como estudo pré-teste de viabilidade, o tamanho de amostra ($n=30$, 15 por grupo) foi determinado por:

- Recomendações metodológicas para estudos piloto em ensaios clínicos com vista à avaliação de exequibilidade ($n=10-15$ por grupo é considerado aceitável para testes iniciais).
- Capacidade estimada de recrutamento num único serviço de psicologia universitário.

- Não foi calculado poder estatístico formal, mas 30 participantes permitem avaliar a viabilidade e calcular estimativas preliminares da dimensão do efeito para informar o cálculo amostral de um futuro Ensaio Clínico Randomizado.

4.2 Análise do Outcome Primário

- **População de análise:** *Intention-to-treat* (ITT) - todos os participantes randomizados serão incluídos na análise, independentemente da sua adesão à App MindMove ou descontinuação.
- **Análise principal:**
 - Comparação da variação do score PHQ-9 ao longo do tempo (*baseline*, 4 e 8 semanas) entre os grupos utilizando Modelos Lineares Mistos (LMM) para acomodar *missing data*.
 - Cálculo da dimensão do efeito padronizada (Cohen's d) para a diferença de médias às 8 semanas, de forma a informar o cálculo amostral futuro. A estimativa será calculada através da seguinte equação:

$$d = \frac{M_1 - M_2}{DP_{agrupado}}$$

- Onde:
 - * M_1 e M_2 são as médias do score PHQ-9 nos grupos de intervenção e controlo, respetivamente.
 - * $DP_{agrupado}$ é o desvio-padrão agrupado de ambos os grupos.
- **Análise de sensibilidade:**
 - *Per-protocol*: análise restrita aos participantes com um nível de *engagement* ativo mínimo pré-definido com a App (ex: acesso em pelo menos 4 das 8 semanas) e que completaram a avaliação final.
 - Tratamento de *missing data*: Avaliação dos padrões de abandono. O LMM assume inerentemente que os dados omissos são *Missing at Random* (MAR); caso esta premissa seja violada, aplicar-se-á imputação múltipla.

4.3 Análise dos Outcomes Secundários

- **Variáveis contínuas** (GAD-7, Nível de atividade física, PSQI):
 - LMM ou ANCOVA ajustando para os valores no *baseline*.
 - Teste *t* de Student para amostras independentes (ou teste não paramétrico de Mann-Whitney) para comparar pontuações em *timepoints* específicos.
 - **Adesão, *Engagement* e Satisfação** (focado no grupo intervenção):
 - Análise descritiva detalhada (médias, medianas, desvios-padrão, intervalos interquartis) para tempo de uso da app e módulos completados.
 - **Taxa de *dropout*:**
 - Comparação da proporção de desistências entre os grupos utilizando o teste Qui-quadrado (ou teste exato de Fisher, considerando que $N < 30$).
 - **Nível de significância:** $\alpha = 0.05$ (bilateral), sem aplicação de ajustes estatísticos para múltiplas comparações, dado o caráter piloto e exploratório deste estudo.
-

5 Ética e Disseminação

5.1 Aprovação Ética

O protocolo do estudo, o formulário de consentimento informado e os materiais de recrutamento serão submetidos para revisão e aprovação à **Comissão de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP)** [1]. Qualquer emenda ao protocolo que possa afetar a segurança dos participantes, o desenho do estudo ou os objetivos científicos será submetida como adenda para aprovação prévia antes da sua implementação.

5.2 Consentimento Informado

O processo de consentimento será realizado de forma digital através da *landing page* do estudo.

- **Informação:** Os potenciais participantes terão acesso a uma Folha de Informação ao Participante detalhada, explicando os objetivos, procedimentos, riscos (mínimos) e benefícios.
- **Autonomia:** Será garantido o direito de retirada de consentimento a qualquer momento, sem necessidade de justificação e sem qualquer prejuízo académico ou clínico.
- **Assinatura:** A assinatura digital será obrigatória antes do preenchimento de qualquer questionário de triagem ou acesso à aplicação.

5.3 Confidencialidade e Gestão de Dados

Todos os dados recolhidos serão tratados em estrita conformidade com o **Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)**.

- **Anonimização:** A cada participante será atribuído um código de identificação único (ID). A chave de ligação entre o ID e a identidade real será armazenada num ficheiro encriptado, acessível apenas ao Investigador Principal.
- **Armazenamento:** Os dados da aplicação e dos questionários serão alojados em servidores seguros com acesso restrito.
- **Segurança:** Toda a transmissão de dados entre a app e o servidor será protegida por protocolos de encriptação SSL.




Figura 5: Diagrama de sequência da MindMove, ilustrando o processo de interação, submissão e armazenamento seguro dos dados do participante.

5.4 Monitorização de Segurança

Embora a intervenção seja de baixo risco, o bem-estar dos estudantes é prioritário:

- **Alerta de Risco:** Se um participante pontuar maior ou igual a 1 na questão 9 do PHQ-9 (ideação suicida) ou apresentar um agravamento severo dos sintomas (maior ou igual a 20 no PHQ-9), o sistema enviará um alerta imediato à equipa clínica do projeto.
- **Protocolo de Resgate:** Nestes casos, o participante será contactado num prazo de 24 horas por profissional de saúde mental da equipa para encaminhamento prioritário para os serviços de psicologia da universidade ou urgência psiquiátrica.

5.5 Disseminação

Os resultados deste ensaio clínico serão comunicados independentemente da magnitude ou direção do efeito:

- **Publicação Científica:** Submissão dos resultados a revistas de especialidade com revisão por pares (*peer-review*) nas áreas de Saúde Mental Digital ou Psicologia Clínica [7].

- **Comunidade Acadêmica:** Apresentação em congressos nacionais e internacionais.
- **Participantes:** Será elaborado um relatório síntese com os resultados agregados, a ser enviado a todos os participantes que manifestem interesse no final do estudo.

Versão: 1.0

Data desta versão: 24/03/2026 **Autores desta versão:** Ana Moreira, Flávio Vieira, Gabriela Carneiro, Maria Leonor Fernandes

Referências

- [1] World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects | Research, Methods, Statistics | JAMA | JAMA Network.
- [2] Gerhard Andersson and Pim Cuijpers. Internet-based and other computerized psychological treatments for adult depression: a meta-analysis. *Cognitive Behaviour Therapy*, 38(4):196–205, 2009.
- [3] Randy P. Auerbach, Philippe Mortier, Ronny Bruffaerts, Jordi Alonso, Corina Benjet, Pim Cuijpers, Koen Demyttenaere, David D. Ebert, Jennifer Greif Green, Penelope Hasking, Elaine Murray, Matthew K. Nock, Stephanie Pinder-Amaker, Nancy A. Sampson, Dan J. Stein, Gemma Vilagut, Alan M. Zaslavsky, Ronald C. Kessler, and WHO WMH-ICS Collaborators. WHO World Mental Health Surveys International College Student Project: Prevalence and distribution of mental disorders. *Journal of Abnormal Psychology*, 127(7):623–638, October 2018.
- [4] Amit Baumel, Frederick Muench, Stav Edan, and John M. Kane. Objective User Engagement With Mental Health Apps: Systematic Search and Panel-Based Usage Analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 21(9):e14567, September 2019.
- [5] D. J. Buysse, C. F. Reynolds, T. H. Monk, S. R. Berman, and D. J. Kupfer. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. *Psychiatry Research*, 28(2):193–213, May 1989.

- [6] E. Bethan Davies, Richard Morriss, and Cris Glazebrook. Computer-delivered and web-based interventions to improve depression, anxiety, and psychological well-being of university students: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 16(5):e130, May 2014.
- [7] Gunther Eysenbach and Consort-Ehealth Group. CONSORT-EHEALTH: Improving and Standardizing Evaluation Reports of Web-based and Mobile Health Interventions. *Journal of Medical Internet Research*, 13(4):e1923, December 2011.
- [8] Joseph Firth, John Torous, Jennifer Nicholas, Rebekah Carney, Abhishek Pratap, Simon Rosenbaum, and Jerome Sarris. The efficacy of smartphone-based mental health interventions for depressive symptoms: a meta-analysis of randomized controlled trials. *World Psychiatry: Official Journal of the World Psychiatric Association*, 16(3):287–298, October 2017.
- [9] Ahmed K. Ibrahim, Shona J. Kelly, Clive E. Adams, and Cris Glazebrook. A systematic review of studies of depression prevalence in university students. *Journal of Psychiatric Research*, 47(3):391–400, March 2013.
- [10] K. Kroenke, R. L. Spitzer, and J. B. Williams. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. *Journal of General Internal Medicine*, 16(9):606–613, September 2001.
- [11] Kenneth F. Schulz, Douglas G. Altman, David Moher, and CONSORT Group. CONSORT 2010 statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. *BMJ (Clinical research ed.)*, 340:c332, March 2010.
- [12] Robert L. Spitzer, Kurt Kroenke, Janet B. W. Williams, and Bernd Löwe. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. *Archives of Internal Medicine*, 166(10):1092–1097, May 2006.