

Universidade do Estado de Santa Catarina

# Cálculo Numérico

## Exercícios para a Prova 2

FERNANDO DEEKE SASSE

28 de setembro de 2025

Resolva os exercícios com o auxílio de calculadora. Use ao menos 4 casas decimais nas respostas finais.

1. Dados os pontos na Tabela 2, determine, passo a passo, o spline cúbico do tipo *clamped*, com derivadas em  $x = 1$  e  $x = 4$  dadas por 1 e 0, respectivamente.

$x$	1	2	3	4
$f$	1.8	2.6	4.5	5.7

Tabela 1: Dados para spline cúbico.

**Resposta.** Denotando os polinômios em cada intervalo por

$$p_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i, \quad i = 1, \dots, 12,$$

as equações que determinam os coeficientes são

$$\begin{cases} a_1 + b_1 + c_1 + d_1 = 1.8 \\ 8a_1 + 4b_1 + 2c_1 + d_1 = 2.6 \\ 8a_2 + 4b_2 + 2c_2 + d_2 = 2.6 \\ 27a_2 + 9b_2 + 3c_2 + d_2 = 4.5 \\ \dots \end{cases}$$

Os polinômios cúbicos interpolantes resultantes são (não necessários numa prova manual):

$$\begin{cases} 0.8 + 1.0x - 0.8733(x-1)^2 + 0.6733(x-1)^3 & x < 2 \\ 0.05333 + 1.2733x + 1.146(x-2)^2 - 0.52(x-2)^3 & x < 3 \\ -1.52 + 2.0067x - 0.4133(x-3)^2 - 0.3933(x-3)^3 & x > 3 \end{cases}$$

2. Considerando os dados na Tabela 2, use mínimos quadrados, passo a passo, para ajustar a função  $f(x) = ae^x + bx$ . Calcule também o coeficiente de determinação.

$x$	1	2	3	4	5
$y$	6.7	12.6	21.2	38.9	62.1

Tabela 2: Dados para ajuste por mínimos quadrados.

Resposta:  $a = 0.217256$ ,  $b = 6.10986$ ,  $r^2 = 0.9946$ .

**Notas:** A soma do quadrado dos resíduos é dada por

$$\text{SSE} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2,$$

sendo  $y_i$  os valores tabelados e  $\hat{y}_i$  os valores do modelo (previstos). A soma total dos quadrados é definida por

$$\text{SST} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2,$$

sendo  $\bar{y}$  a média de  $y_i$ . O coeficiente de determinação é dado por

$$r^2 = 1 - \frac{\text{SSE}}{\text{SST}}.$$

Notemos que:

- $r^2 = 1$ : o modelo explica toda a variabilidade nos dados de resposta.
- $r^2 = 0$ : o modelo não explica nenhuma variabilidade; não é melhor do que prever a média.
- $0 < r^2 < 1$ : a proporção da variabilidade explicada pelo modelo.

Por exemplo, se  $r^2 = 0.81$ , os resultados indicam que 81% da incerteza original foi explicada por esse modelo. Na regressão linear simples (um preditor),  $r^2$  também é o quadrado do coeficiente de correlação de Pearson entre  $x$  e  $y$ . A quantidade  $r$  é denominada *coeficiente de correlação*.

**3.** Sejam os dados mostrados na Tabela 4

$x$	1	2	3	4
$y$	2.3	5.4	8.1	17.2

Tabela 3: Dados gradientes descendentes em regressão linear univariada.

Use o método dos gradientes descendentes e construa método iterativo que determina os coeficientes de uma reta  $y = \theta_0 + \theta_1 x$  de ajuste. Comece o processo iterativo com  $(\theta_0^{(0)}, \theta_1^{(0)}) = (0, 0)$ . Faça três iterações. Use ao menos 4 dígitos decimais. Calcule  $\epsilon_0 = |\theta_0^{(j+1)} - \theta_0^{(j)}|$  e  $\epsilon_1 = |\theta_1^{(j+1)} - \theta_1^{(j)}|$  em cada iteração. Escolha o valor parâmetro de taxa de aprendizado como  $\alpha = 0.1$ .

**Resposta:**  $\theta^{(3)} = [\theta_0^{(3)} \theta_1^{(3)}]^T = [0.90375, 3.1125]^T$ .

**4.** Sejam os dados mostrados na Tabela 4

$x_1$	1.1	2.6	3.2	4.6
$x_2$	4.1	6.5	8.2	8.8
$y$	2.3	6.4	8.1	17.2

Tabela 4: Dados gradientes descendentes em regressão linear multivariada.

Use o método dos gradientes descendentes e construa método iterativo que determina os coeficientes de um plano  $y = \theta_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2$  de ajuste. Comece o processo iterativo com  $(\theta_0^{(0)}, \theta_1^{(0)}, \theta_2^{(0)}) = (0, 0, 0)$ . Faça três iterações. Use ao menos 4 dígitos decimais. Escolha o valor parâmetro de taxa de aprendizado como  $\alpha = 0.05$ .

**Resposta:**  $\theta^{(3)} = [\theta_0^{(3)} \theta_1^{(3)} \theta_2^{(3)}]^T = [1.02323453, 1.4351872, 1.58913611]^T$ .

**Nota.** Regressão Linear e Gradientes Descendentes. Nosso objetivo é estabelecer a relação entre uma variável dependente escalar  $y$  e uma variável independente  $x$  da forma:

$$y \approx \hat{y} = \theta_0 + \theta_1 x.$$

Devemos encontrar os parâmetros  $\theta_0$  e  $\theta_1$  que minimizem a discrepância entre os valores previstos  $\hat{y}$  e os valores observados  $y$ . Essa discrepância é quantificada pela função de custo (Erro Quadrático Médio):

$$J(\theta_0, \theta_1) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (\hat{y}^{(i)} - y^{(i)})^2 = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (\theta_0 + \theta_1 x^{(i)} - y^{(i)})^2.$$

Na expressão acima  $y^{(i)}$  e  $x^{(i)}$ ,  $i = 1, \dots, m$  denotam os valores dados na Tabela 4. O método dos gradientes descendentes é um algoritmo de otimização iterativa para minimizar a função de custo  $J(\theta_0, \theta_1)$ . Os parâmetros são atualizados da seguinte forma:

$$\theta_j^{(i+1)} := \theta_j^{(i)} - \alpha \frac{\partial J}{\partial \theta_j} \bigg|_{\theta_j^{(i)}}, \quad j = 0, 1,$$

sendo  $\alpha$  a taxa de aprendizado (tomando como positivo, pois buscamos um mínimo).

As derivadas parciais são:

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial \theta_0} &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\hat{y}^{(i)} - y^{(i)}) \\ \frac{\partial J}{\partial \theta_1} &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\hat{y}^{(i)} - y^{(i)}) x^{(i)} \end{aligned}$$

De modo mais compacto, para fins computacionais, podemos reescrever:

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

onde  $y^{(i)}$  são os valores observados e  $h_{\theta}(x)$  é a hipótese, dada pelo modelo linear.

$$h_{\theta}(x) = \theta^T \mathbf{x} = \theta_0 + \theta_1 x$$

sendo

$$\theta^T = [\theta_0 \ \theta_1], \quad \mathbf{x}^T = [1, x].$$

O método descrito acima pode ser estendido para casos de regressão linear multivariada. Nessas situações, desejamos modelar a relação entre uma variável dependente escalar  $y$  e um vetor de variáveis independentes  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  por meio de um modelo linear:

$$y \approx \hat{y} = \theta_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \cdots + \theta_n x_n.$$

Nosso objetivo é encontrar os parâmetros  $\theta_0, \theta_1, \dots, \theta_n$  que minimizem a discrepância entre os valores previstos  $\hat{y}$  e os valores observados  $y$ . Assim como no caso univariado, essa discrepância é quantificada pela função de custo (Erro Quadrático Médio):

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(\mathbf{x}^{(i)}) - y^{(i)})^2,$$

onde  $m$  é o número de exemplos,  $y^{(i)}$  são os valores observados e  $h_{\theta}(\mathbf{x})$  é a hipótese do modelo, dada por

$$h_{\theta}(\mathbf{x}) = \theta^T \mathbf{x} = \theta_0 + \theta_1 x_1 + \cdots + \theta_n x_n.$$

Aqui utilizamos a convenção de incluir um termo adicional  $x_0 = 1$  em cada vetor de entrada, de forma que:

$$\theta^T = [\theta_0 \ \theta_1 \ \cdots \ \theta_n], \quad \mathbf{x}^T = [1 \ x_1 \ \cdots \ x_n].$$

O método dos gradientes descendentes consiste em um algoritmo iterativo para minimizar a função de custo. A atualização dos parâmetros é dada por:

$$\theta_j := \theta_j - \alpha \frac{\partial J}{\partial \theta_j}, \quad j = 0, 1, \dots, n,$$

onde  $\alpha > 0$  é a taxa de aprendizado. As derivadas parciais assumem a forma geral:

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_j} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(\mathbf{x}^{(i)}) - y^{(i)}) x_j^{(i)}.$$

Assim, cada parâmetro  $\theta_j$  é ajustado na direção negativa do gradiente, levando em consideração sua contribuição relativa por meio da variável  $x_j$ .

Para facilitar implementações computacionais, podemos escrever as atualizações de forma vetorial. Definindo:

- $X \in \mathbb{R}^{m \times (n+1)}$ : matriz de dados, em que cada linha é  $(x_0^{(i)}, x_1^{(i)}, \dots, x_n^{(i)})$  com  $x_0^{(i)} = 1$ ;
- $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ : vetor dos valores observados;
- $\theta \in \mathbb{R}^{n+1}$ : vetor de parâmetros.

A hipótese pode ser escrita como:

$$\hat{\mathbf{y}} = X\theta,$$

e o gradiente da função de custo é:

$$\nabla_{\theta} J(\theta) = \frac{1}{m} X^T (X\theta - \mathbf{y}).$$

O processo iterativo de gradientes descendentes é então expresso como:

$$\theta := \theta - \alpha \nabla_{\theta} J(\theta) = \theta - \frac{\alpha}{m} X^T (X\theta - \mathbf{y}).$$