




Slide-Kit

pbserum Plus

pbserum Plus

Coquetel enzimático personalizado
para remodelação de tecidos



pbserum Plus


A linha pbserum Plus contém como ingredientes ativos as **primeiras enzimas recombinantes de origem bacteriana**, com eficácia comprovada, que garantem resultados visíveis e prolongados em pouco tempo e desde a primeira aplicação.

Esse tratamento inovador, resultado de anos de pesquisa biotecnológica, utiliza **ingredientes ativos biológicos que atuam seletivamente** na pele e nos tecidos, oferecendo uma alternativa natural e segura às moléculas químicas clássicas.

1. Produtos biotecnológicos de alta pureza e estabilidade.
2. Produzido sob os mais altos padrões de qualidade.
3. Não testamos nossos produtos em animais.




- Primeiras enzimas recombinantes no mercado com um legado de **experiência e confiança**.
- Fórmulas estéreis e **liofilizadas** com efeito poderoso na pele.
- **Segurança e eficácia** para tratamentos faciais e corporais versáteis.



pbserum Slim+

Ingrediente ativo: Lipase PB500



pbserum Smooth+

Ingredientes ativos: Colagnases G & H PB220

Conteúdo: Caixa com 10 frascos liofilizados.



pbserum Drain+

Ingrediente ativo: Hialuronidase PB3000

pbserum Plus / INDICAÇÕES

pbserum Plus

Perfil facial

Queixo duplo

Gordura localizada

Cicatrizes

Fibrose pós-cirúrgica

Celulite




PROTOCOLOS

		Diluição	Drain+	Smooth+	Slim+	Lidocaína	Volume total ¹	Sessões ²
Queixo duplo		# de frascos Volume	1 1.5 cc	1 1.5 cc	2 1.5 cc	1 cc	6 cc	2-4
Perfilamento Facial		# de frascos Volume	1 1.5 cc	1 1.5 cc	2 1.5 cc	1 cc	6 cc	2-4
Adipose localizada		# de frascos Volume	1 5 cc	1 5 cc	2 5 cc	1 cc	20 cc ³	4-8
Celulite		# de frascos Volume	2 4 cc	1 4 cc	2 4 cc	1 cc	20 cc ³	4-8
Cicatrices		# de frascos Volume	1 1.5 cc	3 1.5 cc		1 cc	6 cc ⁴	4
Fibrose		# de frascos Volume	1 4 cc	3 4 cc	1 4 cc	1 cc	20 cc ³	6

1 Volumen total sin lidocaína.
2 Número de sesiones mínimas recomendadas por indicación. Se pueden ajustar con base en el diagnóstico médico.
3 El volumen total de dilución es el recomendado para tratar un área de 20 x 20 cm
4 Cicatrices: Ejemplo de dilución para una cicatriz de 6 cm de longitud. Se recomienda ajustar el volumen total con base en las características del paciente y el tamaño de las cicatrices.
Perfil de paciente: Hombres y mujeres, 18-70 años, IMC <25.
Para mayor información se recomienda consultar los protocolos de tratamiento completos.

**pbserum Plus /
PERFILAMENTO FACIAL**



- 1 Smooth+ (Colagenases)
- 1 Drain+ (Hialuronidase)
- 2 Slim+ (Lipase)



Número de sessões: 2-4

Frequência das sessões: A cada 2 semanas.

RECONSTITUIÇÃO

- Adicione 3 ml de solução salina a cada frasco.
- Adicione 1 ml de lidocaína simples a 2%.

APLICAÇÃO


- Administre 0,5 ml por ponto.
- Volume final: 12 ml.



MARCAÇÃO

Distribuição dos pontos:
A malha terá uma distância de aproximadamente 1 a 1,5 cm entre as linhas.
Aplique no centro de cada quadrado

pbserum Plus /
QUEIXO DUPLO



- 1 Smooth+ (Colagenases)
- 1 Drain+ (Hialuronidase)
- 2 Slim+ (Lipase)



Número de sessões: 2-4


Frequência das sessões: A cada 2 semanas.

RECONSTITUIÇÃO

- Adicione 5 ml de solução salina a cada frasco.
- Adicione 1 ml de lidocaína simples a 2%.

APLICAÇÃO

- Administre 1 ml por ponto.
- Volume final: 6 ml.



MARCAÇÃO

Distribuição dos pontos:

A malha terá uma distância de aproximadamente 1-1,5 cm entre as linhas.

Aplique no centro de cada quadrado

pbserum Plus / GORDURA
LOCALIZADA



- 1 Smooth+ (Colagenases)
- 1 Drain+ (Hialuronidase)
- 2 Slim+ (Lipase)



Número de sessões: 2-8


Frequência das sessões: A cada 2 semanas.

RECONSTITUIÇÃO

- Adicione 3 ml de solução salina a cada frasco.
- Adicione 1 ml de lidocaína simples a 2%.


APLICAÇÃO

- Administre 1 ml por ponto.



MARCAÇÃO


Distribuição dos pontos:
A malha terá uma distância de
aproximadamente 1-1,5 cm entre as linhas.
Aplique no centro de cada quadrado



Número de sessões: 2

Dra. Sevinj Rustamzade, Azerbaiyán

pbserum Plus /
CELULITE



- 4 Frascos Smooth+ (Colagenases)
- 2 Frascos Drain+ (Hialuronidase)
- 4 Frascos Slim+ (Lipase)

Tratamento para ambas as pernas

- Número de sessões: 2-4
- Frequência das sessões: A cada 2 semanas.

RECONSTITUIÇÃO

- Adicione 3 ml de solução salina a cada frasco.
- Adicione 1 ml de lidocaína simples a 2%.

APLICAÇÃO

- Administre 1 ml por ponto.



MARCAÇÃO

Distribuição dos pontos:
A malha terá uma distância de
aproximadamente 1 a 1,5 cm entre as
linhas.
Aplique no centro de cada quadrado

pbserum Plus /
CICATRIZES



pbserum Plus / CICATRIZES

pbserum Plus

- 3 Frascos Smooth+ (Colagenases)
- 1 Frasco Drain+ (Hialuronidase)



Número de sessões: 4

Frequência das sessões: A cada 2 semanas.

RECONSTITUIÇÃO

- Adicione 1,5 ml de solução salina a cada frasco.
- Adicione 1 ml de lidocaína simples a 2%.

APLICAÇÃO


- Aplique na cicatriz.
- Para cicatrizes atróficas, aplique o coquetel simples 1-1-1 no tecido ao redor.



MARCAÇÃO

Depende do formato e do tamanho da cicatriz

pbserum Plus /
FIBROSE PÓS-CIRÚRGICA



pbserum Plus / FIBROSIS PÓS-CIRÚRGICO

pbserum Plus

- 3 Frascos Smooth+ (Colagenasas)
- 1 Frasco Drain+ (Hialuronidase)
- 1 Frasco Slim+ (Lipasa)



Número de sessões: 6

Frequência das sessões: A cada 2 semanas.

RECONSTITUIÇÃO

- Adicione 1,5 ml de solução salina a cada frasco.
- Adicione 1 ml de lidocaína simples a 2%.

APLICAÇÃO

- Aplicação intralesional em vários ângulos.
- Volume final: 7,5-25 ml*



MARCAÇÃO

Identificar e marcar nódulos fibróticos, ou aderências.

1

Enzimas tecnológicas recombinantes no mercado como uma alternativa inovadora, segura e eficaz.

2

Três apresentações diferentes de cada enzima individualmente para personalizar o tratamento.

O diagnóstico do médico é essencial para alcançar resultados ideais.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

EFEITOS ADVERSOS ESPERADOS

- Inflamação local e mal-estar geral (4 a 72 horas).
- Considere o tratamento sintomático com paracetamol.
- Anafilaxia (liases): muito rara (0,1%), geralmente associada a doses altas usadas em outros contextos (anestesia).

CONTRAINDICAÇÕES

- Gravidez e amamentação.
- Doença local ativa de pele
- Alergia a ácido hialurônico ou enzimas.
- Pacientes alérgicos a picadas de insetos podem apresentar reações cruzadas às hialuronidases.

PRECAUÇÕES

- Doenças autoimunes.
- Doença atópica, asma.
- Distúrbios vasculares ou de coagulação. Doença oncológica ativa.

RECOMENDAÇÕES APÓS O TRATAMENTO

- Ingestão adequada de água.
- Evite suar em excesso.
- Use protetor solar com FPS 50.
- Adie outros procedimentos estéticos locais.