

Note sheet: FTC 1: if  $f$  is continuous on  $[a, b]$ , then the function  $g$  defined by

$$g(x) = \int_a^x f(t) dt \quad a \leq x \leq b$$

is an antiderivative of  $f$ , that is,  $g'(x) = f(x)$  for  $a < x < b$

Substitution Rule:

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du$$

$$\int x^3 \cos(x^4 + 2) dx$$

$$u = x^4 + 2$$

$$du = 4x^3 dx$$

$$\frac{1}{4} du = x^3 dx$$

Integration by Parts:

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int g(x)f'(x) dx$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\int x \sin x dx$$

$$u = x, u' = 1$$

$$v = -\cos(x), v' = \sin(x)$$

$$= -x \cos(x) - \int -\cos(x) dx$$

$$= -x \cos(x) + \sin(x) + C$$

FTC 2:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Summation:

$$\Delta x = \frac{b-a}{N}$$

$$x_i = a + i\Delta x$$

$$\bar{x}_i = \frac{1}{2}(x_{i-1} + x_i)$$

$$R_n = \sum_{i=1}^N f(x_i) \cdot \Delta x$$

$$L_n = \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i) \cdot \Delta x \quad M_n = \sum_{i=1}^N f(\bar{x}_i) \Delta x$$

$$T_n = \frac{1}{2} \left( \sum_{i=1}^N (f(x_{i-1}) \Delta x) + \sum_{i=1}^N (f(x_i) \Delta x) \right)$$

$$T_n = \frac{\Delta x}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

$$S_n = \frac{\Delta x}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \cdots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

Error:

$$|f''(x)| \leq K \text{ for } a \leq x \leq b$$

$$|E_T| \leq \frac{K(b-a)^3}{12N^2}$$

$$|E_M| \leq \frac{K(b-a)^3}{24N^2}$$

$$|E_S| \leq \frac{K(b-a)^5}{180N^4}$$

$$\sin x = \frac{1}{\csc x}, \cos x = \frac{1}{\sec x}, \csc x = \frac{1}{\sin x}, \sec x = \frac{1}{\cos x}, \cot x = \frac{1}{\tan x}$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad 1 + \tan^2 x = \sec^2 x \quad 1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$