## Informe de microbiología CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL

## LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

Nombre:

OCHOA RUBIO, GINO LUIS Código:

SCVC2023-05

F. Muestra:

13/03/2023

ID del paciente: SCVC2023-05

Procedencia:

SALA 1

F. Recepción:

F. Estado Final: 15/03/2023

Muestra: Sexo:

Masculino

SEC. DE CATETER VENO... Servicio: Médico solic :

DR. CARLOS TUMIALAN

	hormaeche	•		
	Enterobacter hormaechei		ormaechei	
Antimicrobiano	CIM	Interp.		
Ácido Nalidíxico	>16			
Amicacina	<=16	S		
Amox/A Clav	>16/8	R		
Amp/Sulbactam	>16/8	R		
Ampicilina	>16	R	: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	34-34
Aztreonam	<=1	S		
Cefalotina	>16			
Cefepima	<=1	S	DOMESTIC OF THE STATE OF THE ST	The second secon
Cefotaxima	<=1	S		
Cefotaxima/A Clavulánico	4			
Cefoxitina	>16	R		
Ceftazidima	<=1	S		
Ceftazidima/A Clavulánico	2			
Cefuroxima	>16	R		
Ciprofloxacina	>2	R		
Colistina	<=2	S		
Ertapenem	<=0.5	S		~
osfomicina	<=64	S	Server some a server	DE MEN CHEZ EN EN HUMAN
Gentamicina	<=4	S		
mipenem	<=1	S		
_evofloxacina	4	1		\
Meropenem	<=1	S		
Nitrofurantoina	>64			Dr. JOHNNY FRANCISCO DIZ SALDARRIAGA
Norfloxacina	8		Janz	Martier (Martinico
Pip/Tazo	<=16	S	jung.	CMP - RE 23280 CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL
Гigeciclina	<=1	S	C. NANCY JACQUELINE ARANZABAL DURAND	ESSALUD
Tobramicina	<=4	S	William I State of the Manager of the Control of th	
Trimet/Sulfa	>2/38	R	CTMP. 3443 NTRO NACIONAL DE SALUD RENAL	

ESBL= BLEE... Betalactamasa de expectro extendido

Intermedio Resistente mcg/ml (mg/L) CIM

N/R No informado No probado POS Positivo Negativo NEG

Blanco Blac TFG

Dato no disponible, o antimicrobiano no

probado Betalactamasa positiva Cepa timidin resistente

Interpretación predictiva sensible

EBL?

Interpretación predictiva resistente Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas

Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de :Sensible; en especiales portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potençialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

= Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.