## Informe de microbiología CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL

## LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

Nombre:

ACUÑA VELASCO, EDUA... Código:

SCVC2023-2

21/01/2023 F. Muestra:

ID del paciente : SCVC2023-2

Procedencia: ----

SALA 1

F. Recepción:

Sexo:

Masculino

SEC. DE CATETER VENO... Servicio:

Médico solic :

DR. CLARO MURILLO

F. Estado Final: 24/01/2023

Pseudomo	onas aeruginos	a				
	Pseudomonas aeruginosa		inosa			
timicrobiano	CIM	Interp.			,	
nicacina	<=16	S	And a second	egalita William		
treonam	4	S		ADE TO THE REAL PROPERTY.		
fepima	4	S	OH THE RESERVE TO A VIEW OF THE VIE	even what I fill to	SV SECURITY OF THE SECURITY OF	
ftazidima	4	S		AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.		
orofloxacina	<=1	S		THE PARTY OF THE PARTY OF		
listina	<=2	S		A MARKET PARK SALES ON		
entamicina	<=4	S				
	4					
ipenem vofloxacina	<=2	S		Soulant History Will		
	<=1	S				
eropenem	<=4			the section of the last of		
orfloxacina	<=16	S				
p/Tazo	<=4	S	,			
bramicina						
			<b>\</b>			
			\ .			
			M			
/ ) (			Dr. JOHNNY FRANCISCO	DAZ CALDADDIAGA		
/ / `	4		A & A office Libertains	CO EHDICO		
1 shin	10/					
Jus			CENTRO NACIONAL I	UD		
Lic. NANCY JACQUEL!	NE ARANZABAL DURAND					
Tacanalaga Mag	ico en Laboratorio P. 3443		, Hy			
CIM	AL DE SALUD RENAL					
CENTRO NACIONA	AL DE ONES					
				c .		

ESBL= BLEE... Betalactamasa de expectro extendido

Interpretación predictiva sensible
Interpretación predictiva resistente
Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.
Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ¡Sensible;en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos
Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ¡Sensible;en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos
Beta-lactamasas Inducibles. Aparece en lugar de ¡Sensible;en especies portadoras de beta-lactamasa inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos
Beta-lactamasos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos. EBL?

Resistente mcg/ml (mg/L)

= Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.

Impresión 24/01/2023 10:07 a.m.

Página 1 de 1

NEG

Positivo Negativo

Téc:

Cepa timidin resistente