Informe de microbiología CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

Nombre:

CALDERON RODRIGUEZ, ... Código:

SCVC2023-03

F. Muestra:

03/02/2023

ID del paciente: SCVC2023-03

Procedencia:

F. Recepción:

Muestra:

SEC. DE CATETER VENO... Servicio:

SALA 4

F. Estado Final: 08/02/2023

Masculino Sexo:

Médico solic :

DRA. MARIA LOPERA

	Staphylococcus epidermidis CIM Interp.		dermidis	-				
Antimicrobiano								
Amox/A Clav	<=4/2	S						
mpicilina	4	BLAC						
Ceftarolina	<=0.5							
Ciprofloxacina	<=1	S						
Clindamicina	<=0.25	S						
Daptomicina	<=1	S				FEW AND		
Eritromicina	>4	R						
osfomicina	<=32	S		No.				
Gentamicina	<=1	S				MS DUE 11-7-7-7		
nducción Clindamicina	<=4/0.5	NEG						
_evofloxacina	<=1	S		_		ten more to		
inezolid	<=2	S		THE ROLL				
Mupirocina	<=256	S						
Nitrofurantoina	<=32					E VAIDE		
Oxacilina	<=0.25	S						
Penicilina	>0.25	BLAC						
Pristinamicina	<=1	S				Accused the second		
Screening de Cefoxitina	<=4	NEG				e Belle		
Synercid	<=1	S			Λ.	William Bass		
Teicoplanina	<=2	S			11			
Tetraciclina	<=1	S		ul metarol illiano	M	de la companya de la		
Tobramicina	<=1	S		P- (OUNDAL)	DANGE ON DATE	ALDARRIAGA		
Trimet/Sulfa	<=2/38	S		Dr. JOHNNY F	RANCISCO PAZ I ico Patólogo G	inico		
Vancomicina	<=1	S		CMP	Nº 40661 - REACIONAL DE SA	23280		
x 6	Pellet 1			CENTROTO	ESSALUD	TOO HENNE	9	
Técnologo	DUEL NE ARANZABAL DUE Mudico en Laborato					-		
	MP. 3443 IONAL DE SALUD RE							

ESBL= BLEE... Betalactamasa de expectro extendido

Interpretación predictiva sensible
Interpretación predictiva resistente
Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.

Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ¡Sensible;en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos
Beta-lactamicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos. EBL?

mcg/ml (mg/L)

= Interpretación informada modificada

IB

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.

Cepa timidin resistente

NEG

Negativo