Informe de microbiología CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

Nombre:

ESTABRIDIS FERNANDEZ... Código:

SCVC2022-53

30/12/2022

ID del paciente : SCVC2022-53

Procedencia:

F. Recepción:

F. Estado Final: 04/01/2023

F. Muestra:

Muestra: Sexo:

Masculino

SEC. DE CATETER VENO... Servicio: Médico solic : SALA 3

DR. DENIS CRIBILLERO

	Pseudor	Pseudomonas aeruginosa		
Intimicrobiano Imicacina Iztreonam Refepima Reftazidima Reftazidima Reinamicina Reinamicina Reinamicina Reinamicina Reinamicina Reropenem Rorfloxacina Pip/Tazo Tobramicina	CIM Inte <=16 4 4 <=1 <=1 <=2 <=4 <=1 <=2 2 <=4 <=16	rp.		
Tic. NANCY JACQUELINE AF CONTROL OF CONTROL	ANZABAL DURAND n Laboratorio 43			Dr. JOHNNY FRANCISCIPAZ SALDARRIAGA Médico Pordogo Clínico CMP N° 4466 1 - RE 23280 CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL ESSALUD Blanco = Dato no disponible, o antimicrobiano n

ESBL= BLEE... Betalactamasa de expectro extendido

Intermedio mcg/ml (mg/L) CIM

No probado Positivo NEG Negativo

= probado = Betalactamasa positiva Blac

Cepa timidin resistente-

Interpretación predictiva sensible

Interpretación predictiva sensibile

Interpretación predictiva resistente

Interpretación predictiva resistente

Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.

Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos Beta-lactamasa inducible. Aparece en lugar de ¡Sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos Beta-lactamacos.

Beta-lactamacos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

= Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo