Informe de microbiología CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

Nombre:

POMA GIL, OMAR

Código:

H2023-15

F. Muestra:

01/03/2023

ID del paciente: H2023-15

Procedencia:

F. Recepción: F. Estado Final: 07/03/2023

Muestra: Sexo:

Masculino

HEMOCULTIVO-LUMEN A... Servicio:

SALA 1

DRA. HELLEN NUÑEZ Médico solic :

1 Staphylococo							
	Staphylococcus aure CIM Interp.		us aureus				
Antimicrobiano							
Amox/A Clav	<=4/2	R*					
Ampicilina	4	R*			Total In 1887 and		
Ceftarolina	1	S					
Ciprofloxacina	<=1	S					
Clindamicina	>2	R					
Daptomicina	<=1	S					
Eritromicina	<=0.5	S					
Fosfomicina	<=32	S					
Gentamicina	8	1					
Levofloxacina	2	1					
Linezolid	<=2	S					
Mupirocina	<=256	S					
Nitrofurantoina	<=32						
Oxacilina	>2	R			Paralle and		
Penicilina	>0.25	R*					
Pristinamicina	>2	R					
Screening de Cefoxitina	>4	POS			×		
Synercid	>4	R					
Teicoplanina	4	S					
Tetraciclina	>8	R		4			
Tobramicina	8	1		01			
Trimet/Sulfa	<=2/38	S	Dr. JOHNNY FRANCE	CO PAZ SALDARRIAGA			0005
Vancomicina	2	S	Médico Pa	ólogo Clínico 61 - RE 23280		*	
			CENTRO NACIONA	ALDE SALUD RENAL		£1	
/ Laure			ESS	ALUD	*		
(Jaus C)					^ ×		
Lic. NANCY JACQUE! NE ARANZABAL	DURAND						
Técnologo Midico en Labora			-			35	
CTMP. 3443							
JENTRO NACIONAL DE SALUD	HENAL			25.			

Interpretación predictiva sensible

ESBL= BLEE... Betalactamasa de expectro extendido

Interpretación predictiva resistente

Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.

Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ¡Sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos

Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ¡Sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos

Beta-lactamacos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos. EBL?

Intermedio

Resistente

mcg/ml (mg/L)

= Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.

probado Betalactamasa positiva

Cepa timidin resistente

Blac TFG

No probado

Positivo

Negativo

POS

NEG