

Asszociációs mértékek

Solymosi Norbert

Kvantitatív állatorvosi epidemiológia

Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Állatorvostudományi Egyetem

2020. október 21.

- leíró epidemiológia (eddig)
- analitikus epidemiológia
 - a feltételezett oki tényező és a betegség közötti összefüggést vizsgálja a populációban
 - abszolút és relatív asszociációs mértékek segítségével fejezzük ki, hogy a kitettség milyen mértékben változtatja a betegség megjelenését
- típusai
 - klinikai vizsgálatok
 - megfigyeléses vizsgálatok
 - keresztmetszeti az egyedek kitettségi vagy egészségi állapotuktól függetlenül kerülnek a mintába
 - eset-kontroll az egyedek egészségi állapotuk alapján kerülnek a mintába
 - kohorsz az egyedek kitettségük alapján kerülnek a mintába
 - prospektív vagy retrospektív

Összefüggés?

- Lyme borreliózis
 - fertőzött várandósok között a születési rendellenességek gyakoriságát befolyásolja-e az antibiotikum-kezelés?(Lakos and Solymosi, 2010)
 - az életkor hogyan és milyen mértékben függ össze a szeropozitivitással?(Lakos et al., 2012)
- Dirofilaria
 - a melegebb területeken nagyobb a D. immitis vagy D. repens fertőzöttség mértéke?(Farkas et al., 2020)
- Endoscopic retrograde cholangiopancreatography
 - a ERCP után kialakuló pankreatitisz esélyét milyen mértékben csökkenti az indomethacin rektális alkalmazása?(Patai et al., 2015)
- Halvaszületés
 - az első ellés során nagyobb a halvaszületés esélye?(Szenci et al., 2018)
- COVID-19
 - a COVID-19 betegek felgyógyulására van-e hatása a túlsúllynak?(Nakeshbandi et al., 2020)

Kitettség

- Lyme borreliózis
 - fertőzött várandósok között a születési rendellenességek gyakoriságát befolyásolja-e az **antibiotikum-kezelés**?
 - az **életkor** hogyan és milyen mértékben függ össze a szeropozitivitással?
- Dirofilaria
 - a **melegebb** területeken nagyobb a D. immitis vagy D. repens fertőzöttség mértéke?
- Endoscopic retrograde cholangiopancreatography
 - a ERCP után kialakuló pankreatitisz esélyét milyen mértékben csökkenti az **indomethacin** rektális alkalmazása?
- Halvaszületés
 - az **első ellés** során nagyobb a halvaszületés esélye?
- COVID-19
 - a COVID-19 betegek felgyógyulására van-e hatása a **túlsúllynak**?

Kimenet

- Lyme borreliózis
 - fertőzött várandósok között a **születési rendellenességek** gyakoriságát befolyásolja-e az antibiotikum-kezelés?
 - az életkor hogyan és milyen mértékben függ össze a **szeropozitivitással**?
- Dirofilaria
 - a melegebb területeken nagyobb a D. immitis vagy D. repens **fertőzöttség** mértéke?
- Endoscopic retrograde cholangiopancreatography
 - a ERCP után kialakuló **pankreatitisz** esélyét milyen mértékben csökkenti az indomethacin rektális alkalmazása?
- Halvaszületés
 - az első ellés során nagyobb a **halvaszületés** esélye?
- COVID-19
 - a COVID-19 betegek **felgyógyulására** van-e hatása a túlsúllynak?

- Lyme borreliózis
 - fertőzött várandósok között a születési rendellenességek gyakoriságát befolyásolja-e az antibiotikum-kezelés?
 - az életkor hogyan és milyen mértékben függ össze a szeropozitivitással?
- Dirofilaria
 - a melegebb területeken nagyobb a D. immitis vagy D. repens fertőzöttség mértéke?
- Endoscopic retrograde cholangiopancreatography
 - a ERCP után kialakuló pankreatitisz esélyét milyen mértékben csökkenti az indomethacin rektális alkalmazása?
- Halvaszületés
 - az első ellés során nagyobb a halvaszületés esélye?
- COVID-19
 - a COVID-19 betegek felgyógyulására van-e hatása a túlsúllynak?
- ha azonosítani tudunk a kimenettel kapcsolatba hozható tényezőket, az támpontot jelenthet további vizsgálatok irányába (még ha nem is ismertük meg a pontos oktant)
- ha a kockázatot tudjuk kezelni, a betegség kezelésére is van esélyünk

A szokásos 2×2 táblázat

	Betegség+	Betegség−	Σ
Kitettség+	a	b	$a + b$
Kitettség−	c	d	$c + d$
Σ	$a + c$	$b + d$	$a + b + c + d$

dichotóm helyzetben

A szokásos 2×2 táblázat

	Betegség+	Betegség−	Σ
Kitettség+	a	b	$a + b$
Kitettség−	c	d	$c + d$
Σ	$a + c$	$b + d$	$a + b + c + d$

A betegség kockázata a kitett csoportban:

$$R_{E+} = \frac{a}{a + b}$$

dichotóm helyzetben

A szokásos 2×2 táblázat

	Betegség+	Betegség−	Σ
Kitettség+	a	b	$a + b$
Kitettség−	c	d	$c + d$
Σ	$a + c$	$b + d$	$a + b + c + d$

A betegség kockázata a nem kitett csoportban:

$$R_{E-} = \frac{c}{c + d}$$

A szokásos 2×2 táblázat


	Betegség+	Betegség−	Σ
Kitettség+	a	b	$a + b$
Kitettség−	c	d	$c + d$
Σ	$a + c$	$b + d$	$a + b + c + d$

A betegség kockázata a teljes populációban:


$$R_T = \frac{a + c}{a + b + c + d}$$

dichotóm helyzetben


Esettanulmányok és esetsorozatok




Keresztmetszeti vizsgálatok




Eset-kontroll vizsgálatok



Kohorsz vizsgálatok



Randomizált klinikai (kontrollált) vizsgálatok



Randomized Controlled Trial, RCT

Nakeshbandi et al. (2020) a túlsúlynak a COVID-19 kimenetre vonatkozó hatását vizsgálta (kohorsz).

- a 139 normál testsúlyú beteg közül 51 halt meg
- a 150 túlsúlyos beteg közül 81 halt meg
- van kapcsolat a túlsúly és a halálozás között?
- ha van, akkor milyen erősségű?

Nakeshbandi et al. (2020) a túlsúlynak a COVID-19 kimenetre vonatkozó hatását vizsgálta (kohorsz).

- a 139 normál testsúlyú beteg közül 51 halt meg
- a 150 túlsúlyos beteg közül 81 halt meg
- van kapcsolat a túlsúly és a halálozás között?
- ha van, akkor milyen erősségű?

	Halál+	Halál–	Σ
Túlsúlyos	81	69	150
Normál	51	88	139
Σ	132	157	289

$$R_{E+} = \frac{81}{150} = 540 \text{ eset} / 1000$$

$$R_{E-} = \frac{51}{139} = 367 \text{ eset} / 1000$$

$$R_T = \frac{132}{289} = 457 \text{ eset} / 1000$$

Van kapcsolat a túlsúly és a halálozás között?

- a 139 normál testsúlyú beteg közül 51 halt meg
- az incidencia-kockázat a túlsúlyos betegek között
 $R_{E+} = 81/150 = 540$ eset per 1000
- a 150 túlsúlyos beteg közül 81 halt meg
- az incidencia-kockázat a normál testsúlyú betegek között
 $R_{E-} = 51/139 = 367$ eset per 1000

Van kapcsolat a túlsúly és a halálozás között?

- a 139 normál testsúlyú beteg közül 51 halt meg
- az incidencia-kockázat a túlsúlyos betegek között
 $R_{E+} = 81/150 = 540$ eset per 1000
- a 150 túlsúlyos beteg közül 81 halt meg
- az incidencia-kockázat a normál testsúlyú betegek között
 $R_{E-} = 51/139 = 367$ eset per 1000
- Ha az R_{E+} , R_{E-} és R_T értékeket meghatároztuk, különböző asszociációs mértékeket számolhatunk ki
- Fő típusaik:
 - hatásmértékek
 - összhatás-mértékek
 - terápiás hatás mértékei
 - az összefüggés erősségének mértékei

Felróható kockázat: a kitettek közötti incidencia-kockázatnak az a része, ami a kitettségnek tulajdonítható

$$AR = R_{E+} - R_{E-}$$

Felróható kockázat: a kitettek közötti incidencia-kockázatnak az a része, ami a kitettségnek tulajdonítható

$$AR = R_{E+} - R_{E-}$$

	Halál+	Halál–	Σ
Túlsúlyos	81	69	150
Normál	51	88	139
Σ	132	157	289

$$R_{E+} = \frac{81}{150} = 540 \text{ eset} / 1000$$

$$R_{E-} = \frac{51}{139} = 367 \text{ eset} / 1000$$

$$AR = 540 - 367 = 173 \text{ eset} / 1000$$

attributable risk, AR

Felróható kockázat: a kitettek közötti incidencia-kockázatnak az a része, ami a kitettségnek tulajdonítható

$$AR = R_{E+} - R_{E-}$$

	Halál+	Halál–	Σ
Túlsúlyos	81	69	150
Normál	51	88	139
Σ	132	157	289

$$R_{E+} = \frac{81}{150} = 540 \text{ eset} / 1000$$

$$R_{E-} = \frac{51}{139} = 367 \text{ eset} / 1000$$

$$AR = 540 - 367 = 173 \text{ eset} / 1000$$

- a COVID-19 betegek között a túlsúlynak tulajdonítható (1000 főre vonatkoztatott) 173 haláleset
- a betegség kitettségnek megfeleltethető esetszám-növekményének abszolút értékét adja meg

attributable risk, AR

Felróható hányad: a kitettségnek felróható betegek részaránya a kitettek között

$$AF = \frac{R_{E+} - R_{E-}}{R_{E+}}$$

Felróható hányad: a kitettségek felróható betegek részaránya a kitettek között

$$AF = \frac{R_{E+} - R_{E-}}{R_{E+}}$$

	Halál+	Halál–	Σ
Túlsúlyos	81	69	150
Normál	51	88	139
Σ	132	157	289

$$R_{E+} = \frac{81}{150} = 540 \text{ eset} / 1000$$

$$R_{E-} = \frac{51}{139} = 367 \text{ eset} / 1000$$

$$AF = \frac{540 - 367}{540} = 0.32$$

attributable fraction, AF

Felróható hányad: a kitettségek felróható betegek részaránya a kitettek között

$$AF = \frac{R_{E+} - R_{E-}}{R_{E+}}$$

	Halál+	Halál–	Σ
Túlsúlyos	81	69	150
Normál	51	88	139
Σ	132	157	289

$$R_{E+} = \frac{81}{150} = 540 \text{ eset} / 1000$$

$$R_{E-} = \frac{51}{139} = 367 \text{ eset} / 1000$$

$$AF = \frac{540 - 367}{540} = 0.32$$

- a kitett betegek kitettségéből származtatható részaránya
- a túlsúlyosak közti halálozás 32%-a tulajdonítható a túlsúlynak

attributable fraction, AF

Populációs felróható kockázat: a kitettségnek felróható incidencia-kockázat a teljes populációban

$$PAR = R_T - R_{E-}$$

Populációs felróható kockázat: a kitettségnek felróható incidencia-kockázat a teljes populációban

$$PAR = R_T - R_{E-}$$

	Halál+	Halál–	Σ
Túlsúlyos	81	69	150
Normál	51	88	139
Σ	132	157	289

$$R_{E-} = \frac{51}{139} = 367 \text{ eset} / 1000$$

$$R_T = \frac{132}{289} = 457 \text{ eset} / 1000$$

$$PAR = 457 - 367 = 90 \text{ eset} / 1000$$

population attributable risk, PAR

Populációs felróható kockázat: a kitettségnek felróható incidencia-kockázat a teljes populációban

$$PAR = R_T - R_{E-}$$

	Halál+	Halál–	Σ
Túlsúlyos	81	69	150
Normál	51	88	139
Σ	132	157	289

$$R_{E-} = \frac{51}{139} = 367 \text{ eset} / 1000$$

$$R_T = \frac{132}{289} = 457 \text{ eset} / 1000$$

$$PAR = 457 - 367 = 90 \text{ eset} / 1000$$

- a COVID-19 betegek között a halálozás kockázatából 90 eset (1000 főre vetítve) tulajdonítható a túlsúlynak (PAR=0.09)

population attributable risk, PAR

Populációs felróható hányad: a betegség populációbeli, a kitettségnek felróható részaránya

$$PAF = \frac{R_T - R_{E-}}{R_T}$$

Populációs felróható hányad: a betegség populációbeli, a kitétségnek felróható részaránya

$$PAF = \frac{R_T - R_{E-}}{R_T}$$

	Halál+	Halál–	Σ
Túlsúlyos	81	69	150
Normál	51	88	139
Σ	132	157	289

$$R_{E-} = \frac{51}{139} = 367 \text{ eset} / 1000$$

$$R_T = \frac{132}{289} = 457 \text{ eset} / 1000$$

$$PAF = \frac{457 - 367}{457} = 0.20$$

population attributable fraction, PAF

Populációs felróható hányad: a betegség populációbeli, a kitettségnek felróható részaránya

$$PAF = \frac{R_T - R_{E-}}{R_T}$$

	Halál+	Halál–	Σ
Túlsúlyos	81	69	150
Normál	51	88	139
Σ	132	157	289

$$R_{E-} = \frac{51}{139} = 367 \text{ eset} / 1000$$

$$R_T = \frac{132}{289} = 457 \text{ eset} / 1000$$

$$PAF = \frac{457 - 367}{457} = 0.20$$

- annak a valószínűsége, hogy a populációból véletlenszerűen kiválasztott egyed a kitettség következtében beteg
- a COVID-19 betegek között a halálozások 20%-a tulajdonítható a túlsúlynak

population attributable fraction, PAF

Hogyan határozhatjuk meg egy új gyógyszer hatását?

Eseményráta (event rate) a populációban az eseménnyel érintett egyedek részaránya


Abszolút kockázatcsökkenés (absolute risk reduction, ARR) a kontroll és a kezelt eseményráta különbsége;

Abszolút kockázatonövekedés (absolute risk increase, ARI) a kezelt és a kontroll eseményráta különbsége;

Relatív kockázatcsökkenés (relative risk reduction, RRR) két csoport eseményrátáinak különbsége a nem kezelt csoport eseményráta részarányaként kifejezve

Kezelési minimum (number needed to treat, NNT) azoknak a betegeknek a száma, akiknek részesülnie kell a kezelésben, hogy egyiküknél kedvező eredményt kapjunk ($NNT = 1/ARR$)

Ártalmi minimum (number needed to harm, NNH) azoknak a betegeknek a száma, akiknek részesülnie kell a kezelésben, hogy egyiküknél kedvezőtlen eredményt kapjunk ($NNH = 1/ARI$)

Csoport ■ nem kezelt ■ kezelt


Tegyük fel, hogy egy új gyógyszer hatását vizsgáljuk **magas kockázatú** (pl. idős férfiak) COVID-19 betegek között

Abszolút kockázatcsökkenés:

$$0.4 - 0.3 = 0.1$$

Relatív kockázatcsökkenés:

$$\frac{0.4 - 0.3}{0.4} = \frac{0.1}{0.4} = 0.25$$

Csoport ■ nem kezelt ■ kezelt


*Ugyanazt a gyógyszert egy
alacsonyabb kockázatú (pl. fiatal
nők) csoportban is alkalmazták*

Abszolút kockázatcsökkenés:

$$0.1 - 0.075 = 0.025$$

Relatív kockázatcsökkenés:

$$\frac{0.1 - 0.075}{0.1} = \frac{0.025}{0.1} = 0.25$$

Csoport ■ nem kezelt ■ kezelt

Abszolút kockázatcsökkenés:

Nagyobb kockázat: $0.4 - 0.3 = 0.1$

Kisebb kockázat:

$$0.1 - 0.075 = 0.025$$

Relatív kockázatcsökkenés:

$$\text{Nagyobb kockázat: } \frac{0.4 - 0.3}{0.4} = 0.25$$

$$\text{Kisebb kockázat: } \frac{0.1 - 0.075}{0.1} = 0.25$$


Az abszolút kockázatcsökkenés kisebb, ha az eseményráta alacsonyabb, míg a relatív kockázatcsökkenés („kezelés hatékonysága”) kevésbé érzékeny az eseményráta mértékére.

Kezelési minimum (NNT)

Nagyobb kockázat:
$$\text{NNT} = \frac{1}{0.4 - 0.3} = \frac{1}{0.1} = 10$$

Kisebb kockázat:
$$\text{NNT} = \frac{1}{0.1 - 0.075} = \frac{1}{0.025} = 40$$

- ha egy kezelés NNT-je 10:
 - tíz beteget kell kezelnünk ahhoz, hogy egy betegnél kedvező eredményt kapjunk
 - minden beteg esetén 1/10 annak a valószínűsége, hogy a kezelés jótékony hatású
- ha az abszolút kockázatcsökkenés nagy, akkor kevesebb beteg kezelésénél is kapunk már legalább egy kedvező eredményt
- ha az abszolút kockázatcsökkenés kicsi, akkor sok beteget kell kezelnünk ahhoz, hogy keveseknél jótékony hatást tapasztaljunk




Relatív kockázat (RR): a kitett és a nem kitett csoporton belüli incidencia-kockázat hányadosa.

$$RR = \frac{R_{E+}}{R_{E-}} = \frac{540 \text{ eset} / 1000}{367 \text{ eset} / 1000} = 1.47$$

Értelmezése: a halál bekövetkeztének kockázata 1.47-szer nagyobb a túlsúlyos betegek között, mint a normál testsúlyúak között.

Közlésének formája $RR=1.47$ (95% CI: 1.13 - 1.92).



Amennyiben a kockázatban eltöltött idő is rendelkezésre áll, akkor az incidencia-ráták (IR) hányadosa: a kitettek között számított incidencia-ráta osztva a nem kitettek incidencia-rátájával.

Incidencia-kockázat (vagy incidencia-ráta) **hányadosa**:

- becslést ad arra vonatkozóan, hogy a kitettek között hányszor nagyobb a betegség előfordulásának kockázata, mint a nem kitettek között
- ha $RR = 1$:
 - a kitettek és nem kitettek között az előfordulás kockázata megegyezik
- ha $RR > 1$:
 - a kitettség növeli a betegség kockázatát, amennyivel nagyobb 1-nél, annál nagyobb mértékben
- ha $RR < 1$:
 - a kitettség (pl. kezelés) csökkenti a betegség kockázatát
- nem becsülhető eset-kontroll vizsgálatokban, mivel a kontrollokra nem számítható incidencia \rightarrow OR



Kockázat $\frac{3}{10} = 0.30$

Esély $\frac{3}{7} = 0.43$

Esélyhányados: kohorsz vizsgálatok

- a betegség esélye a kitettek között osztva a betegség esélyével a nem kitettek között

odds ratio, OR

Esélyhányados: kohorsz vizsgálatok

- a betegség esélye a kitettek között osztva a betegség esélyével a nem kitettek között

	Betegség+	Betegség–	Σ
Kitettség+	a	b	$a + b$
Kitettség–	c	d	$c + d$
Σ	$a + c$	$b + d$	$a + b + c + d$

A betegség esélye a kitettek között

$$O_{E+} = \frac{a}{b}$$

Esélyhányados: kohorsz vizsgálatok

- a betegség esélye a kitettek között osztva a betegség esélyével a nem kitettek között

	Betegség+	Betegség−	Σ
Kitettség+	a	b	$a + b$
Kitettség−	c	d	$c + d$
Σ	$a + c$	$b + d$	$a + b + c + d$

A betegség esélye a nem kitettek között

$$O_{E-} = \frac{c}{d}$$

Esélyhányados: kohorsz vizsgálatok

- a betegség esélye a kitettek között osztva a betegség esélyével a nem kitettek között

	Betegség+	Betegség–	Σ
Kitettség+	a	b	$a + b$
Kitettség–	c	d	$c + d$
Σ	$a + c$	$b + d$	$a + b + c + d$

A betegség esélye a teljes populációban

$$O_T = \frac{a + c}{b + d}$$

Esélyhányados: kohorsz vizsgálatok

- a betegség esélye a kitettek között osztva a betegség esélyével a nem kitettek között

	Betegség+	Betegség−	Σ
Kitettség+	a	b	$a + b$
Kitettség−	c	d	$c + d$
Σ	$a + c$	$b + d$	$a + b + c + d$

$$OR = \frac{O_{E+}}{O_{E-}}$$

$$O_{E+} = \frac{a}{b}, O_{E-} = \frac{c}{d}$$

Esélyhányados: kohorsz vizsgálatok

- a betegség esélye a kitettek között osztva a betegség esélyével a nem kitettek között

	Halál+	Halál–	Σ
Túlsúlyos	81	69	150
Normál	51	88	139
Σ	132	157	289


$$O_{E+} = \frac{81}{69} = 1.17$$

$$O_{E-} = \frac{51}{88} = 0.58$$

$$OR = \frac{1.17}{0.58} = 2.02 \text{ (95\% CI: 1.26 - 3.24)}$$

- a betegség esélye adott kitettség mellett
- értékének értelmezése mint az RR-nél

odds ratio, OR



Esélyhányados: eset-kontroll vizsgálatokban

- a kitettség esélye a betegek között osztva a kitettség esélyével a nem betegek között

Esélyhányados: eset-kontroll vizsgálatokban

- a kitettség esélye a betegek között osztva a kitettség esélyével a nem betegek között

	Betegség+	Betegség−	Σ
Kitettség+	a	b	$a + b$
Kitettség−	c	d	$c + d$
Σ	$a + c$	$b + d$	$a + b + c + d$

Esély a betegek között

$$O_{D+} = \frac{a}{c}$$

Esélyhányados: eset-kontroll vizsgálatokban

- a kitettség esélye a betegek között osztva a kitettség esélyével a nem betegek között

	Betegség+	Betegség−	Σ
Kitettség+	a	b	$a + b$
Kitettség−	c	d	$c + d$
Σ	$a + c$	$b + d$	$a + b + c + d$

Esély a nem betegek között

$$O_{D-} = \frac{b}{d}$$

Esélyhányados: eset-kontroll vizsgálatokban


- a kitettség esélye a betegek között osztva a kitettség esélyével a nem betegek között

	Betegség+	Betegség−	Σ
Kitettség+	a	b	$a + b$
Kitettség−	c	d	$c + d$
Σ	$a + c$	$b + d$	$a + b + c + d$

$$OR = \frac{O_{D+}}{O_{D-}}$$

$$O_{D+} = \frac{a}{c}, O_{D-} = \frac{b}{d}$$

Kohorsz	Eset-kontroll
<i>Sorrend</i>	
1. Kitettségi státusz számbavétele	1. Egészségi státusz számbavétele
2. Egészségi státusz számbavétele	2. Kitettségi státusz számbavétele
<i>Összefüggés erősségének mértéke</i>	
RR vagy OR	OR
<i>Az esélyhányados értelmezése</i>	
a betegség esélye a kitettek között	a kitettség esélye a betegek között
a nem kitettek köztihez hasonlítva	a nem betegek köztihez hasonlítva



sértéstelepek
 Aujeszky-féle betegségre
 vonatkozó
 szeropozitivitásának a
 jelzett sugáron belül
 előforduló környezeti
 tényezőkkel való
 kapcsolata

Nodal status

Positive
Negative

Tumour size


≤2 cm
>2 cm

Receptor status

Positive
Negative
Unknown

Previous chemotherapy

Yes
No

All patients

- az alcsoportok konfidencia-intervalluma mindig tágabb, mint az összes mintából számított (CI függ a minta méretétől)
- ha a főhatás jelentősen eltér a hatástalansági értéktől, akkor az azzal átfedő alcsoport konfidencia-intervallum nem jelent hatástalanságot
- a főhatást jelző egyenes hasznos abban, hogy láthatóvá teszi alcsoportok eltérését attól, pl. hogy ha az alcsoport konfidencia-intervalluma nem fed át vele, akkor jelentősen eltér az összhatástól

	Kedvezőtlen kimenet		
	+	-	Σ
Nem kezelt	6	4	10
Per os AB	6	13	19
Σ	12	17	29

Kedvezőtlen kimenetek:

cavernous hemangioma, cerebral bleeding, dysplasia coxae, hypospadias, muscular hypotonicity, neonatal jaundice requiring exchange transfusion, papulovesicular eruption at birth, premature birth pyloric stenosis, skeletal anomaly, small for dates, spontaneous abortion, stillbirth

OR: 3.11, 95% CI: 0.51 - 21.60, $p=0.2359$

- ha a $p > 0.05$, a 95%CI tartalmazza az 1-et, az eredmény STATISZTIKAILAG nem szignifikáns
- a p azt fejezi ki, hogy mi a valószínűsége annak, hogy az OR értéke legalább 3.11 legyen, ha a VALÓDI OR egyenlő eggyel
- a p nem annak a valószínűsége, hogy a H_0 igaz, csak a MEGFIGYELT érték extremitását fejezi ki, ha H_0 igaz

(Lakos and Solymosi, 2010)

m

Kezelés

Kimenet nem per os

+ 6 6

- 4 13

fisher.test(m)

Fisher's Exact Test for Count Data

data: m

p-value = 0.2359

alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1

95 percent confidence interval:

0.5125188 21.6033358

sample estimates:

odds ratio

3.111034


```
(dupla_m = m*2)
```

```
Kezelés
```

```
Kimenet nem per os
```

```
+ 12      12
```

```
- 8       26
```

```
fisher.test(dupla_m)
```

```
Fisher's Exact Test for Count Data
```

```
data: dupla_m
```

```
p-value = 0.05108
```

```
alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
```

```
95 percent confidence interval:
```

```
0.9190679 11.6961091
```

```
sample estimates:
```

```
odds ratio
```

```
3.179755
```

- elhanyagolható különbség jelentős különbséget eredményez, $p = 0.051$ még nem szignifikáns statisztikailag, $p = 0.049$ már igen

```
(tripla_m = m*3)
```

Kezelés

Kimenet nem per os

+ 18 18

- 12 39

```
fisher.test(tripla_m)
```

Fisher's Exact Test for Count Data

data: tripla_m

p-value = 0.01285

alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1

95 percent confidence interval:

1.17897 9.04624

sample estimates:

odds ratio

3.202991

Képzelt vizsgálat

- betegek A- és B-kezelésben részesültek
- megkérdezték tőlük, hogy melyiket tartották jobbnak


Kezelt betegek száma	A vagy B kezelést preferálják	A-t preferálók részaránya (%)	p-érték
20	15 : 5	75.00	0.04
200	115 : 86	57.00	0.04
2 000	1046 : 954	52.30	0.04
2 000 000	1 001 445 : 998 555	50.07	0.04

- a p-érték minden mintaelemszámnál 0.04
- növelve a mintaelemszámot egyre kisebb preferencia-eltérés is ugyanolyan szignifikáns p-értékkel jár

(Spiegelhalter et al., 2004)


BEWARE FALSE CONCLUSIONS

Studies currently dubbed 'statistically significant' and 'statistically non-significant' need not be contradictory, and such designations might cause genuine effects to be dismissed.



WRONG INTERPRETATIONS

An analysis of 791 articles across 5 journals* found that around half mistakenly assume non-significance means no effect.



*Data taken from: P. Schatz et al. *Arch. Clin. Neuropsychol.* **20**, 1053–1059 (2005); F. Fidler et al. *Conserv. Biol.* **20**, 1539–1544 (2006); R. Hoeksma et al. *Psychon. Bull. Rev.* **13**, 1033–1037 (2006); F. Bernardi et al. *Eur. Sociol. Rev.* **33**, 1–15 (2017).

- Amrhein, V., S. Greenland, and B. McShane (2019). Scientists rise up against statistical significance. *Nature* 567(7748), 305–307.
- Cuzick, J. (2005). Forest plots and the interpretation of subgroups. *The Lancet* 365(9467), 1308.
- Farkas, R., V. Mag, M. Gyurkovszky, N. Takács, K. Vörös, and N. Solymosi (2020). The current situation of canine dirofilariosis in Hungary. *Parasitology research* 119(1), 129–135.
- Lakos, A., Z. Igari, and N. Solymosi (2012). Recent lesson from a clinical and seroepidemiological survey: low positive predictive value of borrelia burgdorferi antibody testing in a high risk population. *Advances in medical sciences* 57(2), 356–363.
- Lakos, A. and N. Solymosi (2010). Maternal lyme borreliosis and pregnancy outcome. *International Journal of Infectious Diseases* 14(6), e494–e498.
- Nakeshbandi, M., R. Maini, P. Daniel, S. Rosengarten, P. Parmar, C. Wilson, J. M. Kim, A. Oommen, M. Mecklenburg, J. Salvani, et al. (2020). The impact of obesity on covid-19 complications: a retrospective cohort study. *International Journal of Obesity* 44(9), 1832–1837.
- Noordhuizen, J. P. T. M., K. Frankena, M. Thrusfield, and E. A. M. Graat (2001). *Application of Quantitative Methods in Veterinary Epidemiology*. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Pers.
- Patai, Á., N. Solymosi, and Á. V. Patai (2015). Effect of rectal indomethacin for preventing post-ercp pancreatitis depends on difficulties of cannulation. *Journal of clinical gastroenterology* 49(5), 429–437.
- Solymosi, N., J. Reiczigél, O. Berke, A. Harnos, S. Szigeti, L. Fodor, G. Szigeti, and K. Bódis (2004). Spatial risk assessment of herd sero-status of Aujeszky's disease in a county in Hungary. *Preventive veterinary medicine* 65(1-2), 9–16.
- Spiegelhalter, D. J., K. R. Abrams, and J. P. Myles (2004). *Bayesian approaches to clinical trials and health-care evaluation*, Volume 13. John Wiley & Sons.
- Stevenson, M. (2012). An introduction to veterinary epidemiology. EpiCentre, IVABS, Massey University, Palmerston North, New Zealand.
- Stevenson, M. (2019). *epiR: Tools for the Analysis of Epidemiological Data*. R package version 1.0-4.
- Szenci, O., M. K. Abdelmegeid, N. Solymosi, E. Brydl, C. Á. Bajcsy, I. Biksi, and M. Kulcsár (2018). Prediction of stillbirth in holstein-friesian dairy cattle by measuring metabolic and endocrine parameters during the peripartur period. *Reproduction in Domestic Animals* 53(6), 1434–1441.
- Thrusfield, M., R. Christley, H. Brown, P. J. Diggle, N. French, K. Howe, L. Kelly, A. O'Connor, J. Sargeant, and H. Wood (2018). *Veterinary Epidemiology* (4th ed.). Oxford, UK: Wiley.