


一、簡介

這個照顧寶寶的遊戲分成兩關，處理傷口，以及調製食品。想要切換關卡，就到門邊的牆壁按下圖的電燈開關，就結束這關，進到下一關。



二、傷口處理

1. 操作流程



受傷的地方：膝蓋

等寶寶開始哭+流血之後，玩家依照順序把：紗布、棉花棒、藥膏、貼布，在時間內放到傷口(膝蓋)上，就算完成任務。

2. 提示線索

提示玩家的特效包含：寶寶的反應、傷口的變化、socket hover 時的畫面，以及可以 grab 的物體被 hover 的顏色變化。

i. 寶寶的反應：

反應	畫面	原因	如何應對
哭		傷口還沒處理完。	利用傷口狀態判斷
流血			拿紗布止血


抓癢+生氣		擦太多藥	棉花棒擦掉一些藥膏
碰傷口+沒表情		擦完藥後有點癢	貼上 ok 繃
傷口紅腫		還沒擦藥/清潔傷口、碰傷口破皮	利用做過的事情判斷。
傷口發紫		擦太多藥後抓破皮	棉花棒擦掉一些藥膏
開心+拍手		完成了	

ii. 物件互動的提示

情境	說明	畫面
Grab hover	物體周圍亮藍光	
Socket select enter	Socket 顯示藍影	

二、調製食品

流程圖如下。



1. 操作流程

玩家首先去廚房洗手，廚房桌面上會有奶粉罐、小湯匙、熱水壺及空奶瓶四個物件。桌面上方有一張寶寶的個人資料，玩家對照寶寶資訊跟奶粉罐上的調配比例進行奶粉調配。（180 ml、3 平匙）

調配順序：

- 水加熱至超過 70 度（有提示字，熱水器上的加熱按鍵碰到即開始加熱）
- 倒入奶瓶（控制在 180 毫升上下，不小心倒超過的話可把奶瓶傾斜倒出多餘的水並重新加入熱水）
- 挖三匙奶粉倒入瓶中（記得刮平）
- 蓋上奶瓶蓋
- 此時會跳出提示字要求玩家搖勻奶瓶
- 回到房間
- 此時配方奶還在 70 度上下，因此房間桌面上會有一個放涼區，奶瓶放上去待時鐘跑一圈即完成放涼步驟
- 調配完成，可以開始餵奶。把奶瓶湊近寶寶的嘴巴，寶寶會停止動作看著奶瓶，碰到嘴巴寶寶便會開始吸奶的動作（可自由將寶寶移至椅子或餵食方便的地方）
- 依據泡奶流程中的失誤，寶寶會有嘔吐或者生氣兩種不同反應，若寶寶持續吸奶的動作則表示步驟全部正確
- 其中需注意「餵完奶之前」要記得幫寶寶拍背（設定為至少三下），若沒拍背就一次餵完，寶寶會吐奶！

2. 提示線索



調配比例及寶寶個人資料



Ellen Jager
Baby: Andrew
Age: 10 months
Gender: Boy
Weight: 9.8 KG

水量 (公升)	嬰兒年齡	奶粉量 (g)
3.5	0-2 星期	60
4.5 - 5.5	2 星期-3 個月	120
6.5	3-6 個月	180
7.5	6 個月以上	180

放涼區提示



放涼區

3. 寶寶反應

情境	反應	成功 or 失敗
步驟正確	喝完奶後開心拍手	成功
泡奶步驟正確但是餵奶中間沒有拍背	喝完奶後嘔吐+哭	失敗
沒有洗手/水未加熱到至少70度	寶寶喝幾口後就會嘔吐+哭	失敗
其他失誤（奶太燙、調配比例不對）	寶寶一碰到奶嘴便會生氣的撇開頭並站起來然後開始哭	失敗