



ขนาดยา การผสมยา และ วิธีการให้ยา Co-trimoxazole

Co-trimoxazole (Bactrim[®]) เป็นยาด้านจุลชีวะผสมระหว่าง Trimethoprim (TMP) และ Sulfamethoxazole (SMX) มีรูปแบบทั้งยาชนิดรับประทานและฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ดังนี้

- ชนิดรับประทาน ได้แก่ single strength (SS) tablet – TMP 80 mg/SMX 400 mg
double-strength (DS) tablet –TMP 160 mg/SMX 800 mg
- ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ 1 amp/5 mL ประกอบด้วย TMP 80 mg/SMX 400 mg

ขนาดยา co-trimoxazole ที่แนะนำตามข้อบ่งชี้ที่พบบ่อย รวมถึงการปรับขนาดยาตามค่าการทำงานของไต CrCl แสดงดังตารางที่ 1 และ 2 ตามลำดับ (ขนาดยาขึ้นกับขนาดของ trimethoprim เป็น mg/kg/day)

สำหรับการผสมและวิธีการให้ยา co-trimoxazole ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 1 ขนาดยา Co-trimoxazole ที่แนะนำตามข้อบ่งชี้ที่พบบ่อย

ข้อบ่งชี้ที่พบบ่อย	ขนาดยา Co-trimoxazole ที่แนะนำ
Melioidosis (<i>Burkholderia pseudomallei</i>) infection	
Initial intensive therapy (add-on to primary therapy [cefazidime/carbapenem] in focal disease of the CNS, prostate, bone, joint, skin, or soft tissue) Duration: $\geq$ 14 days	Oral, IV - BW 40-60 kg: 240 mg (ของยา TMP) วันละ 2 ครั้ง - BW >60 kg: 320 mg (ของยา TMP) วันละ 2 ครั้ง
Eradication therapy (begin after completion of initial intensive therapy)	Oral - BW 40 to 60 kg: 240 mg (ของยา TMP) วันละ 2 ครั้ง - BW >60 kg: 320 mg (ของยา TMP) วันละ 2 ครั้ง
Pneumocystis pneumonia for Treatment	
Moderate to severe infection	IV: 15 to 20 mg/kg/day (ของยา TMP) โดยแบ่งให้ 3-4 ครั้งต่อวัน
Mild to moderate infection	Oral: - 15 to 20 mg/kg/day (ของยา TMP) โดยแบ่งให้ 3 ครั้งต่อวัน - TMP/SMX (80/400 mg) 4 เม็ด วันละ 3 ครั้ง
<i>Toxoplasma gondii</i> encephalitis for treatment	
- Treatment at least 6 weeks - Longer duration may be needed if clinical or radiologic disease is extensive or response is incomplete at 6 weeks	Oral, IV: 10 mg/kg/day (ของยา TMP) โดยแบ่งให้ 2 ครั้งต่อวัน
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i> infections	
- HAP/VAP, bacteremia, or other sites - Duration depends on site of infection (For immunocompetent host & clinical improvement) • Bacteremia 14 days • Pneumonia 7 days	IV: 15 mg/kg/day (ของยา TMP) โดยแบ่งให้ 3-4 ครั้งต่อวัน

ตารางที่ 2 ขนาดยา Co-trimoxazole ที่แนะนำตามค่าการทำงานของไต CrCl

CrCl (ml/min)	ขนาดยา Co-trimoxazole ที่แนะนำ
> 30 และ CRRT	ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา
≤ 30, CAPD และ HD	ลดขนาดยาลงร้อยละ 50 ของขนาดยาที่แนะนำ *ตัวอย่าง ขนาดยาที่แนะนำ 15-20 mg/kg/day แนะนำลดขนาดยาเป็น 7.5-10 mg/kg/day

ตัวย่อ CAPD= continuous ambulatory peritoneal dialysis, HD=hemodialysis, CRRT=continuous renal replacement therapy

หมายเหตุ Dialyzable: trimethoprim 44% และ sulfamethoxazole 57%

ตารางที่ 3 การผสมและวิธีการให้ยา co-trimoxazole ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ

ยาด้านจุลชีพ	สารละลาย	ปริมาณ	ความคงตัว (hr)	Infusion rate (min)
Co-trimoxazole 1 amp/5mL	D5W	125 mL	6	60-90
	D5W	100 mL	4	
	D5W	75 mL	2	

หมายเหตุ แนะนำผสมยา co-trimoxazole ในสารละลาย dextrose เท่านั้น และ เก็บยา ณ อุณหภูมิห้อง ไม่นำไปแช่ตู้เย็น

ตัวอย่างวิธีการบริหารยา co-trimoxazole ที่พบบ่อย

TMP/SMX 2 amp + D5W 150 mL IV drip in 60-90 min q 8-12 hr

TMP/SMX 3 amp + D5W 250 mL IV drip in 60-90 min q 8-12 hr

TMP/SMX 4 amp + D5W 300 mL IV drip in 60-90 min q 8-12 hr

**ยา co-trimoxazole เป็นยาที่ตกตะกอนได้ง่ายหากผสมยาด้วยสารละลายโซเดียม (NSS) หรือ ผสมด้วยความเข้มข้นหรือระยะเวลาการให้ยาไม่เหมาะสม รวมถึงการนำยาแช่ตู้เย็น