

คำแนะนำการบริหารยา

Dantrolene sodium (Revonto™) 20 mg/vial

จัดทำโดย งานเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.นพรัตนราชธานี 9 พ.ค. 2565

1. ข้อบ่งใช้

- Malignant hyperthermia ซึ่งเป็นปฏิกิริยาจากการดมยาสลบ
- ควบคุมภาวะ hyperthermia และ rhabdomyolysis จาก Neuroleptic malignant syndrome (NMS)

2. ขนาดยา

- รักษา malignant hyperthermia¹⁻² และ neuroleptic malignant syndrome³⁻⁴

ขนาดยาเริ่มต้น 1-2.5 mg/kg IV bolus อย่างรวดเร็ว หากยังไม่ตอบสนองสามารถให้ซ้ำ 1 mg/kg IV bolus ทุก 6 ชั่วโมง โดยขนาดยาสะสมไม่ควรเกิน 10 mg/kg

- ป้องกัน malignant hyperthermia²

2.5 mg/kg ก่อนให้ยาระงับความรู้สึก 1 ชม. 15 นาที โดยให้ IV infusion ประมาณ 1 ชั่วโมง


(ขนาดยาข้างต้นเป็นคำแนะนำที่ได้รวบรวมและสรุปมาจากเอกสารอ้างอิง ทั้งนี้ขนาดยาที่ใช้ในคนไข้แต่ละราย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์และการตอบสนองของผู้ป่วย)

3. วิธีการผสมยา^{2,5}

Revonto 1 vial ประกอบด้วยยา dantrolene 20 mg การผสมยาให้ใช้ sterile water 60 ml เท่านั้น เขย่าสารละลายอย่างแรงอย่างน้อย 20 วินาที จนใส ควรบริหารทางหลอดเลือดดำ ส่วนกลางหรือหลอดเลือดดำใหญ่ เพื่อป้องกัน venous thrombosis หากต้องการให้ยาแบบ IV infusion ให้ใช้ syringe pump และป้องกันด้วยวัสดุทึบแสง

ข้อห้ามในการผสมยาเพราะจะทำให้ยาตกตะกอน² คือ

1. ห้ามใช้ปริมาณ sterile water น้อยกว่า 60 mL
2. ห้ามผสมหรือเจือจางยาด้วยสารน้ำชนิดอื่น
3. ห้ามถ่ายยาใส่ลงในภาชนะที่เป็นแก้ว



QR code วิดีโอสาธิต

วิธีการผสมยา Dantrolene

เอกสารอ้างอิง

1. Malignant hyperthermia. 2020. Guideline from the Association of Anaesthetists.
2. Package insert Revonto™
3. Neuroleptic malignant syndrome: a review for neurohospitalists. Neurohospitalist. 2011
4. Neuroleptic malignant syndrome: a guide for psychiatrists. BJ Psych Advances 2020.
5. ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2562 เรื่อง แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อ Malignant Hyperthermia และผู้ป่วยที่มีอาการของ Malignant Hyperthermia