


วิธีการเตรียมยา Hypercrit®

- 1.ล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด เช็ดมือให้แห้ง
- 2.หักแอมพูลที่บรรจุน้ำสำหรับละลายผงยา (sterile water for injection) โดยใช้สำลีสวยในการจับส่วนหัวของแอมพูล แล้วออกแรงหัก




- 3.เปิดฝาคครอบจุกยางของขวดผงยาออก (ถ้ามี) เช็ดจุกยางด้วยสำลีสวยแอลกอฮอล์
- 4.นำกระบอกฉีดยา (syringe) ที่สะอาดออกจากภาชนะบรรจุ แล้วนำหัวเข็มฉีดยาเบอร์ 20 ประกอบเข้าด้วยกัน


- 5.นำกระบอกฉีดยาดูดน้ำสำหรับละลายผงยาขึ้นมาจากแอมพูล ปริมาณ 1 มิลลิลิตร




- 6.แทงเข็มฉีดยาให้ทะลุจุกยาง ฉีดน้ำสำหรับละลายยาเข้าสู่ขวดยาช้าๆ จนหมด แล้วดึงเข็มฉีดยาออกจากจุกยาง



- 7.รอให้ผงยาละลายหมดจนได้สารละลายใส โดยกลิ้งขวดยาในแนวตั้งบนฝ่ามือเบาๆ **ไม่เขย่าขวดยา**





- 8.เช็ดจุกยางด้วยสำลีสวยแอลกอฮอล์อีกครั้ง นำกระบอกฉีดยาดูดอากาศเข้ามาในกระบอกฉีดยาให้มีปริมาตรเท่าที่ต้องการ นำเข็มฉีดยาแทงทะลุจุกยาง ค่อยๆ ขวดยาที่มีเข็มปักค้างอยู่ลงค่อยๆ ดูดสารละลายยาเข้าไปในเข็มฉีดยาในขนาดที่ต้องการ




- 10.เปลี่ยนหัวเข็มฉีดยาเป็นเบอร์ 27 ประกอบเข้ากับกระบอกฉีดยา

- 11.ไล่ฟองอากาศจากเข็มฉีดยา โดยหงายเอาหัวเข็มขึ้นด้านบน แล้วใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางเคาะเบาๆ ที่กระบอกฉีดยา และค่อยๆ ดันก้านสูบขึ้นจนมียาออกจากเข็มเล็กน้อย




วิธีฉีดยา Hypercrit®

- 1.ใช้สำลีสวยแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะฉีดยา




วิธีฉีดยา Hypercrit® (ต่อ)

2. ใช้มือดึงผิวหนังบริเวณที่จะฉีดยาให้ตึงขึ้น ใช้มืออีกข้างจับเข็มฉีดยาคล้ายกับการจับปากกา แล้วแทงมุม 45-90 องศา แล้วค่อยฉีดยา erythropoietin โดยกดก้านกระบอกฉีดยาจนสุด ค้างไว้สักครู่หนึ่ง




3. ดึงเข็มออก แล้วใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์กดผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา (ไม่ควรคลึงนวดบริเวณที่ฉีดยา) ปิดปลอกเข็ม โดยไม่ต้องเช็ดปลายเข็ม



4. บันทึกการฉีดยา erythropoietin ทันทีทุกครั้ง

บริเวณที่สามารถฉีดได้



- สามารถฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังได้ที่บริเวณท้อง หน้าขา สะโพก และต้นแขน
- ในการฉีดแต่ละครั้ง ควรเปลี่ยนตำแหน่งฉีดยาให้ห่างจากตำแหน่งหลังสุดประมาณ 1 นิ้ว

วิธีการเก็บรักษา

1. เก็บในตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส และห้ามใส่ช่องแช่แข็ง
2. เก็บยาให้พ้นจากแสง
3. ตรวจสอบดูวันหมดอายุก่อนใช้งาน

แผ่นพับ

วิธีการใช้ยา Hypercrit®

(Recombinant human erythropoietin)



ใน 1 ชุดประกอบด้วย

- ขวดผงยา
- น้ำสำหรับละลายยา
- กระบอกฉีดยา
- หัวเข็มขนาด 20 และ 27 อย่างละ 1 ขนาด