

วิธีเตรียมยา Recormon®

Pre-filled syringe

1. ล้างมือให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง
2. หยิบกระบอกฉีดยาที่บรรจุยาแล้วออกจากซอง ตรวจดูว่าน้ำยา

ใสไม่ขุ่นและไม่มีตะกอน ดังจุกยาง

ออกจากปลายกระบอกฉีดยา

3. หยิบเข็มออกจากซอง 1 เข็มสวม
เข็มเข้ากับปลายกระบอกฉีดยา และ
ดึงฝาครอบเข็มออก



4. ถีอกระบอกฉีดยาในแนวตั้งชี้
ปลายเข็มขึ้น เคาะไล่อากาศออก
ค่อยๆ ดันกระบอกสูบขึ้นจน
ปริมาณในกระบอกฉีดยามีปริมาตร
เท่าที่แพทย์สั่ง




วิธีฉีดยา Recormon®

Pre-filled syringe

บริเวณที่สามารถฉีดได้

- สามารถฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังได้ที่
บริเวณท้อง หน้าขา สะโพก และ
ต้นแขน
- ในการฉีดแต่ละครั้ง ควรเลื่อน
ตำแหน่งฉีดยาให้ห่างจากตำแหน่ง
หลังสุดประมาณ 1 นิ้ว



วิธีการฉีด

1. ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์
ทำความสะอาดผิวหนัง
บริเวณที่จะฉีดยา



2. ใช้มือตึงผิวหนังบริเวณที่จะ

ฉีดยาให้ตึงขึ้น ใช้มืออีกข้างจับ

เข็มฉีดยาคล้ายกับการจับปากกา

แล้วแทงมุม 45-90 องศา

แล้วค่อยฉีด erythropoietin

โดยกดก้านกระบอกฉีดยาจนสุด ค้างไว้สักครู่หนึ่ง

3. ดึงเข็มออก แล้วใช้สำลีชุบ



แอลกอฮอล์กดผิวหนังบริเวณที่

ฉีด (ไม่ควรคลึงนวดบริเวณ

ที่ฉีด) ปิดปลอกเข็มโดยไม่ต้อง

เช็ดปลายเข็ม

4. บันทึกการฉีด erythropoietin ทันทีทุกครั้ง



วิธีใช้ยา Recormon®

Pre-filled syringe



รูปแบบเข็มสำเร็จรูป 1 เข็ม
สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น

วิธีการเก็บรักษา

1. เก็บในตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส และห้ามใส่ช่องแช่แข็ง

2. เก็บยาให้พ้นจากแสง

3. ตรวจสอบวันหมดอายุก่อนใช้งาน