

การเตรียมยา vancomycin ชนิดรับประทาน

ยา vancomycin 500 mg/1 vial



SWFI 8 mL



(ความเข้มข้น 125 mg/2 mL)



Vancomycin 125 mg รับประทาน ทุก 6 hr

ดูดสารละลาย vancomycin 2 mL

ผสมกับน้ำให้ได้ปริมาตรรวม

- 10-30 mL สำหรับดื่มทางปาก หรือ
- 30-50 mL สำหรับ NG tube

Vancomycin 500 mg รับประทาน ทุก 6 hr

ดูดสารละลาย vancomycin 8 mL

ผสมกับน้ำให้ได้ปริมาตรรวม

- 10-30 mL สำหรับดื่มทางปาก หรือ
- 30-50 mL สำหรับ NG tube

Clin Infect Dis. 2018 Mar 19;66(7):e1-e48. doi: 10.1093/cid/cix1085.

Data Update 07-01-2021

การเตรียมยา vancomycin ชนิดสวนเข้าทางทวารหนัก (rectal suppository)

ยา vancomycin 500 mg/1 vial



NSS 100 mL



- จัดทำให้ผู้ป่วยนอนตะแคง
- ให้อาหารผ่าน foley catheter (ขนาด 18 นิ้ว)
- ร่วมกับ 30 cc balloon inflate
- Clamp สายหลังจากให้อาหารเป็นระยะเวลา 1 hr

Clin Infect Dis. 2018 Mar 19;66(7):e1-e48. doi: 10.1093/cid/cix1085.

Surg Infect (Larchmt). May/June 2019;20(4):311-316. doi: 10.1089/sur.2018.238. Epub 2019 Feb 4.

Data Update 07-01-2021