

แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนังบ้า และคำถามที่พบบ่อย


ปรับปรุงล่าสุด มกราคม 2568


้วัคซีนพิษสุนัขบ้าที่มีจำหน่ายในประเทศไทย แบ่งตามขบวนการผลิต ดังนี้

Purified Vero Cell Rabies Vaccine (PVRV) Chromatographically Purified Vero Cell ได้แก่ Verorab[®], Abhayrab[®]

Rabies Vaccine (CPRV) ได้แก่ Speeda®

Purified Chick Embryo Cell Rabies Vaccine (PCECV) ได้แก่ Rabipur®, ChiroRab[®]





^{*} ตำแหน่งการบริหาร IM ได้แก่ DELTOID ในผู้ใหญ่, ANTEROLATERAL THIGH ในเด็กเล็ก (ห้ามฉีดวัคซีนเข้าสะโพกเนื่องจากกระตุ้นภูมิได้ไม่ดี)

คำถามที่พบบ่อย


1. การเปลี่ยน*ชนิด***วัคซีน** ควรทำเฉพาะกรณีจำเป็น เท่านั้น เช่น วัคซีนขาดแคลน โดยมีคำแนะนำ ดังนี้

- IM : สามารถเปลี่ยนไปใช้วัคซีนที่มีขบวนการผลิต ี้ต่างกับทดแทนได้ แล้วให้วัคซีนหนิดที่เปลี่ยนไปจน ครบการรักษา
- ID : สามารถเปลี่ยนได้ แต่ให้ให้วัคซีนที่มีขบวนการ ผลิตเหมือนกัน เช่น ชนิด vero cell เหมือนกัน หรือ chick embryo เหมือนกัน

<u>2. ผู้ที่มาฉีดวัคซีน*ไม่ตรงตามนัด*</u>

โดยทั่วไปสามารถฉีดวัคซีนต่อได้เลย ไม่จำเป็นต้องเริ่ม ้ฉีดใหม่ โดยนับต่อจากเง็มสดท้ายที่ผ้ป่วยได้รับ และคงระยะ ห่างของแต่ละเง็มที่เหลือดังเดิม ไม่มีความจำเป็นต้องเริ่มต้น ฉีดใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าผู้ป่วยจะมาล่าช้านานเท่าใด





4. การฉีดวัคซีนเง็ม*กระต้นภายหลัง*ส้มผัสโรค

- 🔾 กรณีได้รับวัคซีนเง็มสุดท้าย มาไม่เกิน 6 เดือน
 - ให้ฉีด ID 1 เง็ม หรือ IM 1 เง็ม
- 🔾 กรณีได้รับวัคซีนเง็มสุดท้าย มามามกว่า 6 เดือน
- ให้ฉีด ID 1 เง็ม ที่ day 0, 3 **))** หรือ IM 1 เง็ม ที่ day 0, 3

เอกสารอ้างอิง

1.สุดา พันธุ์รินทร์, นุจรีนารถ คูหาเกษมสิน, ณัฐิยา อาทรชัยกุล, รีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร, บรรณาธิการ. เวชปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกสัตว์กัดและการป้องกันโรคพิษสุนังบ้า. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: พี.เอ. ลีฟวิ่ง; 2565. 2.สดา พันธ์รินทร์, ฐานเพชร ตัณฑวิเชียร. แนวทางการดูแลรักษาผู้สับผู้สโรคพิษสนังบ้า สถานเสาวภา สภากาชาดไทย พ.ศ.2561 และคำถามที่พบบ่อย, พิมพ์ครั้งที่ 1. กรงเทพฯ: เพนตากอน แอ็ดเวอร์โทซึ่ง; 2561.