

МГТУ им. Н. Э. Баумана

Отчет по лабораторной работе №6 по предмету «Вычислительные  
алгоритмы»  
«Построение и программная реализация алгоритмов численного  
дифференцирования»

Выполнила Параскун София,  
ИУ7-44Б  
Проверил  
Градов В. М.

Москва, 2021 г.

**Цель работы:** получение навыков построения алгоритма вычисления производных от сеточных функций.

## 1. Задание

Задана табличная (сеточная) функция. Имеется информация, что закономерность, представленная этой таблицей, может быть описана формулой  $y = a_0x / (a_1 + a_2x)$ ; параметры функций неизвестны и определять их ненужно.

x	y	1	2	3	4	5
1	0.571					
2	0.889					
3	1.091					
4	1.231					
5	1.333					
6	1.412					

Вычислить первые разностные производные от функции и занести их в столбцы (1)-(4) таблицы:

- 1 — односторонняя разностная производная,
- 2 — центральная разностная производная,
- 3 — 2-я формула Рунге с использованием односторонней производной,
- 4 — введены выравнивающие переменные,
- 5 — 2-я разностная производная.

## 2. Код программы

Программа состоит из файла main.py.

```
from math import pow
```

```
class Differentiate:
    def __init__(self):
        self.h = 1.0
        self.x = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
        self.y = [0.571, 0.889, 1.091, 1.231, 1.333, 1.412]
        self.y1 = [0 for i in range(6)]
        self.y2 = [0 for i in range(6)]
        self.y3 = [0 for i in range(6)]
        self.y4 = [0 for i in range(6)]
        self.y5 = [0 for i in range(6)]

    def output(self):
        print(" x | y | 1 | 2 | 3 | 4 | 5")
```

```

print("-" * 70)
for i in range(6):
    print(" {0} |{1:7.3f}|{2:10.3f}|{3:10.3f}|{4:10.3f}|{5:10.3f}|{6:10.3f}").format(self.x[i], self.y[i], self.y1[i], self.y2[i], self.y3[i], self.y4[i], self.y5[i]))

def calc(self):
    self.leftDif()
    self.centerDif()
    self.secondRungeDif(1)
    self.alignedCoeffsDif()
    self.secondLeftDif()

def leftDif(self):
    for i in range(len(self.y)):
        if i == 0:
            self.y1[i] = 0.0
        else:
            self.y1[i] = (self.y[i] - self.y[i - 1]) / self.h

def centerDif(self):
    for i in range(len(self.y)):
        if i == 0 or i == len(self.y) - 1:
            self.y2[i] = 0.0
        else:
            self.y2[i] = (self.y[i + 1] - self.y[i - 1]) / 2 * self.h

def secondRungeDif(self, p):
    yTmp = []
    for i in range(len(self.y)):
        if i < 2:
            yTmp.append(0)
        else:
            yTmp.append((self.y[i] - self.y[i - 2]) / (2 / self.h))

    for i in range(len(self.y1)):
        if i < 2:
            self.y3[i] = 0.0
        else:
            self.y3[i] = self.y1[i] + (self.y1[i] - yTmp[i]) / (pow(2, p) - 1)

def alignedCoeffsDif(self):
    for i in range(len(self.y)):
        if i == len(self.y) - 1:
            self.y4[i] = 0.0
        else:
            k = pow(self.y[i], 2) / pow(self.x[i], 2)
            self.y4[i] = k * (((-1.0 / self.y[i + 1]) - (-1.0 / self.y[i])) / ((-1.0 / self.x[i + 1]) - (-1.0 / self.x[i])))

def secondLeftDif(self):
    for i in range(len(self.y)):
        if i == 0 or i == len(self.y) - 1:
            self.y5[i] = 0.0
        else:
            self.y5[i] = (self.y[i - 1] - 2 * self.y[i] + self.y[i + 1]) / pow(self.h, 2)

```

```

if __name__ == "__main__":
    print("Lets start!")
    calc = Differentiate()
    calc.__init__()
    calc.calc()
    calc.output()

```

### 3. Результаты работы

x	y	1	2	3	4	5
1	0.571	null	null	null	0.408	null
2	0.889	0.318	0.260	null	0.247	-0.116
3	1.091	0.202	0.171	0.144	0.165	-0.062
4	1.231	0.140	0.121	0.109	0.118	-0.038
5	1.333	0.102	0.090	0.083	0.089	-0.023
6	1.412	0.079	null	0.068	null	null

1 – левосторонняя формула точностью  $O(h)$ ;

2 – центральная формула точностью  $O(h^2)$ ;

3 – вторая формула Рунге (с использованием левосторонней формулы);

4 — применение выравнивающих переменных (из-за того, что параметры неизвестны, оценка точности затруднительна). Было использовано соотношение

$$y'_x = \frac{\eta'_\xi y^2}{x^2}$$

5 — вторая разностная производная.

#### 4. Вопросы при защите лабораторной работы

1. Получить формулу порядка точности  $O(h^2)$  для первой разностной производной  $y'_N$  в крайнем правом узле  $x_N$ .

$$\begin{aligned}y_{N-1} &= y_N - hy'_N + \frac{h^2}{2!}y''_N - \frac{h^3}{3!}y'''_N \dots \\y_{N-2} &= y_N - 2hy'_N + \frac{4h^2}{2!}y''_N - \frac{8h^3}{3!}y'''_N \dots \\y'_N &= \frac{3y_N - 4y_{N-1} + y_{N-2}}{2h} + \frac{h^2}{3}y'''_N \\y'_N &= \frac{3y_N - 4y_{N-1} + y_{N-2}}{2h} + O(h^2)\end{aligned}$$

2. Получить формулу порядка точности  $O(h^2)$  для второй разностной производной  $y''_0$  в крайнем левом узле  $x_0$ .

$$\begin{aligned}y_1 &= y_0 + hy'_0 + \frac{h^2}{2!}y''_0 - \frac{h^3}{3!}y'''_0 \dots \\y_2 &= y_0 + 2hy'_0 + \frac{4h^2}{2!}y''_0 - \frac{8h^3}{3!}y'''_0 \dots\end{aligned}$$

Проведем преобразования — домножим  $y_1$  на 4 и вычтем  $y_2$

$$\begin{aligned}4y_1 - y_2 &= 4y_0 - y_0 + 2hy'_0 + O(h^2) \\y'_0 &= \frac{-3y_0 + 4y_1 - y_2}{2h} + O(h^2) \\y''_0 &= \frac{-y_3 + 4y_2 - 5y_1 + 2y_0}{h^2} + O(h^2)\end{aligned}$$

3. Используя 2-ю формулу Рунге, дать вывод выражения (9) из лекции №7 для первой производной  $y'_0$  в левом крайнем узле

$$y'_0 = \frac{-3y_0 + 4y_1 - y_2}{2h} + O(h^2).$$

$$\begin{aligned}
\Omega &= \Phi(h) + \frac{\Phi(h) - \Phi(mh)}{m^p - 1} + O(h^{p+1}) = \\
&= \frac{y_{n+1} - y_n}{h} + \frac{\frac{y_{n+1} - y_n}{h} - \frac{y_{n+2} - y_n}{2h}}{2^1 - 1} + O(h^2) = \\
&= \frac{-3y_n + 4y_{n+1} - y_{n+2}}{2h} + O(h^2)
\end{aligned}$$

Для левого узла  $n = 0$ ,  $n + 1 = 1$ ,  $n + 2 = 2$ , откуда  $y'_0 = \frac{-3y_0 + 4y_1 - y_2}{2h} + O(h^2)$

4. Любым способом из лекций №7, 8 получить формулу порядка точности  $O(h^3)$  для первой разностной производной  $y'_0$  в крайнем левом узле  $x_0$ .

$$\begin{aligned}
y_1 &= y_0 + hy'_0 + \frac{h^2}{2!}y''_0 + \frac{h^3}{3!}y'''_0 \dots \\
y_2 &= y_0 + 2hy'_0 + \frac{4h^2}{2!}y''_0 + \frac{8h^3}{3!}y'''_0 \dots \\
y_3 &= y_0 + 3hy'_0 + \frac{9h^2}{2!}y''_0 + \frac{27h^3}{3!}y'''_0 \dots \\
y' &= \frac{y_3 + 27y_1 - 28y_0}{30h} + O(h^3)
\end{aligned}$$