SOOSIANA, 2: 59-60, 1974

Pintér, L.:
Az Öregkő-hegy csigái Bajótnál Die Schnecken des Öregkő-Berges

bei Bajót /Gerecse-Gebirge/

In dieser kleinen Notiz möchte ich die Aufmerksamkeit der Malakologen auf eines der am wenigsten erforschten
Gebiete Ungarns lenken: auf das Gerecse-Gebirge. Die bisher
publizierten Angaben sind so spärlich, dass man unmöglich
einen Überblick über die Molluskenfauna, über die Zusammenhänge der Verbreitung der Arten gewinnen kann. Dass es sich
lohnt, eine gründliche Erforschung des Gebietes einzuleiten,
soll durch das Beispiel des Öregkő-Berges beleuchtet werden.

Zwischen Bajót und Mogyorósbánya liegt der 375 m hohe, waldbedeckte Öregkő, am NO-Rand des Gebirges. Die schroff abfallende Ostseite mit ihren Karsthöhlen bietet mannigfaltige Unterschlupfmöglichkeiten für Landschnecken.

Die über 9000 Exemplare sind während sieben Aufsammlungen zwischen 1960 und 1966 gesammelt worden. Beachtenswert ist das Fehlen solcher Arten, die im nahegelegenen Pilis-Gebirge recht häufig vorkommen, wie Orcula dolium, Discus perspectivus, Perforatella incarnata, Trichia unidentata, usw. Die Anzahl der jeweils gesammelten Exemplare steht nach den Artennamen in Klammern. Eine ökológische Auswertung des Materials steht noch aus.

Cochlicopa lubricella /177/ Orcula doliolum /51/
Pyramidula rupestris /1617/ Granaria frumentum/1491/
Truncatellina cylindr. /775/ Chondrina clienta /602/
Vertigo pusilla /1/ Pupilla muscorum /1/
Truncatellina claustr. /19/ Pupilla triplicata /56/
Vertigo pygmaea /1/ Vallonia pulchella /546/
Vallonia costata /1314/ Aegopinella minor /205/
Acanthinula aculeata /24/ Oxychilus glaber /58/

Ena obscura	/98/	Oxychilus inopinatus	/23/
Zebrina detrita	/31/	Oxychilus depressus	/1/
Cochlodina laminata	/1/	Daudebardia rufa	/8/
Clausilia dubia	/1522/	Deroceras reticulatum	/2/
Laciniaria plicata	/173/	Euconulus fulvus	1501
Laciniaria biplicata	/6/	Helicella obvia	/19/
Punctum pygmaeum	/33/	Euomphalia strigella	/4/
Vitrina pellucida	/257/	Cepaea vindobonensis	151
Vitrea contracta	/1.4/		557

Összefoglalás. A szerző felsorolja a malakológiailag még kevéssé ismert Gerecse ÉK-i peremén fekvő Öregkőn /375 m/gyűjtött csigákat. Feltűnő, hogy több olyan faj hiányzik, melyek a közeli Pilis-hegységben meglehetősen általánosan elterjedtek, pl. Orcula dolium, Discus perspectivus, Perforatella incarnata, Trichia unidentata. A zárójelben lévő számok a fajok darabszámát jelentik. A hét gyűjtés során /1960-1966/ összesen több mint 9000 példány csiga került elő.

XXXXXXXXXX