	REACCIONES ADVERSAS A LA APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA ESTIMULACION OVARICA CONTROLADA O PREPARACION ENDOMETRIAL		Código	
			PS-DC-056	
	Fecha de Vigencia	03/06/2022	Versión 1	Página 1 de 2

REACCIONES ADVERSAS A LA APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA ESTIMULACIÓN OVÁRICA CONTROLADA O PREPARACIÓN ENDOMETRIAL

Para Fertility Care, la seguridad del paciente es uno de los principales objetivos de nuestra atención, es por ello que lo invitamos a tener en cuenta la información suministrada sobre las posibles reacciones adversas más comunes derivadas de la aplicación de los medicamentos usados para la estimulación ovárica controlada y/o preparación endometrial.

MENOPUR

Las reacciones adversas observadas más frecuentemente en el tratamiento de Menopur en los ensayos clínicos son Síndrome de Hiperestimulación Ovárica (SHO), dolor de cabeza, dolor abdominal, distensión abdominal y dolor en el lugar de inyección. Ninguna de estas reacciones adversas ha sido notificada con un índice de incidencia de más del 5%.

GONAL

Los efectos adversos del fármaco Gonal-f pueden variar en función de la paciente. Mientras unas dicen tener múltiples síntomas negativos, otras afirman no sentir nada con esta medicación hormonal.

A continuación, vamos a comentar algunos efectos secundarios en función de su incidencia:

Trastornos muy frecuentes: afectan a más del 10% de las mujeres. Son el dolor de cabeza, las reacciones locales en el sitio de la inyección (dolor, enrojecimiento, moraduras, hinchazón y/o irritación) y la aparición de quistes ováricos.

Trastornos frecuentes afectan entre el 1% y el 10% de las mujeres. Son el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos, la diarrea, los retortijones y la distensión abdominal.


Trastornos muy raros: solamente afectan a menos del 0,01% de las mujeres. Son las reacciones alérgicas sistémicas leves (eritema, erupción cutánea, hinchazón facial, urticaria, edema y dificultad respiratoria). También es posible que haya un empeoramiento del asma.

BEMFOLA

Los efectos adversos más frecuentes de Bemfola (observados en más de un paciente de cada 10) son reacciones en el lugar de inyección (dolor, enrojecimiento, cardenales, hinchazón o irritación). Bemfola no debe administrarse a personas que sean hipersensibles (alérgicas) a la folitropina alfa, la FSH o cualquiera de los otros componentes del medicamento. No debe utilizarse en pacientes con tumores de hipófisis o hipotálamo o con cáncer de mama, útero u ovario.

CETROTIDE

Los efectos adversos más frecuentes de Cetrotide (observados en 1 a 10 pacientes de cada 100) son sobreestimulación ovárica leve a moderada (que se puede producir como efecto adverso del propio procedimiento de estimulación ovárica) y reacciones locales en el punto de inyección, como enrojecimiento, hinchazón y picor. Se han notificado reacciones alérgicas graves y repentinas con Cetrotide y pueden afectar a entre 1 y 10 pacientes de cada 1,000. Cetrotide no debe administrarse a personas hipersensibles (alérgicas) a cetrorelix o a cualquiera de los demás componentes, a cualquier hormona similar en estructura a la hormona liberadora de gonadotropina o a las hormonas péptidas

 CLÍNICA DE FERTILIDAD	REACCIONES ADVERSAS A LA APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA ESTIMULACION OVARICA CONTROLADA O PREPARACION ENDOMETRIAL		Código	
			PS-DC-056	
	Fecha de Vigencia	03/06/2022	Versión 1	Página 2 de 2

extrínsecas (medicamentos basados en hormonas similares al Cetrotide). Cetrotide no debe administrarse a mujeres embarazadas o que estén dando pecho ni a pacientes que padezcan una insuficiencia renal grave.

GONAPEPTYL DAILY

La reducción de las hormonas sexuales hasta niveles plasmáticos por aplicación de Gonapeptyl® Daily puede producir: acaloramiento con sudoración, disminución de la libido, dispareunia, sequedad vaginal, hemorragias uterinas leves, cefalea, trastornos emocionales, trastornos vasomotores y trastornos del sueño. Se han reportado casos aislados de tromboflebitis. En un paciente se produjo simultáneamente una embolia pulmonar. En forma aislada se pueden observar reacciones alérgicas en la piel, poco tiempo después de inyectar Gonapeptyl® Daily, que remiten bien con tratamiento convencional. En raros casos pueden presentarse parestesias y migrañas severas. En casos graves y reiterados se indica la interrupción del tratamiento.

OVIDREL

Los efectos secundarios comunes pueden incluir:

Dolor de cabeza, depresión, irritabilidad, hinchazón, sensibilidad o hinchazón de las mamas o dolor donde el medicamento fue inyectado.

DECAPECTYL

Efectos adversos *frecuentes*, pueden afectar de 1 a 10 de cada 100 pacientes:

- Náuseas, sequedad de boca
- Dolor, morados, enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la inyección, dolor muscular y óseo, dolor en brazos y piernas, edema (concentración de líquidos en los tejidos corporales), dolor abdominal inferior
- Reacción alérgica
- Aumento de peso
- Mareos, dolor de cabeza
- Pérdida de libido, depresión, cambios de humor
- Aumento de la presión arterial

PERGOVERIS

Los efectos adversos más frecuentes de pergoveris (observados en más de 1 de cada 10 pacientes) son dolores de cabeza, quistes ováricos y reacciones en el lugar de la inyección (p. ej. dolor, picor, enrojecimiento, hematomas, inflamación o irritación).

Si usted presenta alguna reacción distinta a las anteriormente mencionadas, favor comunicarse con la línea de enfermería:

3103847152

¡En Fertility Care estamos comprometidos con la seguridad del paciente en todos los procesos!