

Dr. Adrián Yong Rodríguez**Pediatría, Alergología.****Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica MED8190**

Clínica Domingo Savio. Barrio el Molino, distrito Occidental, Calle 18, Avenida 20. Costado este de los Padres Salesianos

Teléfono: +506 4040 0016**Correo electrónico:** asmalergiasypediatria@gmail.com**Paciente:** Allan Steven Jimenez Fonseca
Peso:**Identificación** 305600805**Edad:** 14 años, 6 meses, 15 días


A quien interese.

Allan Steven Jimenez, tiene un angioedema provocado por AINES con alta inhibición de la COX 1, padece de una urticaria/angioedema que se va presentar al consumir cualquier AINES como: Acetaminofen dosis mayores a 1 gramo, Aspirina, Derivados del ácido heteroarílico (diclofenaco y ketorolaco), derivados del ácido arilpropionico (ibuprofeno, ketoprofeno), derivados del ácido endolacetico (indometacina o sulindaco), derivados del ácido enolico como el piroxicam.

Se permite utilizar solo AINES de la familia de la COX 2 como: Celebra y la arcoxia.

Ademas presenta síntomas de angioedema/urticaria por los opioides, esta reacción es una reacción adversa a medicamentos no inmunológica por liberación de histamina por la capacidad degranuladora del mastocito por los opioides.

En caso de necesitar opioides se debe de premedicar al paciente con Clorfeniramina 5mg via oral 30 minutos antes y prednisolone a una dosis de 1mg/kg/dia máximo 50mg, 11 hrs antes, 7 hrs antes y 1 hrs antes.



Firma Dr. Adrián Yong Rodríguez

