Fecha: _____
Nombre del paciente: _____ C.C _____
Estudio solicitado: _____Edad_____
Nombre del médico solicitante: _____Entidad: _____

EVALUACION DE FACTORES DE RIESGO A MEDIOS DE CONTRASTE:

Edad > de 60 años o < de1 año SI ___ NO ___
Estudios previos con Medios de contraste: SI __ No__Fecha_____Cuales_____
Antecedentes de Reacciones adversas a medios de contraste: SI__ NO_____
Reacciones adversas a medicamentos: SI___NO___ Cuales_____
Reacciones adversas a alimentos(Mariscos): SI__NO__
Enfermedades alérgicas: SI___NO_____Enfermedad renal: SI____NO_____
Enfermedad cardiovascular: SI_____NO____ Diabetes: SI_____NO_____
Medicación actual SI___NO_____
CUAL, SELECCIONE EL CASO: BETA BLOQUEANTES – LAXANTES – DIURETICOS – ANTICOAGULANTES-HIPOGLICEMIANTES.

INFORMACION DEL MEDIO DE CONTRASTE Y POSIBLE EFECTOS ADVERSOS

¿Qué es?Su médico tratante le ha solicitado un estudio con medio de contraste Intravenoso yodado, que es una sustancia que al inyectarse permite una mejor visualización de los órganos internos y ayuda a caracterizar las lesiones del organismo. Esta sustancia contiene yodo y puede generar reacciones adversas por lo tanto es importante que Ud. nos advierta de posibles alergias medicamentosas, asma, falla renal, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares o reacciones adversas anteriores al medio de contraste

¿Cómo se realiza? Para la administración del medio de contraste, le será canalizada una vena en el brazo, le será administrado el medio de contraste con inyección manual o utilizando un aparato mecánico llamado inyector para controlar exactamente la velocidad y el volumen de la inyección, podrá sentir una sensación de calor o frío y en algunas ocasiones un poco de náusea.

Después del examen podrá comer normalmente, debe tomar abundantes líquidos, y debe reiniciar sus medicamentos habituales.

¿Qué beneficios aporta?Cuando se introducen en el cuerpo, previo al examen por imagen diagnóstica, los materiales de contraste hacen que ciertas estructuras o tejidos del cuerpo se vean diferentes de lo que se verían si el material de contraste no hubiera sido administrado, ayudan a distinguir o "contrastar" las áreas del cuerpo seleccionadas de los tejidos circundantes.

Los materiales de contraste ayudan a los médicos a diagnosticar condiciones médicas ya que mejoran la visibilidad de órganos específicos, vasos sanguíneos o tejidos.

RIESGOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS DE CONTRASTE: Los medios de contraste yodado intravenoso poseen un riesgo de reacción, las cuales pueden variar

en severidad, desde reacciones menores hasta fatales, generalmente relacionadas o factores de riego que usted padece.

Reacciones leves: Náusea, vómito, sudoración, sensación de calor, alteración del gusto (sabor metálico), picazón generalizada, ampollas o enrojecimiento de la piel, dolor de cabeza, palidez generalizada, congestión nasal, mareo, escalofrío, edema facial o peri orbitario, ansiedad.

Reacciones Moderadas: Taquicardia, hipotensión, hipertensión, dificultad respiratoria, sibilancias, laringoespasmo, brocoespasmo.

Reacciones Severas: Anafilaxis, convulsiones, paro cardio - respiratorio.

En algunos casos se recomienda un esquema farmacológico de pre-medicación (como corticoides-antihistamínicos sin embargo la utilización de la medicación indicada, no asegura la inocuidad absoluta a medios de contraste radiológico iodados, pero disminuye la frecuencia de las reacciones adversas.

Extravasación de medio de contraste: A pesar de haber realizado una adecuada canalización de la vena, el medio de contraste puede salirse de la vena y producir dolor en el sitio de inyección, reacciones que usualmente es pasajera y ceden con medios físicos en el sitio del edema. Eventualmente se puede producir extensa irritación cutánea, la cual puede requerir manejo e intervención de otros especialistas.

Alternativas al examen: En el caso de la realización del TAC, puede no administrarse contraste, pero debe saber que la no administración del contraste intravenoso en esta exploración conlleva una menor sensibilidad de la misma. Esto quiere decir que existen ciertas lesiones que pueden pasar desapercibidas de no inyectar el contraste, con las consecuencias que de ello pudieran derivarse.

Si requiere más información acerca de este examen puede preguntar al médico quien aclarará cualquier duda.

Comprendo las explicaciones, que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el médico que me ha atendido me ha permitido realizar todas las preguntas y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. Por ello, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el alcance y los riesgos del procedimiento diagnóstico.

Por tanto, ACEPTO QUE SE ME REALICE LA APLICACION DEL MEDIO DE CONTRASTEPARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO QUE SE ME HA SOLICITADO.

_____ _____

Firma del paciente. Firma del Médico

c.c. C.C.

Yo_____ en calidad de_____

Nombre_____

Firma _____

c.c _____

FIRMO EN CONSTANCIA DE MI DESISTIMIENTO Y NEGATIVA AL EXAMEN TOMOGRAFIA CONTRASTADA solicitada y por lo tanto el médico queda eximido de toda responsabilidad.

El**RIESGO** es queestudios de Tomografía computarizada sin medio de contraste pueden ofrecer una información insuficiente para el estudio de su problema clínico, dará información limitada sobre algunos aspectos anatómicos y un diagnóstico inexacto.

_____ _____

Firma del paciente. Firma del Médico

c.c.

_____ _____

Firma del Testigo Firma del Tecnólogo

c.c.

Ciudad y fecha _____

En caso de denegar el motivo es:_____

HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL E.S.E	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD GUIA ADMINISTRACCION DE MEDIO DE CONTRASTE	
Código: HSR-ASS-ADT-P04-M01	**Versión: 01**	**Página: 1 de 1**
HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL E.S.E		

Anexo No 1

ENCUESTA PARA USO DE MEDIOS DE CONTRASTE

Nombre del Paciente_____ **Edad**_____

Identificación_____ **Peso**_____ **Creatinina**_____

- ✓ **Ayuno**: 6 horas.
- ✓ **Hidratación**: La adecuada hidratación del paciente disminuye significativamente el riesgo de toxicidad por medios de contraste.
- ✓ **Pacientes sin riesgo de nefropatía por medio de contraste y con vía oral conservada**: Abundante cantidad de líqido por vía oral 24 horas antes y 24 horas después. Asegurar diuresis al menos 2 lts día.
- ✓ **Pacientes con riesgo de nefropatía por medio de contraste y con vía oral suspendida:** Nefroprotección.

FACTORES DE RIESGO

Marque con una X la respuesta que corresponda según su condición.

PREGUNTA	SI	NO
¿Se ha hecho alguna vez este examen?		
¿Ha presentado reacción previa a los medios de contraste?		
¿Viene acompañado?		
¿Presenta alergias a algún medicamento?		
¿Presenta alergias a algún alimento?		
¿Presenta alergias a pescado, mariscos?		
¿Es asmático o tiene asma bronquial?		
¿Sufre insuficiencia renal?		
¿Es usted diabético?		
¿Toma usted Metformina?		
¿Tiene alguna enfermedad al corazón?		
¿Es hipertenso?		
¿Está en embarazo?		
¿Está lactando?		
¿Usa anticoagulante (aspirina)?		
¿Está en ayunas?		
¿Recibió quimioterapia en los últimos 6 meses?		
¿Recibió medio de CONTRASTE EN LAS ÚLTIMAS 72 HORAS?		

Respuesta afirmativa a la 2, 4,5, 6, 7,8, 10, 13,14 se debe informar al médico para manejo.

Fecha_____ Aplicada por: _____

_____

Firma del Paciente