HOSPITAL SAN RAFAEL	**SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD** **CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ADMINISTRACION DE MEDIOS DE CONTRASTE GADOLINIO**	
Código:	**Versión: 01**	**Página: 1 de 3**
HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL E.S.E		

Fecha: _____

Nombre del paciente: _____ C.C _____

Estudio solicitado: _____Edad_____

Nombre del médico solicitante: _____Entidad: _____

EVALUACION DE FACTORES DE RIESGO A MEDIOS DE CONTRASTE:

Edad > de 60 años o < de 1 año SI ___ No ___
Estudios previos con Medios de contraste: SI __ No
Antecedentes de Reacciones adversas a medios de contraste: SI__ NO_____
Reacciones adversas a medicamentos: SI___NO___ Cuales_____
Enfermedades alérgicas: SI___NO_____ Enfermedad renal: SI____NO_____
Enfermedad cardiovascular: SI_____NO____ Diabetes: SI_____NO_____

INFORMACION DEL MEDIO DE CONTRASTE Y POSIBLE EFECTOS ADVERSOS

¿Qué es? Su médico tratante le ha solicitado un estudio de resonancia magnética nuclear con uso de un medio de contraste endovenoso llamado gadolinio, que es una sustancia que al inyectarse permite una mejor visualización de los órganos internos y ayuda a caracterizar las lesiones del organismo.

¿Cómo se realiza? Para la administración del medio de contraste, le será canalizada una vena en el brazo, le será administrado el medio de contraste con inyección manual o utilizando un aparato mecánico llamado inyector para controlar exactamente la velocidad y el volumen de la inyección, podrá sentir una sensación de frio en el lugar de la inyección.

¿Qué beneficios aporta? Cuando se introducen en el cuerpo, previo al examen por imagen diagnóstica, los materiales de contraste hacen que ciertas estructuras o tejidos del cuerpo se vean diferentes de lo que se verían si el material de contraste no hubiera sido administrado, ayudan a distinguir o "contrastar" las áreas del cuerpo seleccionadas de los tejidos circundantes.
Los materiales de contraste ayudan a los médicos a diagnosticar condiciones médicas ya que mejoran la visibilidad de órganos específicos, vasos sanguíneos o tejidos.

RIESGOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS DE CONTRASTE: Los medios de contraste gadolinio intravenoso poseen un riesgo de reacción de hipersensibilidad pueden ser alérgicas (descritas como reacciones anafilácticas cuando son graves) o no alérgicas. Pueden producirse de forma inmediata (en menos de 60 minutos) o retardada (hasta 7 días después).

Reacciones leves: Entre ellas se cuentan náuseas, dolor de cabeza, dolor o sensación de frío en el lugar de la inyección y erupción cutánea.

Reacciones Moderadas: Taquicardia, hipotensión, hipertensión, dificultad respiratoria, sibilancias, laringoespasmo, brocoespasmo.

Reacciones Severas: Anafilaxis, fibrosis sistémica nefrogénica, convulsiones, paro cardio - respiratorio. Las reacciones anafilácticas ocurren inmediatamente y pueden ser mortales. Son independientes de la dosis, pueden aparecer incluso después de la primera dosis del producto y a menudo son imprevisibles, las cuales pueden variar en severidad:

Extravasación de medio de contraste: A pesar de haber realizado una adecuada canalización de la vena, el medio de contraste puede salirse de la vena y producir dolor en el sitio de inyección, reacciones que usualmente es pasajera y ceden con medios físicos en el sitio del edema.

Alternativas al examen: En el caso de la realización de RM, puede no administrarse contraste, pero debe saber que la no administración del contraste intravenoso en esta exploración conlleva una menor sensibilidad de la misma. Esto quiere decir que existen ciertas lesiones que pueden pasar desapercibidas de no inyectar el contraste, con las consecuencias que de ello pudieran derivarse.

Si requiere más información acerca de este examen puede preguntar al médico quien aclarará cualquier duda.

Comprendo las explicaciones, que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el médico que me ha atendido me ha permitido realizar todas las preguntas y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. Por ello, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el alcance y los riesgos del procedimiento diagnóstico.

Por tanto, **ACEPTO QUE SE ME REALICE LA APLICACION DEL MEDIO DE CONTRASTE PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO QUE SE ME HA SOLICITADO.**

_____
Firma del paciente.
c.c.

_____
Firma del Médico
C.C.

Yo_____en calidad de _____

Nombre_____

Firma _____ c.c_____

FIRMO EN CONSTANCIA DE MI DESISTIMIENTO Y NEGATIVA AL EXAMEN RESONANCIA MAGNETICA CONTRASTADA solicitada y por lo tanto el médico queda eximido de toda responsabilidad.

El **RIESGO** es que estudios de resonancia magnética sin medio de contraste pueden ofrecer una información insuficiente para el estudio de su problema clínico, dará información limitada sobre algunos aspectos anatómicos y un diagnóstico inexacto.

_____ _____

Firma del paciente. Firma del Médico

c.c.

_____ _____

Firma del Testigo Firma del Tecnólogo

c.c.

Ciudad y fecha _____

En caso de denegar el motivo es: _____