



PERIODON

Суваг халдваргүйжүүлэх ба үлдэгдэл зөөлцийг үхжүүлэх эмчилгээний бодис

ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ Neo Dental Chemical Products Co., Ltd. (Япон)

САВЛАЛТ 2 г гуурсан савлагаа

НАЙРЛАГА

- Параформальдегид: ойролцоогоор 50 г/100 г.
- Дибукайны гидрохлорид: ойролцоогоор 26 г/100 г; хэсгийн мэдээ алдуулагч.
- Сүүн цагаан, зуурамтгай, гялалзсан гадаргуутай паст.

ХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ

- Сувгийн халдваргүйжүүлэлт.
- Сувагт үлдсэн зөөлцийн эдийн үхжил.

ОНЦЛОГ, ҮЙЛЧЛЭЛ

- Параформальдегид нь хүчтэй, удаан хугацаанд ариутгах үйлчлэлтэй.
- Дибукайны найрлага нь хэсгийн мэдээ алдуулалт үзүүлж, эмчилгээний дараах өвдөлтийг багасгана.
- Зөөлц авсны дараах шинж тэмдгийг намдаахад хэрэглэнэ.

ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

- Нэг удаагийн хэрэглэх хэмжээ ойролцоогоор гүнжидийн үрийн хагастай тэнцэнэ.
- Тохирох хэмжээгээр ариутгасан хөвөн бөмбөлөг дээр авна.
- Сувагт оруулж, түр ломбоор хаана.
- Идэмхий шинж чанартай тул сувагт 7 хоногоос илүү хугацаагаар үлдээнэ.

АНХААРАХ ЗҮЙЛС

- Идэмхий шинж чанартай тул амны хөндийн салст, буйлны эдэд хүргэхээс зайлсхийж, rubber dam хэрэглэнэ.
- Зөөлөн эдэд туссан тохиолдолд шууд этанол, глицерин, ургамлын тос эсвэл усаар цэвэрлэнэ.
- Ховор тохиолдолд харшлын шок, анафилакси үүсч болзошгүй тул яаралтай тусламжийн бэлэн байдалтай ажиллана.
- Хэрэглэхийн өмнө өвчтөний эмнэлгийн болон харшлын түүхийг сайтар асууна.