

PERIODON

Суваг халдваргүйжүүлэх ба үлдэгдэл зөөлцийг
үхжүүлэх эмчилгээний бодис

ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ Neo Dental Chemical Products Co., Ltd. (Япон)

САВЛАЛТ 2 г гуурсан савлагаа



НАЙРЛАГА

Параформальдегид: ойролцоогоор 50 г/100 г.

Дибукайны гидрохлорид: ойролцоогоор 26 г/100 г; хэсгийн мэдээ алдуулагч.

Сүүн цагаан, зуурамтгай, гялалзсан гадаргуутай паст.

ХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ

Сувгийн халдваргүйжүүлэлт.

Сувагт үлдсэн зөөлцийн эдийн үхжил.

ОНЦЛОГ, ҮЙЛЧЛЭЛ

Параформальдегид нь хүчтэй, удаан хугацаанд ариутгах үйлчлэлтэй.

Дибукайны найрлага нь хэсгийн мэдээ алдуулалт үзүүлж, эмчилгээний дараах өвдөлтийг багасгана.

Зөөлц авсны дараах шинж тэмдгийг намдаахад хэрэглэнэ.

ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

1. Нэг удаагийн хэрэглэх хэмжээ ойролцоогоор гүнжидийн үрийн хагастай тэнцэнэ.
2. Тохирох хэмжээгээр ариутгасан хөвөн бөмбөлөг дээр авна.
3. Сувагт оруулж, түр ломбоор хаана.
4. Идэмхий шинж чанартай тул сувагт 7 хоногоос илүү хугацаагаар үлдээнэ.

АНХААРАХ ЗҮЙЛС

Идэмхий шинж чанартай тул амны хөндийн салст, буйлны эдэд хүргэхээс зайлсхийж, rubber dam хэрэглэнэ.

Зөөлөн эдэд туссан тохиолдолд шууд этанол, глицерин, ургамлын тос эсвэл усаар цэвэрлэнэ.

Ховор тохиолдолд харшлын шок, анафилакси үүсч болзошгүй тул яаралтай тусламжийн бэлэн байдалтай ажиллана.

Хэрэглэхийн өмнө өвчтөний эмнэлгийн болон харшлын түүхийг сайтар асууна.