MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN

DIIRECCION GENERAL
DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR
ANIMAL

SUBDIRECCION GENERAL
DE SANIDAD E HIGIENE ANIMAL
Y TRAZABILIDAD


ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE PESTE PORCINA AFRICANA

EN JABALÍES SILVESTRES EN CATALUÑA

29/12/2025

Los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat de Catalunya han notificado la **detección de un nuevo foco secundario de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes silvestres**. Se trata de dos animales hallados muertos dentro de la zona de alto riesgo delimitada por el radio de 6 kilómetros de los casos iniciales.

Con éste ascienden a once los focos notificados hasta la fecha, 3 de ellos primarios y los otros 8 secundarios, incluyendo un total de 29 animales positivos. Además, se han analizado otros 262 animales encontrados muertos en el medio natural en la zona infectada de 20 km de radio y sus alrededores, que han resultados negativos (ver mapa 1).




Mapa 1: Localización de los 11 focos en jabalíes silvestres y de los jabalíes hallados muertos negativos detectados en Cataluña (Fuente: MAPA)

www.mapa.gob.es
sganimal@mapa.es

C/ Almagro 33
28010 MADRID
TEL: 913471650
FAX: 913478299

Siguen las intensas labores de búsqueda de cadáveres de jabalíes y de captura para la reducción de las poblaciones de jabalíes en las zonas de bajo riesgo de la zona infectada, así como el refuerzo de las medidas de aislamiento, vallados, aprovechando vallados ya existentes en carreteras y vías férreas, priorizando el control de corredores de uso de jabalíes. Mediante las labores de aislamiento se está estableciendo una nueva barrera en la zona de alto riesgo teniendo en cuenta la dispersión hacia el sur de los últimos focos, para tratar de reducir al máximo las posibilidades de movimiento de jabalíes hacia la zona más exterior de la zona infectada, zona de menor riesgo.

En cuanto a las actuaciones en granjas y otros establecimientos de porcino, los SVO mantienen sus controles, inspeccionándose sus medidas de bioseguridad y realizando los análisis establecidos por la normativa comunitaria en las 57 explotaciones localizadas en la Zona Infectada, **sin haberse detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas** (ver mapa 2).



Mapa 2. Localización de los 11 focos en jabalíes silvestres y de las explotaciones de porcino localizadas dentro de la zona infectada, con municipios en zona de alto y menor riesgo. (Fuente: MAPA)

Se mantiene un alto nivel de alerta con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad en explotaciones de porcino y en poblaciones de jabalíes silvestres, tanto en Cataluña como en el resto de CCAA de España.

Se recuerda que la PPA es una **enfermedad no zoonósica**, es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

Dada la situación, resulta necesario **extremar las medidas de bioseguridad** en todas las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, y en el transporte de animales de esta especie. Así mismo, se recuerda la obligación de comunicar a los SVO de las CCAA sobre cualquier sospecha que se detecte, tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de ganado porcino en todo el territorio nacional.

Para más información relacionada con la enfermedad, incluidos los signos característicos, podéis visitar la web del MAPA dedicada a la enfermedad en el siguiente enlace:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/peste-porcina-africana/peste_porcina_africana

Para más información sobre la enfermedad en jabalíes silvestres y sobre protocolo de actuación y comunicación en caso de detectarse jabalíes con signos de enfermedad o cadáveres en el medio, podéis revisar la guía de vigilancia en fauna silvestre que incluye la PPA entre otras enfermedades:

https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/ganaderia/temas/sanidad-animal-e-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/fauna-silvestre/guiavigilanciasanitariafaunasilvestre.pdf