# El calor y la temperatura

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Diferenciar calor, temperatura y energía térmica con la teoría cinético-molecular
- Usar las escalas Celsius, Kelvin y Fahrenheit y el termómetro
- Explicar el equilibrio térmico y las tres formas de propagación del calor
- Describir los efectos del calor (dilatación y cambios de estado) y distinguir conductores y aislantes


## Para pensar

**Por la mañana tocas una barandilla de hierro y la madera del banco que hay al lado. El hierro parece mucho más frío. ¿Lo está de verdad?**

## Explicación


### La temperatura

En el lenguaje de todos los días decimos que algo está «caliente» o «frío», pero en ciencia hay que precisar. Según la teoría cinético-molecular, las partículas de la materia están siempre en movimiento. La temperatura es una magnitud que mide la **energía cinética media** de esas partículas, es decir, lo rápido que se mueven por término medio. Cuanto más deprisa se mueven, mayor es la temperatura. En un vaso de agua caliente las moléculas se agitan más que en uno de agua fría. La temperatura no depende de la cantidad de sustancia: una taza de té y una olla llena del mismo té recién hecho pueden estar a la misma temperatura, aunque la olla tenga mucha más energía térmica. La temperatura se mide con el **termómetro**.




### Escalas de temperatura

Para medir la temperatura se usan varias escalas. La **escala Celsius** (°C), creada por Anders Celsius en 1742, toma como referencia el punto de fusión del agua (0 °C) y su punto de ebullición a nivel del mar (100 °C), y divide ese intervalo en cien partes. Es la que usamos en España. La **escala Kelvin** (K) es la del Sistema Internacional. Empieza en el cero absoluto (0 K = −273 °C), la temperatura más baja posible, en la que las partículas casi no se moverían. No tiene valores negativos y sus grados son del mismo tamaño que los Celsius: **T(K) = T(°C) + 273**. La **escala Fahrenheit** (°F) se usa en Estados Unidos: el agua se congela a 32 °F y hierve a 212 °F. Se convierte con **T(°F) = 1,8 · T(°C) + 32**.




## El termómetro

El termómetro aprovecha que muchas propiedades de la materia cambian con la temperatura. El termómetro clásico de líquido tiene un depósito y un tubo muy fino con alcohol coloreado (antes, mercurio): al calentarse, el líquido se **dilata** y sube por el tubo, que tiene una escala graduada. Los termómetros digitales usan sensores electrónicos cuya resistencia eléctrica cambia con la temperatura. Los de infrarrojos, como los que miden la fiebre en la frente sin tocar, captan la radiación térmica que emiten los cuerpos. Para medir bien hay que esperar a que el termómetro alcance la misma temperatura que el cuerpo. Los termómetros de mercurio se prohibieron en Europa en 2009 porque el mercurio es tóxico si se rompen.

undefined


## El calor

Si pones una lata de refresco fría en la mesa, poco a poco se calienta, y el aire de alrededor se enfría un poquito. Ha pasado energía del aire a la lata. El calor es la **energía que se transfiere de un cuerpo a otro cuando están a distinta temperatura**. Siempre pasa del cuerpo **más caliente al más frío**, nunca al revés de forma espontánea. Como es energía, se mide en **julios**, aunque también se usa la **caloría** (cal), que es el calor necesario para subir 1 °C la temperatura de 1 g de agua; 1 cal = 4,18 J. Un error muy común es decir que un cuerpo «tiene calor»: los cuerpos tienen **energía térmica**, que es la energía total de sus partículas; el calor es solo la energía que pasa de uno a otro. Tampoco existe «el frío» como algo que entra: lo que ocurre es que sale calor.

undefined


## El equilibrio térmico

Cuando dos cuerpos a distinta temperatura se ponen en contacto, el más caliente cede calor al más frío. El caliente se enfría y el frío se calienta, hasta que los dos alcanzan la **misma temperatura**. En ese momento deja de pasar calor y decimos que han llegado al equilibrio térmico. Así se enfría una sopa en el plato, se templa el agua de la bañera al mezclar agua fría y caliente, o funciona el termómetro, que se pone a la temperatura del cuerpo con el que está en contacto. La temperatura final depende de las masas y de las temperaturas iniciales: si mezclas la misma cantidad de agua a 20 °C y a 60 °C, el resultado estará a 40 °C. Si hay mucha más agua fría, la temperatura final estará más cerca de la fría.




## Cómo se propaga el calor

El calor se transmite de tres formas. En la conducción, el calor pasa a través de un material, de partícula en partícula, sin que la materia se desplace: si calientas el extremo de una cuchara metálica, al rato quema el otro extremo. Es típica de los sólidos. En la convección, el calor se transporta con el **movimiento de un fluido** (líquido o gas): el aire o el agua calientes, menos densos, suben, y los fríos bajan, formando **corrientes de convección**. Así se calienta el agua de una olla o una habitación con un radiador, y así se forman los vientos. En la radiación, el calor viaja en forma de **ondas electromagnéticas**, sin necesidad de materia, incluso a través del vacío: así nos llega el calor del Sol o el de una hoguera cuando estamos cerca.





## Conductores y aislantes térmicos

No todos los materiales transmiten el calor igual. Los conductores térmicos lo transmiten con facilidad: son los **metales**, como el cobre, el aluminio o el hierro. Por eso las ollas y sartenes son de metal. Los aislantes térmicos lo transmiten muy mal: la madera, el plástico, el corcho, la lana, el vidrio, el poliestireno (el «corcho blanco») y, sobre todo, el **aire quieto**. Por eso los mangos de las sartenes son de madera o plástico, los abrigos de plumas y la lana abrigan (atrapan aire), y las ventanas de doble cristal llevan una cámara de aire. Un termo mantiene el café caliente porque tiene doble pared con vacío en medio (sin conducción ni convección) y superficies plateadas (que reflejan la radiación). Aislar bien las casas ahorra mucha energía en calefacción y aire acondicionado.

undefined

## Los efectos del calor: la dilatación

Cuando un cuerpo recibe calor, su temperatura sube y sus partículas se mueven más y se separan un poco: el cuerpo aumenta de tamaño. Es la dilatación. Al enfriarse, ocurre lo contrario: se **contrae**. Los gases se dilatan mucho, los líquidos menos y los sólidos muy poco, aunque lo suficiente para tenerlo en cuenta. Por eso los puentes y las vías del tren tienen **juntas de dilatación**, pequeños huecos que dejan espacio para que el metal se alargue en verano sin deformarse; los cables eléctricos cuelgan más en verano que en invierno; y un tarro con la tapa metálica atascada se abre más fácilmente si se pone la tapa bajo el agua caliente. El agua es una excepción: entre 0 °C y 4 °C se contrae al calentarse, y al congelarse se dilata, por eso una botella llena de agua puede romperse en el congelador.




## Calor y cambios de estado

El calor no siempre sube la temperatura. Cuando una sustancia está cambiando de estado, todo el calor que recibe se usa para **separar sus partículas**, y la temperatura **se mantiene constante** hasta que el cambio termina. Por eso un cubito de hielo en un vaso se mantiene a 0 °C mientras se derrite, y el agua de una olla no pasa de 100 °C mientras hierve, aunque subamos el fuego. Este calor «escondido» explica fenómenos cotidianos. El **sudor** nos refresca porque, para evaporarse, toma calor de la piel. Los botijos enfrían el agua porque una parte se filtra por el barro y se evapora. Y una quemadura con vapor de agua a 100 °C es más grave que con agua a 100 °C, porque el vapor, al condensarse sobre la piel, cede además todo el calor que había absorbido al evaporarse.

undefined

## Calor no es temperatura

| Temperatura | Calor |
| --- | --- |
| agitación de las partículas | energía que pasa de caliente a frío |
| **°C · K · °F** | **julios · calorías** |
| se mide con el termómetro | conducción · convección · radiación |

## Ejercicios

1. **Explica con la teoría cinético-molecular qué es la temperatura.**

2. **Pasa a kelvin: 0 °C, 100 °C y –40 °C.**

3. **Pasa a grados Celsius: 300 K y 0 K.**

4. **La temperatura normal del cuerpo es 37 °C. ¿Cuánto es en °F?**

5. **¿Qué diferencia hay entre calor y temperatura?**

6. **Indica la forma de propagación del calor: a) calentarse al sol; b) una cuchara que se calienta en la sopa; c) el aire caliente que sube desde el radiador.**

7. **¿Por qué los mangos de las sartenes son de madera o de plástico?**

8. **¿Por qué los raíles del tren tienen pequeños huecos entre tramos?**

9. **¿Por qué una botella llena de agua puede romperse en el congelador?**

10. **Explica por qué nos refresca sudar.**

## Practica

1. **La temperatura mide…**

   **A)** la cantidad de calor

   **B)** la agitación media de las partículas

   **C)** la masa

2. **La unidad de temperatura en el SI es el…**

   **A)** grado Celsius

   **B)** kelvin

   **C)** julio

3. **0 K equivalen a…**

   **A)** 0 °C

   **B)** –273 °C

   **C)** 273 °C

4. **El agua hierve a 212…**

   **A)** °C

   **B)** K

   **C)** °F

5. **El calor pasa siempre…**

   **A)** del frío al caliente

   **B)** del caliente al frío

   **C)** en los dos sentidos

6. **Cuando dos cuerpos llegan a la misma temperatura están en…**

   **A)** equilibrio térmico

   **B)** ebullición

   **C)** dilatación

7. **El calor del Sol nos llega por…**

   **A)** conducción

   **B)** convección

   **C)** radiación

8. **Un buen conductor térmico es…**

   **A)** el corcho

**B)** el cobre

**C)** la lana

9. **Al calentarse, la mayoría de los cuerpos…**

**A)** se contraen

**B)** se dilatan

**C)** no cambian

10. **Mientras el hielo se funde, su temperatura…**

**A)** sube


**B)** baja

**C)** se mantiene

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre calor y temperatura; Cómo se propaga el calor de tres formas distintas; Por qué se dilatan los cuerpos al calentarse.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Temperatura**

Mide la energía cinética media de las partículas.

**Calor**

Energía que pasa de un cuerpo caliente a uno frío.

**Kelvin**

T(K) = T(°C) + 273; empieza en el cero absoluto.

**Equilibrio térmico**

Estado en que dos cuerpos en contacto tienen la misma temperatura.

**Conducción**

Propagación del calor a través de un material, sin moverse la materia.

**Convección**

Propagación del calor con corrientes de un fluido.

**Radiación**

Propagación del calor por ondas, incluso en el vacío.

**Dilatación**

Aumento de tamaño de un cuerpo al calentarse.

## Soluciones

1. **B)** La agitación de las partículas.
2. **B)** El kelvin.
3. **B)** El cero absoluto.
4. **C)** En Fahrenheit.
5. **B)** Del caliente al frío.
6. **A)** Equilibrio térmico.
7. **C)** Radiación, a través del vacío.
8. **B)** El cobre.
9. **B)** Se dilatan.
10. **C)** Se mantiene a 0 °C.

## Soluciones de los ejercicios

1. Es una medida de la energía cinética media de las partículas: cuanto más rápido se mueven, mayor es la temperatura.
2. 273 K, 373 K y 233 K.
3. 27 °C y −273 °C.
4. 1,8 · 37 + 32 = 98,6 °F.
5. La temperatura mide la agitación de las partículas; el calor es la energía que pasa de un cuerpo a otro por estar a distinta temperatura.
6. a) Radiación; b) conducción; c) convección.
7. Porque son aislantes térmicos y no transmiten el calor a la mano.
8. Son juntas de dilatación: dejan espacio para que el metal se dilate con el calor sin deformarse.
9. Porque el agua, al congelarse, se dilata y ocupa más volumen.
10. Porque el sudor, para evaporarse, absorbe calor de la piel, que se enfría.