Ecuaciones de segundo grado y sistemas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer y resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas
- Usar el discriminante para saber cuántas soluciones hay
- Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales por sustitución, igualación y reducción
- Plantear problemas con ecuaciones de segundo grado y con sistemas

Para pensar

Un jardín cuadrado tiene 49 m². Si le añades un camino de 1 m alrededor, ¿cuánto mide el lado del jardín? ¿Y si solo sabes que el área total con el camino es 81 m²?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

Ecuaciones de segundo grado

Una ecuación es de **segundo grado** si, después de simplificarla, la incógnita aparece elevada al cuadrado. Su forma general es:

$ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$.

a es el coeficiente de x^2, b el de x y c el término independiente. En $3x^2 - 5x + 2 = 0$: $a = 3$, $b = -5$, $c = 2$.

Si b o c valen 0, la ecuación es **incompleta** y se resuelve sin fórmula. Una ecuación de segundo grado puede tener **dos soluciones, una o ninguna**.

undefined

Ecuaciones incompletas

- **Sin término en x (b = 0)**: $ax^2 + c = 0$. Se despeja x^2 y se hace la raíz, que da dos soluciones opuestas. $2x^2 - 50 = 0 \rightarrow x^2 = 25 \rightarrow$ **x = 5 o x = −5**. Si x^2 sale negativo ($x^2 = -4$), no hay solución.
- **Sin término independiente (c = 0)**: $ax^2 + bx = 0$. Se saca factor común x: $x(ax + b) = 0$. Un producto es 0 si alguno de los factores es 0, así que **x = 0** o $ax + b = 0$. $3x^2 - 12x = 0 \rightarrow x(3x - 12) = 0 \rightarrow$ **x = 0 o x = 4**.

¡No dividas entre x! Perderías la solución x = 0.

undefined

La fórmula general

Una ecuación completa $ax^2 + bx + c = 0$ se resuelve con la fórmula:

$$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Comprobación: $3^2 - 15 + 6 = 0$ ✔ y $2^2 - 10 + 6 = 0$ ✔. Antes de aplicar la fórmula hay que dejar la ecuación igualada a 0 y con los términos ordenados.


undefined

El discriminante

Lo que hay dentro de la raíz, **$\Delta = b^2 - 4ac$**, se llama **discriminante** y dice cuántas soluciones hay sin terminar de resolver:

Δ	Soluciones	Ejemplo
$\Delta > 0$	dos soluciones distintas	$x^2 - 5x + 6 = 0$ ($\Delta = 1$)
$\Delta = 0$	una solución (doble)	$x^2 - 6x + 9 = 0$ ($\Delta = 0$) → $x = 3$
$\Delta < 0$	ninguna solución real	$x^2 + x + 1 = 0$ ($\Delta = -3$)

En la gráfica de $y = ax^2 + bx + c$ (una **parábola**), las soluciones son los puntos donde corta al eje X.



Sistemas de ecuaciones lineales


Un **sistema** son dos ecuaciones con dos incógnitas que deben cumplirse **a la vez**:

{ $x + y = 10$
{ $x - y = 2$

La **solución** es la pareja de valores que cumple las dos: $x = 6$, $y = 4$ ($6 + 4 = 10$ y

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cada ecuación lineal con dos incógnitas tiene infinitas soluciones, que forman una **recta**. La solución del sistema es el punto donde se cortan las dos rectas. Si las rectas son paralelas, el sistema no tiene solución; si son la misma, tiene infinitas.



Métodos de sustitución e igualación

Sustitución: se despeja una incógnita en una ecuación y se sustituye en la otra.

{ 2x + y = 7 ; x − 3y = −7. De la primera: y = 7 − 2x. En la segunda: x − 3(7 − 2x) = −7 → x − 21 + 6x = −7 → 7x = 14 → **x = 2**, y = 7 − 4 = **3**.

Igualación: se despeja la misma incógnita en las dos ecuaciones y se igualan las expresiones. Con { y = 2x − 1 ; y = x + 3: 2x − 1 = x + 3 → **x = 4**, y = **7**.

Sustitución conviene cuando una incógnita tiene coeficiente 1 o −1.

undefined

Método de reducción

Se multiplican las ecuaciones por números adecuados para que una incógnita tenga coeficientes **opuestos**; al sumarlas, esa incógnita desaparece.

{ 3x + 2y = 16 ; 5x − 2y = 0. Los coeficientes de y ya son opuestos: sumando, 8x = 16 → **x = 2**. Sustituyendo: 6 + 2y = 16 → **y = 5**.

{ 2x + 3y = 8 ; 3x + 2y = 7. Multiplicamos la primera por 3 y la segunda por −2: 6x

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

undefined

Problemas con sistemas y de segundo grado

Con sistema: «En un corral hay gallinas y conejos: 25 cabezas y 70 patas». x = gallinas, y = conejos. { x + y = 25 ; 2x + 4y = 70. Por sustitución: x = 25 − y → 50 − 2y + 4y = 70 → y = 10, x = 15. **15 gallinas y 10 conejos.**

De segundo grado: «Un rectángulo tiene 3 cm más de largo que de ancho y 40 cm^2 de área». $x(x + 3) = 40 \rightarrow x^2 + 3x - 40 = 0 \rightarrow x = (-3 \pm \sqrt{169})/2 = (-3 \pm 13)/2$ → x = 5 o x = −8. Como un lado no puede ser negativo: **5 cm × 8 cm**.

En los problemas, descarta las soluciones que no tienen sentido.

undefined

Segundo grado y sistemas en un vistazo

Forma general	$ax^2 + bx + c = 0$
Incompletas	despejar x^2 · sacar factor común x
Fórmula	$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$
Discriminante	Δ > 0: dos · Δ = 0: una · Δ < 0: ninguna
Sistema	punto de corte de dos rectas
Métodos	sustitución · igualación · reducción

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Resuelve: $3x^2 - 27 = 0$.**

2. **Resuelve: $5x^2 + 15x = 0$.**

3. **Resuelve: $x^2 + x - 12 = 0$.**

4. **Resuelve: $4x^2 - 4x + 1 = 0$.**

5. **¿Cuántas soluciones tiene $2x^2 + 3x + 5 = 0$?**

6. **Resuelve por sustitución: $\{ x + 2y = 11 ; 3x - y = 5 \}$.**

7. **Resuelve por igualación: $\{ y = 3x - 2 ; y = -x + 6 \}$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **El producto de dos números consecutivos es 132. ¿Cuáles son?**

10. **Un bocadillo y un zumo cuestan 4,50 €; dos bocadillos y tres zumos, 10,50 €. ¿Cuánto cuesta cada cosa?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **En $2x^2 - 3x + 7 = 0$, el valor de b es...**

   A) 3

   B) −3

   C) 2

2. **Soluciones de $x^2 = 36$:**

   A) solo 6

   B) 18

   C) 6 y −6

3. **Soluciones de $x^2 - 4x = 0$:**

   A) 0 y 4

   B) solo 4

   C) 2 y −2

4. **$x^2 + 9 = 0$ tiene...**

   A) $x = 3$

   B) $x = \pm 3$

   C) ninguna solución real

5. **El discriminante de $x^2 + 2x + 1 = 0$ es...**

   A) 4

   B) 0

   C) −4

6. **Si $\Delta > 0$, la ecuación tiene...**

   A) dos soluciones

   B) una

   C) ninguna

7. **Soluciones de $x^2 - 7x + 10 = 0$:**

   A) −5 y −2

   B) 5 y 2

   C) 7 y 10

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) x = 4, y = 4

C) x = 5, y = 3

9. **Gráficamente, la solución de un sistema es...**

A) el punto de corte de las rectas

B) el origen

C) la pendiente

10. **Si las dos rectas son paralelas, el sistema...**

A) tiene una

B) no tiene solución

C) tiene dos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia una ecuación de segundo grado de una de primero; Cómo se resuelven las incompletas sin fórmula; Qué indica el discriminante; Qué es la solución de un sistema y cómo se ve en una gráfica; Cuándo conviene cada método.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecuación de 2.º grado

$ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$.

$ax^2 + c = 0$

$x^2 = -c/a$; dos soluciones opuestas si es positivo.

$ax^2 + bx = 0$

$x(ax + b) = 0 \rightarrow x = 0$ o $x = -b/a$.

Fórmula general

$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)})/2a$.

Discriminante

$\Delta = b^2 - 4ac$: indica el número de soluciones.

Sistema

Dos ecuaciones que se cumplen a la vez.

Sustitución

Despejar en una y sustituir en la otra.

Reducción

Sumar ecuaciones para eliminar una incógnita.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Coeficiente de x.
2. **C)** Dos opuestas.
3. **A)** $x(x - 4) = 0$.
4. **C)** $x^2 = -9$.
5. **B)** $4 - 4$.
6. **A)** Raíz positiva.
7. **B)** $(7 \pm 3)/2$.
8. **C)** Sumando: $2x = 10$.
9. **A)** Cumple las dos.
10. **B)** No se cortan.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. $x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$.
2. $5x(x + 3) = 0 \rightarrow x = 0, x = -3$.
3. $\Delta = 49$; $x = (-1 \pm 7)/2 \rightarrow 3$ y -4.
4. $\Delta = 0$; $x = 1/2$ (doble).
5. $\Delta = 9 - 40 = -31 < 0$: ninguna.
6. $x = 11 - 2y \rightarrow 33 - 7y = 5 \rightarrow y = 4, x = 3$.
7. $3x - 2 = -x + 6 \rightarrow x = 2, y = 4$.
8. $8x = 16 \rightarrow x = 2$; $y = -9/2$.
9. $x(x + 1) = 132 \rightarrow x = 11$ o $x = -12$: 11 y 12, o -12 y -11.
10. { b + z = 4,5 ; 2b + 3z = 10,5 } → z = 1,5 €, b = 3 €.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información