Lugares geométricos y figuras planas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer la mediatriz, la bisectriz y la circunferencia como lugares geométricos y construirlas
- Trazar las rectas y los puntos notables de un triángulo e interpretar su significado
- Aplicar el teorema de Pitágoras y su recíproco en problemas del plano
- Calcular perímetros y áreas de polígonos, del círculo y de sus partes
- Resolver problemas reales con figuras compuestas, explicando el razonamiento

Para pensar

Tres pueblos quieren construir un depósito de agua que quede exactamente a la misma distancia de los tres. ¿Dónde lo ponen?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación


1.1 Qué es un lugar geométrico

Un **lugar geométrico** es el conjunto de **todos** los puntos del plano que cumplen una determinada propiedad. Lo importante es la palabra «todos»: los puntos que la cumplen están en el lugar, y los que no la cumplen, no.

El ejemplo más conocido es la **circunferencia**: el lugar geométrico de los puntos que están a una distancia fija r (el **radio**) de un punto fijo O (el **centro**). Si un perro está atado con una correa de 3 m a un poste y la mantiene tensa, su collar recorre una circunferencia de radio 3 m.

Hay que distinguir la **circunferencia** (la línea, los puntos a distancia exactamente r) del **círculo** (la superficie, los puntos a distancia menor o igual que r). Si la correa no va tensa, el perro puede estar en cualquier punto del círculo.

Pensar en lugares geométricos ayuda a resolver problemas de ubicación: ¿dónde puede estar un punto que cumple dos condiciones a la vez? En la intersección de los dos lugares.



d(P, O) = r para todo P


1.2 La mediatriz de un segmento

La **mediatriz** de un segmento AB es el lugar geométrico de los puntos que están a la **misma distancia de A y de B**. Resulta ser una recta: la perpendicular a AB que pasa por su punto medio M.

Se construye con regla y compás: con centro en A y un radio mayor que la mitad

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Aplicaciones: si dos colegios están en A y B y se quiere una parada de autobús a la misma distancia de ambos, debe estar en la mediatriz. Los puntos a un lado de la mediatriz están más cerca de A, y los del otro lado, más cerca de B: por eso la mediatriz divide el plano en dos «zonas de influencia», como las de dos antenas de telefonía.



1.3 La bisectriz de un ángulo


La **bisectriz** de un ángulo es la semirrecta que lo divide en **dos ángulos iguales**. Como lugar geométrico, es el conjunto de puntos que están a la misma distancia de los dos lados del ángulo.

Recuerda que la distancia de un punto a una recta se mide siempre por la **perpendicular**: es el camino más corto. En el dibujo, el punto P de la bisectriz está a la misma distancia d de los dos lados.

Construcción con compás: con centro en el vértice V se traza un arco que corte los dos lados; desde esos dos puntos de corte, con el mismo radio, se trazan dos arcos que se cortan dentro del ángulo. La recta que une ese punto con V es la bisectriz.

Si en vez de dos semirrectas se tienen dos rectas que se cortan, los puntos que equidistan de ambas forman **dos** bisectrices perpendiculares entre sí, una para cada pareja de ángulos opuestos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.4 Otros lugares e intersecciones

Algunos lugares geométricos sencillos más:

- Los puntos que están a una distancia d de una recta forman **dos rectas paralelas** a ella, una a cada lado.
- Los puntos que están a distancia d de un segmento forman una figura con forma de «pista de atletismo»: dos segmentos paralelos y dos semicircunferencias.
- Los puntos desde los que un segmento AB se ve con ángulo recto forman la circunferencia de diámetro AB (arco capaz de 90°).

Muchos problemas piden puntos que cumplan **dos condiciones**. Se dibuja cada lugar y se buscan las **intersecciones**. Por ejemplo: «un tesoro está a 5 m del árbol y a igual distancia de la fuente y del pozo». Es la intersección de una circunferencia de radio 5 con centro en el árbol y la mediatriz entre la fuente y el pozo: puede haber 0, 1 o 2 soluciones.




2.1 Mediatrices y circuncentro

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

a igual distancia de A y B; si además está en la de BC, equidista de B y C. Entonces equidista de A y C, y también está en la tercera mediatriz.

Como OA = OB = OC, el circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita, la que pasa por los tres vértices. Es la solución de la pregunta inicial: el depósito equidistante de los tres pueblos.

Su posición depende del tipo de triángulo: en un **acutángulo** está dentro; en un **rectángulo**, justo en el punto medio de la hipotenusa; en un **obtusángulo**, fuera. Así se puede encontrar el centro de un plato roto con tres puntos de su borde: se trazan dos mediatrices y su corte es el centro.



2.2 Bisectrices e incentro


Las tres bisectrices de los ángulos de un triángulo se cortan en un punto llamado **incentro** I. Como cada bisectriz equidista de dos lados, el incentro está a la misma distancia de los tres lados.

Por eso es el centro de la circunferencia inscrita: la mayor circunferencia que cabe dentro del triángulo y que toca (es tangente a) sus tres lados. Su radio es la distancia del incentro a cualquier lado, medida por la perpendicular.

A diferencia del circuncentro, el incentro está **siempre dentro** del triángulo, sea como sea este. Aplicación: en una parcela triangular, la fuente circular más grande posible tiene su centro en el incentro. Y si se quiere construir un camino que vaya a igual distancia de dos vallas que forman un ángulo, el camino debe

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

No confundas: circuncentro → mediatrices → vértices; incentro → bisectrices → lados.




2.3 Alturas y ortocentro

Una **altura** de un triángulo es el segmento perpendicular que va desde un vértice hasta la recta que contiene el lado opuesto. El punto donde llega se llama **pie** de la altura. Cada triángulo tiene tres alturas, y las rectas que las contienen se cortan en un punto llamado **ortocentro** H.

Las alturas son fundamentales para calcular áreas: el área del triángulo es $\text{base} \cdot \text{altura} / 2$, y se puede tomar cualquier lado como base siempre que se use la altura correspondiente. Por eso el producto lado · altura es el mismo para los tres lados.

La posición del ortocentro también depende del tipo de triángulo: dentro en los acutángulos, en el vértice del ángulo recto en los rectángulos (porque los catetos son alturas) y fuera en los obtusángulos. En un triángulo obtusángulo, dos alturas caen fuera: hay que prolongar los lados para trazarlas.




Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Una **mediana** es el segmento que une un vértice con el **punto medio del lado opuesto**. Las tres medianas se cortan en el **baricentro** G, que siempre está dentro del triángulo.

El baricentro tiene una propiedad muy útil: divide cada mediana en dos partes, de modo que la que va al vértice es el doble que la que va al lado: CG = 2 · GM. Es decir, G está a 2/3 de cada mediana contando desde el vértice.

Además, el baricentro es el **centro de gravedad** del triángulo: si recortas un triángulo en cartulina, se mantiene en equilibrio sobre la punta de un lápiz colocada en G. Cada mediana divide el triángulo en dos triángulos de igual área (misma base y misma altura).

Resumen de los cuatro puntos notables: circuncentro (mediatrices), incentro (bisectrices), ortocentro (alturas) y baricentro (medianas). En cualquier triángulo no equilátero, O, G y H están alineados en la llamada recta de Euler.



3.1 El teorema de Pitágoras

En un **triángulo rectángulo**, los lados que forman el ángulo recto se llaman **catetos** (a y b) y el lado opuesto, el más largo, **hipotenusa** (c). El teorema de Pitágoras dice:


$$c^2 = a^2 + b^2$$

Geométricamente: el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados sobre los catetos. Con catetos 3 y 4: 9 + 16

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Del teorema se despeja cualquier lado: **$c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$** para la hipotenusa, y **$a = \sqrt{(c^2 - b^2)}$** para un cateto. Ejemplo: una escalera de 5 m apoyada en una pared con el pie a 1,4 m de ella llega a una altura de $\sqrt{(25 - 1{,}96)} = \sqrt{23{,}04} = 4{,}8$ m.

Las ternas de números enteros que cumplen el teorema se llaman **ternas pitagóricas**: (3, 4, 5), (5, 12, 13), (8, 15, 17) y sus múltiplos, como (6, 8, 10).




3.2 Aplicaciones del teorema de Pitágoras

Pitágoras aparece cada vez que en una figura se puede dibujar un triángulo rectángulo:

- **Diagonal de un rectángulo** de lados a y b: $d = \sqrt{(a^2 + b^2)}$. La «pulgada» de una pantalla mide la diagonal: una tele de 16 × 9 unidades tiene diagonal $\sqrt{337} \approx 18{,}4$ unidades.
- **Altura de un triángulo equilátero** de lado l: $h = \sqrt{(l^2 - (l/2)^2)} = (\sqrt{3}/2) \cdot l \approx 0{,}866 \cdot l$.
- **Apotema de un polígono regular**: con el radio r y medio lado, $ap = \sqrt{(r^2 - (l/2)^2)}$.
- **Distancia entre dos puntos** del plano: $d = \sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}$.
- **Altura de un trapecio isósceles** o lado de un rombo a partir de sus diagonales.

La clave está en localizar el triángulo rectángulo escondido y decidir qué lado es la hipotenusa, que siempre es la que está enfrente del ángulo recto.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.3 El recíproco: ¿es rectángulo el triángulo?

El teorema también funciona al revés: si en un triángulo de lados a, b y c (c el mayor) se cumple $c^2 = a^2 + b^2$, entonces el triángulo es **rectángulo**. Es lo que hacían los tensadores de cuerdas egipcios con 3, 4 y 5.

Comparando c^2 con $a^2 + b^2$ se clasifica cualquier triángulo según sus ángulos:

- $c^2 < a^2 + b^2$ → **acutángulo** (tres ángulos agudos). Ejemplo 6, 7, 8: 64 < 85.
- $c^2 = a^2 + b^2$ → **rectángulo**. Ejemplo 6, 8, 10: 100 = 100.
- $c^2 > a^2 + b^2$ → **obtusángulo**. Ejemplo 4, 5, 8: 64 > 41.

Antes, hay que comprobar que el triángulo existe: cada lado debe ser menor que la suma de los otros dos (**desigualdad triangular**). Con 2, 3 y 7 no se puede construir ningún triángulo, porque 7 > 2 + 3. Los albañiles usan aún la regla 3-4-5 (o 60-80-100 cm) para comprobar que una esquina es recta.



4.1 Perímetros y áreas de polígonos


El **perímetro** es la longitud del contorno (se mide en m, cm…) y el **área**, la medida de la superficie (en m^2, cm^2…). Las fórmulas básicas se deducen unas de otras:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Figura	Área
Paralelogramo	$b \cdot h$
Triángulo	$b \cdot h / 2$
Rombo	$D \cdot d / 2$
Trapecio	$(B + b) \cdot h / 2$

El paralelogramo se transforma en un rectángulo cortando un triángulo de un lado y pegándolo en el otro. El triángulo es medio paralelogramo. El rombo es medio rectángulo de lados D y d. Y el trapecio, duplicado y girado, forma un paralelogramo de base B + b.

Muchas veces falta un dato que se calcula con Pitágoras. Un rombo de diagonales 12 y 16 cm tiene área $12 \cdot 16 / 2 = 96$ cm², y su lado es $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$ cm, así que su perímetro es 40 cm.



4.2 Polígonos regulares

Un polígono es **regular** si tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Sus elementos son el **centro** O, el **radio** r (distancia del centro a un vértice) y la **apotema** ap (distancia del centro al punto medio de un lado, perpendicular a él).


Uniendo el centro con los vértices, un polígono de n lados se descompone en n triángulos iguales de base l y altura ap. Por eso:

$$A = P \cdot ap / 2$$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

lado 6 cm: ap = √(36 − 9) = √27 ≈ 5,2 cm, P = 36 cm y A ≈ 36 · 5,2 / 2 = 93,6 cm².

Las abejas construyen celdas hexagonales porque, entre los polígonos que cubren el plano sin huecos, el hexágono es el que encierra más área con el mismo perímetro: ahorran cera.



4.3 La circunferencia y el círculo

En cualquier circunferencia, el cociente entre su longitud y su diámetro es siempre el mismo número, **π ≈ 3,1416**. Por eso:


- **Longitud de la circunferencia**: L = 2πr.
- **Área del círculo**: A = πr².

Un **arco** es un trozo de circunferencia y un **sector circular**, el trozo de círculo entre dos radios. Si el ángulo central es α (en grados), el arco y el sector son la fracción α/360 del total:

$$\text{arco} = 2\pi r \cdot \alpha / 360° \quad \text{sector} = \pi r^2 \cdot \alpha / 360°$$

Ejemplo: una pizza de 30 cm de diámetro (r = 15) cortada en 8 porciones: cada porción es un sector de 45°, con área π · 225 · 45/360 ≈ 88,4 cm² y un borde de 2π · 15 · 45/360 ≈ 11,8 cm. La **corona circular**, entre dos circunferencias concéntricas, tiene área π(R² − r²).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




4.4 Figuras compuestas y problemas

La mayoría de las figuras reales no son una figura simple, sino una **combinación** de ellas. Para calcular su área se **descompone** en figuras conocidas y se suman (o se restan, si hay huecos).

Ejemplo: una ventana formada por un rectángulo de 1,4 m × 0,8 m con un semicírculo encima de diámetro 1,4 m. Área del rectángulo: 1,12 m^2. Semicírculo de radio 0,7: π · 0,49 / 2 ≈ 0,77 m^2. Total ≈ 1,89 m^2. Su perímetro (para el marco) es 1,4 + 0,8 + 0,8 + π · 0,7 ≈ 5,2 m: ¡ojo, el lado de arriba del rectángulo no forma parte del contorno!

Estrategia general: 1) dibujar la figura con los datos; 2) descomponerla; 3) calcular con Pitágoras los datos que falten; 4) operar con las unidades correctas; 5) comprobar que el resultado es razonable. Si las medidas vienen en unidades distintas, conviene pasarlas todas a la misma antes de empezar.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Geometría plana en una imagen

Lugares	mediatriz (2 puntos) · bisectriz (2 lados) · circunferencia (centro)
Notables	circuncentro · incentro · ortocentro · baricentro
Pitágoras	$c^2 = a^2 + b^2$ · recíproco para clasificar triángulos
Áreas	polígonos · regular $P \cdot ap/2$ · círculo πr^2 · sector $\pi r^2 \alpha / 360$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define con tus palabras mediatriz, bisectriz y circunferencia como lugares geométricos.**

2. **Dibuja un segmento de 8 cm y construye su mediatriz con regla y compás.**

3. **Dibuja un ángulo de 70° y traza su bisectriz. ¿Cuánto mide cada mitad?**

4. **Halla la hipotenusa de un triángulo rectángulo con catetos 5 y 12 cm.**

5. **Halla el cateto desconocido: hipotenusa 17 cm y un cateto 8 cm.**

6. **¿Son rectángulos los triángulos de lados (9, 12, 15) y (5, 6, 8)?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula el área de un trapecio de bases 12 y 8 cm y altura 5 cm.**

9. **Halla la longitud y el área de una circunferencia/círculo de radio 4 cm.**

10. **¿Qué punto notable es el centro de la circunferencia que pasa por los tres vértices? ¿Y de la que toca los tres lados?**

11. **Una rueda de bici tiene 70 cm de diámetro. ¿Cuánto avanza en una vuelta?**

12. **¿Se puede construir un triángulo de lados 3, 4 y 9 cm? ¿Y de 5, 6 y 10?**

13. **Halla la diagonal de un rectángulo de 24 × 7 cm y la de un cuadrado de lado 5 cm.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Un rombo tiene diagonales de 18 y 24 cm. Halla su lado, su perímetro y su área.**

16. **Halla el área de un hexágono regular de lado 10 cm.**

17. **Halla la longitud del arco y el área del sector de radio 10 cm y ángulo 72°.**

18. **Calcula el área de una corona circular de radios 8 y 5 cm.**

19. **Una televisión de 16:9 tiene 80 cm de ancho. ¿Cuántas pulgadas mide su diagonal? (1 pulgada = 2,54 cm)**

20. **Un trapecio rectángulo tiene bases 15 y 9 cm y altura 8 cm. Halla su lado oblicuo y su perímetro.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Halla la distancia entre los puntos A(1, 2) y B(7, 10).**

23. **Halla el área de la ventana: rectángulo de 2 × 1,2 m con un semicírculo encima de diámetro 2 m.**

24. **Un plato se ha roto. Explica cómo encontrar su centro con tres puntos del borde.**

25. **En un triángulo rectángulo de catetos 6 y 8 cm, ¿dónde está el circuncentro y cuánto mide el radio de la circunferencia circunscrita?**

26. **Halla el radio de la circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo de lados 6, 8 y 10 (usa A = r · semiperímetro).**

27. **Un cuadrado está inscrito en una circunferencia de radio 5 cm. Halla el lado del cuadrado y el área que queda entre ambos.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Una antena de 12 m se sujeta con tres cables desde lo alto hasta puntos del suelo a 5 m de su base. ¿Cuántos metros de cable hacen falta?**

29. **Calcula el área de un octógono regular de lado 4 cm y apotema 4,83 cm, y compárala con la del cuadrado de lado 4 + 2·2,83 cm que lo contiene.**

30. **Una pista de atletismo tiene dos rectas de 100 m y dos semicircunferencias de radio 36,5 m. Halla la longitud de la calle interior y el área encerrada.**

31. **En un triángulo, la mediana desde C mide 9 cm. ¿A qué distancia de C está el baricentro? ¿Y del punto medio del lado opuesto?**

32. **Un tesoro está a 4 m de un árbol A y a igual distancia de dos pozos P y Q. Explica con lugares geométricos cuántas soluciones puede haber.**

33. **Halla la altura de un triángulo isósceles de base 10 cm y lados iguales de 13 cm, y su área. ¿Dónde está su ortocentro, dentro o fuera?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

34. **Una cabra está atada con una cuerda de 5 m a la esquina exterior de un establo cuadrado de 4 m de lado, en un prado. ¿Qué área puede pastar?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Los puntos a igual distancia de dos puntos A y B forman...**

   A) la bisectriz
   B) la mediatriz de AB
   C) una circunferencia
   D) el segmento AB

2. **Los puntos a igual distancia de los lados de un ángulo forman...**

   A) la mediatriz
   B) la bisectriz
   C) la altura
   D) la mediana

3. **La mediatriz de un segmento es...**

   A) paralela a él
   B) perpendicular por su punto medio
   C) perpendicular por un extremo
   D) una circunferencia

4. **La distancia de un punto a una recta se mide...**

   A) en horizontal
   B) por la perpendicular
   C) hasta el origen
   D) por cualquier camino

5. **Las mediatrices de un triángulo se cortan en el...**

   A) incentro
   B) baricentro
   C) circuncentro
   D) ortocentro

6. **Las bisectrices se cortan en el...**

   A) incentro
   B) baricentro
   C) circuncentro

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) incentro
B) baricentro
C) circuncentro
D) ortocentro

8. **Las alturas se cortan en el...**

A) incentro
B) baricentro
C) circuncentro
D) ortocentro

9. **El baricentro divide cada mediana en razón...**

A) 1 : 1
B) 2 : 1
C) 3 : 1
D) 3 : 2

10. **En un triángulo rectángulo, el circuncentro está...**

A) dentro
B) en el punto medio de la hipotenusa
C) en el ángulo recto
D) fuera

11. **Hipotenusa de catetos 6 y 8:**

A) 14
B) 10
C) 48
D) 100

12. **Cateto con hipotenusa 13 y otro cateto 5:**

A) 12
B) 8
C) 18
D) √194

13. **El triángulo 5, 6, 9 es...**

A) acutángulo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) imposible

14. **¿Existe un triángulo de lados 2, 5 y 8?**

A) sí

B) no

C) solo si es rectángulo

D) solo si es isósceles

15. **Área de un rombo de diagonales 8 y 6:**

A) 48

B) 24

C) 14

D) 28

16. **Área de un trapecio de bases 10 y 6 y altura 4:**

A) 64

B) 32

C) 40

D) 16

17. **El área de un polígono regular es...**

A) $P \cdot ap$

B) $P \cdot ap / 2$

C) $l \cdot ap$

D) P^2

18. **En un hexágono regular, el radio es igual al...**

A) lado

B) apotema

C) doble del lado

D) perímetro

19. **Área de un círculo de diámetro 10:**

A) 100π

B) 25π

C) 10π

D) 20π

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) un cuarto del círculo

C) un tercio


D) un octavo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un lugar geométrico y por qué la mediatriz es uno de ellos; Qué diferencia hay entre circuncentro e incentro; Qué dice el teorema de Pitágoras y cómo se usa para saber si un triángulo es rectángulo; Cómo se calcula el área de una figura compuesta.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Lugar geométrico	Conjunto de todos los puntos que cumplen una propiedad.
Circunferencia	Puntos a distancia r de un centro; es una línea.
Círculo	Superficie limitada por una circunferencia.
Mediatriz	Perpendicular a un segmento por su punto medio; equidista de sus extremos.
Bisectriz	Semirrecta que divide un ángulo en dos iguales; equidista de los lados.
Circuncentro	Corte de las mediatrices; centro de la circunferencia circunscrita.
Incentro	Corte de las bisectrices; centro de la circunferencia inscrita.
Ortocentro	Corte de las alturas.
Baricentro	Corte de las medianas; centro de gravedad.
Mediana	Segmento de un vértice al punto medio del lado opuesto.
Altura	Perpendicular desde un vértice al lado opuesto.
Hipotenusa	Lado opuesto al ángulo recto; el mayor.
Cateto	Cada lado que forma el ángulo recto.
Apotema	Distancia del centro de un polígono regular al punto medio de un lado.
Sector circular	Parte del círculo entre dos radios.
Terna pitagórica	Tres enteros que cumplen $c^2 = a^2 + b^2$, como 3, 4, 5.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Mediatriz

Equidista de 2 puntos.

Bisectriz

Equidista de 2 lados.

Circuncentro

Mediatrices · pasa por vértices.

Incentro

Bisectrices · toca los lados.

Baricentro

Medianas · 2 : 1.

Ortocentro

Alturas.

Pitágoras

$c^2 = a^2 + b^2$

Cateto

$a = \sqrt{(c^2 - b^2)}$

Polígono regular

$A = P \cdot ap / 2$

Círculo

$L = 2\pi r \cdot A = \pi r^2$

Sector

$\pi r^2 \cdot \alpha / 360$

Corona

$\pi(R^2 - r^2)$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Definición de mediatriz.
2. **B)** Definición de bisectriz.
3. **B)** Perpendicular por M.
4. **B)** El camino más corto.
5. **C)** Centro de la circunscrita.
6. **A)** Centro de la inscrita.
7. **B)** Centro de gravedad.
8. **D)** H.
9. **B)** CG = 2 GM.
10. **B)** La hipotenusa es un diámetro.
11. **B)** √100.
12. **A)** √(169 − 25).
13. **C)** 81 > 61.
14. **B)** 8 > 2 + 5.
15. **B)** D·d/2.
16. **B)** 16 · 4/2.
17. **B)** n triángulos.
18. **A)** Triángulos equiláteros.
19. **B)** r = 5.
20. **B)** 90/360.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Mediatriz: puntos a igual distancia de dos puntos. Bisectriz: puntos a igual distancia de los lados de un ángulo. Circunferencia: puntos a distancia r de un centro.
2. Arcos de radio > 4 cm desde cada extremo; unir sus dos cortes. Pasa por el punto medio, a 4 cm de cada extremo, y es perpendicular.
3. 35°.
4. $\sqrt{(25 + 144)} = \sqrt{169} = 13$ cm.
5. $\sqrt{(289 - 64)} = \sqrt{225} = 15$ cm.
6. $225 = 81 + 144$: sí. $64 > 25 + 36 = 61$: no, es obtusángulo.
7. $10 \cdot 7 / 2 = 35$ cm².
8. $(12 + 8) \cdot 5 / 2 = 50$ cm².
9. $L = 8\pi \approx 25{,}1$ cm; $A = 16\pi \approx 50{,}3$ cm².
10. Circuncentro; incentro.
11. $\pi \cdot 70 \approx 219{,}9$ cm ≈ 2,2 m.
12. No ($9 > 3 + 4$). Sí ($10 < 11$).
13. $\sqrt{(576 + 49)} = 25$ cm; $\sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7{,}07$ cm.
14. $h = \sqrt{(64 - 16)} = \sqrt{48} \approx 6{,}93$ cm; $A \approx 27{,}7$ cm².
15. Lado $\sqrt{(9^2 + 12^2)} = 15$ cm; $P = 60$ cm; $A = 216$ cm².
16. $ap = \sqrt{(100 - 25)} \approx 8{,}66$ cm; $P = 60$; $A \approx 60 \cdot 8{,}66 / 2 \approx 259{,}8$ cm².
17. Arco $= 20\pi \cdot 72/360 = 4\pi \approx 12{,}6$ cm; sector $= 100\pi/5 = 20\pi \approx 62{,}8$ cm².
18. $\pi(64 - 25) = 39\pi \approx 122{,}5$ cm².
19. Alto = 45 cm. $d = \sqrt{(6400 + 2025)} = \sqrt{8425} \approx 91{,}8$ cm ≈ 36 pulgadas.
20. Oblicuo $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$ cm. $P = 15 + 9 + 8 + 10 = 42$ cm.
21. $100 < 113$: acutángulo. $289 = 289$: rectángulo. $100 > 74$: obtusángulo.
22. $\sqrt{(36 + 64)} = 10$.
23. $2{,}4 + \pi/2 \approx 2{,}4 + 1{,}57 = 3{,}97$ m².
24. Se unen los puntos dos a dos y se trazan dos mediatrices; su corte es el circuncentro, el centro del plato.
25. En el punto medio de la hipotenusa (10 cm); radio 5 cm.
26. $A = 24$; $s = 12$; $r = 24/12 = 2$ cm.
27. Diagonal 10 → lado $10/\sqrt{2} \approx 7{,}07$ cm; área cuadrado 50. Círculo $25\pi \approx 78{,}5$. Queda ≈ 28,5 cm².
28. Cada cable $\sqrt{(144 + 25)} = 13$ m. Total 39 m.
29. $A = 32 \cdot 4{,}83 / 2 \approx 77{,}3$ cm². Cuadrado de lado 9,66: ≈ 93,3 cm² (sobran 4 triángulos de 4 cm² = 16 cm²).
30. $L = 200 + 2\pi \cdot 36{,}5 \approx 429{,}3$ m. $A = 100 \cdot 73 + \pi \cdot 36{,}5^2 \approx 7.300 + 4.185 = 11.485$ m².
31. CG = 6 cm; GM = 3 cm.
32. Intersección de la circunferencia de centro A y radio 4 con la mediatriz de PQ: 0, 1

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

34. 3/4 de círculo de radio 5: $75\pi/4 \approx 58{,}9$ m², más 2 cuartos de círculo de radio 1 en las esquinas: $\pi/2 \approx 1{,}57$. Total ≈ 60,5 m².

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información