El ciclo celular: mitosis y meiosis

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir la estructura de los cromosomas y distinguir células diploides y haploides
- Explicar las etapas del ciclo celular y sus puntos de control
- Describir las fases de la mitosis y la citocinesis
- Explicar la meiosis y su papel en la variabilidad genética
- Comparar mitosis y meiosis
- Relacionar los fallos del ciclo celular y de la meiosis con el cáncer y las alteraciones cromosómicas

Para pensar

Una herida en la rodilla se cierra en pocos días con piel nueva idéntica. Pero tú no eres idéntico a tus hermanos. ¿Qué tipo de división celular explica cada cosa?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar


Explicación

1.1 Los cromosomas

El ADN de una célula eucariota no está en una sola pieza: está repartido en varias moléculas largas, cada una unida a proteínas llamadas **histonas**, que lo enrollan como hilo en un carrete. Mientras la célula no se divide, ese ADN está extendido en forma de **cromatina**. Cuando va a dividirse, la cromatina se enrolla y se compacta miles de veces y forma los cromosomas, bastoncillos que ya se ven al microscopio óptico.

Antes de la división, cada cromosoma se ha copiado, así que está formado por **dos cromátidas hermanas** idénticas unidas por un punto llamado **centrómero**. Esa es la típica forma de «X» de los dibujos. Los extremos de los cromosomas se llaman **telómeros** y funcionan como los capuchones de plástico de los cordones: protegen el ADN para que no se deshilache. Con cada división los telómeros se acortan un poco, y eso se relaciona con el envejecimiento celular.

Si se fotografían los cromosomas de una célula en división y se ordenan por parejas según su tamaño y forma, se obtiene el **cariotipo**. Sirve para detectar alteraciones en el número o la estructura de los cromosomas. El cariotipo humano tiene 22 parejas de **autosomas** y una pareja de **cromosomas sexuales**: XX en las mujeres y XY en los hombres.



1.2 Células diploides y haploides

Las células del cuerpo, llamadas **células somáticas** (piel, músculo, hígado...),

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

versiones distintas de cada gen (por ejemplo, un homólogo puede llevar la información para ojos azules y el otro para ojos marrones).

Una célula con dos juegos de cromosomas es diploide y se representa **2n**. En los humanos, 2n = 46. Los **gametos** (óvulos y espermatozoides) tienen un solo juego, uno de cada pareja: son haploides (**n**). En los humanos, n = 23. Es lógico: si los gametos tuvieran 46, el cigoto tendría 92, y el número se duplicaría en cada generación.

El número de cromosomas es fijo en cada especie, pero no indica complejidad: el chimpancé tiene 2n = 48, el perro 78, la mosca del vinagre 8, el arroz 24 y algunos helechos más de 1.000. No hay que confundir **homólogos** (dos cromosomas distintos, uno de cada progenitor) con **cromátidas hermanas** (las dos copias idénticas de un mismo cromosoma tras copiar el ADN).

Especie	2n	n
Ser humano	46	23
Chimpancé	48	24
Perro	78	39
Mosca	8	4
Guisante	14	7


1.3 La copia del ADN: la replicación

Antes de dividirse, la célula debe copiar todo su ADN para que cada hija reciba una copia completa. Este proceso se llama replicación y ocurre en la fase S del ciclo celular.

El ADN es una doble hélice formada por dos hebras unidas por sus bases, que se emparejan siempre igual: **A con T** y **G con C**. Para copiarlo, unas enzimas abren la doble hélice como una cremallera. Después, la enzima **ADN polimerasa** recorre cada hebra antigua y le coloca enfrente las bases complementarias, construyendo una hebra nueva. Al final hay dos moléculas de ADN idénticas, y cada una está formada por una hebra antigua y una nueva: por eso se dice que la replicación es **semiconservativa**. Esto lo demostraron Meselson y Stahl en 1958

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La ADN polimerasa es muy precisa y, además, revisa su trabajo: solo comete un error por cada mil millones de bases aproximadamente. Los errores que se escapan son **mutaciones**. La mayoría no tienen efecto, algunas son perjudiciales y unas pocas resultan ventajosas. En el tema del ADN estudiarás la molécula con más detalle.



2.1 El ciclo celular


El ciclo celular es la secuencia de etapas que vive una célula desde que nace por división hasta que se divide a su vez. Tiene dos grandes etapas.

La **interfase** ocupa más del 90 % del tiempo. No es un descanso: es cuando la célula crece y trabaja. Se divide en tres fases. En la **fase G1** la célula crece, fabrica proteínas y orgánulos y realiza su función. En la **fase S** (síntesis) replica su ADN: al acabar, cada cromosoma tiene dos cromátidas. En la **fase G2** sigue creciendo y prepara las estructuras de la división.

La **fase M** es la división propiamente dicha. Incluye la **mitosis** (división del núcleo, también llamada cariocinesis) y la **citocinesis** (división del citoplasma).

La duración del ciclo depende del tipo de célula: unas 24 horas en una célula humana en cultivo, unas pocas horas en las del intestino, y algunas células, como la mayoría de las neuronas o las células del músculo cardíaco, salen del ciclo y no vuelven a dividirse nunca: se dice que están en **fase G0**. Por eso una lesión de la médula espinal o un infarto dejan daños permanentes, mientras que la piel o el hígado se regeneran bien.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.2 Los puntos de control y la muerte celular programada

Dividirse es arriesgado, así que el ciclo celular tiene puntos de control, como los controles de calidad de una fábrica. Unas proteínas comprueban que todo está en orden antes de dejar pasar a la siguiente fase:

• Al final de **G1**: ¿la célula ha crecido lo suficiente? ¿hay nutrientes? ¿hay señales del cuerpo que pidan una división? ¿está bien el ADN?
• Al final de **G2**: ¿se ha copiado todo el ADN y sin errores?
• En la **metafase**: ¿están todos los cromosomas bien enganchados al huso antes de separarlos?

Si se detecta un problema, el ciclo se detiene para reparar el daño. Uno de los guardianes más importantes es la proteína **p53**, apodada «el guardián del genoma»: frena el ciclo si el ADN está dañado.

Cuando el daño no se puede reparar, la célula se autodestruye de forma ordenada mediante la apoptosis o muerte celular programada. No es un fracaso, sino un mecanismo de seguridad: se eliminan células peligrosas sin dañar a las vecinas. La apoptosis también da forma al cuerpo durante el desarrollo: en el embrión, los dedos de las manos están unidos por una membrana, y son las células de esa membrana las que mueren para separarlos.




Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

2.3 Cuando el ciclo falla: el cáncer

El cáncer es un conjunto de enfermedades en las que algunas células se dividen sin control. Se origina cuando una célula acumula **mutaciones** en los genes que regulan el ciclo: los que actúan como acelerador (llamados **protooncogenes**) se quedan «pisados», y los que actúan como freno (**genes supresores de tumores**, como el de p53) dejan de funcionar. Hacen falta varias mutaciones, por eso el cáncer es más frecuente con la edad.

Las células que se dividen sin control forman un **tumor**. Si queda localizado y rodeado de una cápsula, es un **tumor benigno** (como muchos lunares o los miomas) y suele poder extirparse. Si sus células invaden los tejidos vecinos y viajan por la sangre o la linfa hasta otros órganos, donde forman nuevos tumores, es un tumor maligno o cáncer; esa propagación se llama **metástasis**.

Las mutaciones pueden aparecer por azar, pero muchos **agentes mutágenos** aumentan el riesgo: el tabaco (responsable de la mayoría de cánceres de pulmón), la radiación ultravioleta del sol, el alcohol, algunos virus (como el del papiloma humano, frente al que hay vacuna) y ciertas sustancias químicas. Los tratamientos (cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia) buscan eliminar o frenar las células que se dividen.



3.1 Las fases de la mitosis

La mitosis es la división del núcleo que reparte las dos cromátidas de cada cromosoma entre dos núcleos hijos. Es un proceso continuo, pero para estudiarlo se divide en cuatro fases.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

forma el **huso mitótico**, un conjunto de fibras de proteína (microtúbulos) que en las células animales parte de los centriolos situados en los polos.

Metafase. Las fibras del huso se enganchan al centrómero de cada cromosoma y los colocan alineados en el centro de la célula, formando la placa ecuatorial. Es el mejor momento para contar los cromosomas y hacer un cariotipo.

Anafase. Los centrómeros se separan y las fibras del huso se acortan: las cromátidas hermanas se separan y cada una viaja a un polo opuesto. Desde este momento cada cromátida es un cromosoma independiente.

Telofase. En cada polo se forma una nueva envoltura nuclear, reaparece el nucléolo y los cromosomas se descondensan. Hay dos núcleos con la misma información genética. Un truco para recordar el orden: **PRO-ME-te ANA TELO**. El resultado es que una célula 2n da dos células 2n idénticas.



resultado: 2 células idénticas (2n)

3.2 La citocinesis: dividir el citoplasma


La mitosis reparte el núcleo, pero la división no termina hasta que se separa el citoplasma: es la citocinesis, que suele empezar al final de la anafase o en la telofase. En ella se reparten también los orgánulos (mitocondrias, ribosomas, retículo) entre las dos células hijas.

En las **células animales** se forma en el ecuador un **anillo contráctil** de proteínas (actina y miosina, las mismas del músculo) justo debajo de la membrana. El anillo se va cerrando como un cinturón que se aprieta y forma un surco cada vez más profundo, el **surco de división**, hasta que estrangula la célula en dos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

se fusionan y forman un tabique, el **fragmoplasto**, que crece del centro hacia fuera hasta llegar a la pared antigua: es la nueva pared que separa las dos células.

A veces hay mitosis sin citocinesis: se forman células con varios núcleos, como las fibras de nuestros músculos esqueléticos.



3.3 Para qué sirve la mitosis

La mitosis garantiza que las células hijas sean genéticamente idénticas a la madre. Eso la hace imprescindible en varios procesos.

Desarrollo y crecimiento. Del cigoto unicelular a un recién nacido hacen falta unos 40 ciclos de división; luego el cuerpo sigue creciendo hasta el final de la adolescencia, sobre todo en los cartílagos de crecimiento de los huesos largos.

Renovación y reparación. Las células que se desgastan se sustituyen: la piel, el revestimiento del intestino, las células de la sangre. Cuando te haces una herida, las células de los bordes se dividen para cerrarla. Algunos animales llevan esta capacidad al extremo: la salamandra regenera una pata entera y la planaria, un gusano plano, puede formar un individuo completo a partir de un trozo.

Reproducción asexual. En los seres unicelulares eucariotas, como las amebas o las levaduras, la mitosis es directamente reproducción. Muchas plantas se reproducen por esquejes, tubérculos o estolones gracias a ella, y los descendientes son clones de la planta madre.

En los adultos hay **células madre** que conservan la capacidad de dividirse y

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información


4.1 La meiosis

La meiosis es un tipo especial de división que solo ocurre en las células que forman los gametos, dentro de las gónadas. Su objetivo es **reducir a la mitad** el número de cromosomas: de una célula diploide (2n) salen cuatro células haploides (n). Para ello hay una sola replicación del ADN (en la interfase previa) seguida de **dos divisiones** consecutivas.

Meiosis I (división reduccional). En la profase I, los cromosomas homólogos se buscan y se emparejan a lo largo de toda su longitud; cada pareja tiene cuatro cromátidas y se llama **bivalente** o tétrada. Mientras están unidos, intercambian fragmentos (sobrecruzamiento). En la metafase I las parejas se colocan en el ecuador, y en la anafase I se separan los homólogos, no las cromátidas: cada polo recibe un cromosoma de cada pareja. Al final hay dos células con n cromosomas, cada uno aún con dos cromátidas.

Meiosis II (división ecuacional). Es parecida a una mitosis, pero sin copiar antes el ADN: en la anafase II **se separan las cromátidas hermanas**. El resultado son cuatro células haploides.

En la **fecundación**, un óvulo (n = 23) y un espermatozoide (n = 23) se unen y forman el **cigoto** (2n = 46), que recupera el número propio de la especie. Meiosis y fecundación son, por tanto, las dos caras de la reproducción sexual.



4.2 Meiosis y variabilidad genética


La meiosis no solo reduce el número de cromosomas: también baraja la información genética, de modo que cada gameto es único. Hay dos mecanismos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

puntos de cruce se llaman quiasmas. Así se forman cromosomas «mezclados» con trozos del abuelo y de la abuela, combinaciones que no existían antes.

La **segregación al azar de los homólogos** ocurre en la metafase I: cada pareja se coloca en el ecuador con una orientación al azar, independiente de las demás. En los humanos, solo por este mecanismo, una persona puede formar 2^{23}, es decir, **más de 8 millones de combinaciones** diferentes de cromosomas en sus gametos. Si se suma el sobrecruzamiento, las combinaciones son prácticamente infinitas.

A esto se añade la **fecundación**: cualquier óvulo puede unirse con cualquier espermatozoide. Por eso dos hermanos (salvo los gemelos idénticos, que proceden del mismo cigoto) nunca son genéticamente iguales. Esta variabilidad es la materia prima de la evolución: en una población variada es más probable que algunos individuos sobrevivan si cambia el ambiente o aparece una enfermedad.



sobrecruzamiento: nuevas combinaciones

4.3 Mitosis frente a meiosis

Las dos divisiones reparten el material genético, pero tienen objetivos muy distintos: la mitosis hace **copias idénticas** para crecer y reparar; la meiosis hace **gametos distintos** para la reproducción sexual.

	Mitosis	Meiosis
Dónde	células somáticas	gónadas (células que forman gametos)
Divisiones	1	2 seguidas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

	Mitosis	Meiosis
Información	idéntica a la madre	distinta en cada célula
Homólogos	no se emparejan	se emparejan y sobrecruzan
Función	crecer, reparar, reproducción asexual	formar gametos, variabilidad

Una forma de recordarlo: en la mitosis cada célula hija recibe **una cromátida de cada cromosoma**; en la meiosis I cada célula recibe **un cromosoma de cada pareja**. La meiosis II, en cambio, se parece mucho a una mitosis. Ojo con una confusión frecuente: el número de cromosomas se reduce a la mitad en la meiosis I, no en la II.



4.4 La formación de los gametos


La formación de gametos o **gametogénesis** ocurre por meiosis en las gónadas, y es distinta en cada sexo.

En los **testículos** se produce la espermatogénesis. Comienza en la pubertad y continúa durante toda la vida: se forman unos 100 millones de espermatozoides al día. Cada célula madre (espermatocito) da, tras la meiosis, **cuatro espermatozoides** iguales en tamaño, pequeños, con una cabeza que lleva el núcleo, una pieza intermedia llena de mitocondrias y un flagelo para nadar.

En los **ovarios** se produce la ovogénesis. Empieza antes del nacimiento, pero la meiosis se detiene y solo se reanuda a partir de la pubertad, en general un óvulo al mes. El citoplasma se reparte de forma muy desigual: de cada célula madre sale **un solo óvulo** grande, con muchas reservas para alimentar al embrión en sus

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Las plantas también forman gametos, en los granos de polen (gametos masculinos) y en los óvulos de la flor. En ellas la meiosis forma esporas que, después, originan los gametos por mitosis.




4.5 Errores en la meiosis: alteraciones cromosómicas

A veces, durante la meiosis, una pareja de homólogos (en la anafase I) o dos cromátidas hermanas (en la anafase II) **no se separan** y viajan juntas al mismo polo. Este error se llama no disyunción. El resultado son gametos con un cromosoma de más (n + 1) o de menos (n – 1). Si uno de ellos participa en la fecundación, el cigoto tendrá 47 o 45 cromosomas: es una **aneuploidía**.

La más conocida es el síndrome de Down o **trisomía 21**: las personas tienen tres copias del cromosoma 21 (47 cromosomas en total). Produce discapacidad intelectual de grado variable, rasgos físicos característicos y a veces problemas de corazón. La probabilidad de no disyunción aumenta con la edad de la madre, porque sus óvulos llevan muchos años con la meiosis detenida.

Otras alteraciones afectan a los cromosomas sexuales: el **síndrome de Turner** (45, X0: mujeres de baja estatura y generalmente estériles) o el **síndrome de Klinefelter** (47, XXY: hombres altos con fertilidad reducida). La mayoría de aneuploidías de los autosomas grandes no son viables y provocan abortos espontáneos tempranos. Estas alteraciones se detectan con el **cariotipo** o con análisis de ADN fetal en sangre materna durante el embarazo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Mitosis frente a meiosis

MITOSIS	MEIOSIS
1 división	**2 divisiones**
2 células hijas 2n	4 células hijas n
idénticas a la madre	todas distintas
sirve para: crecer y reparar tejidos	sirve para: formar gametos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué ocurre en la fase S de la interfase? ¿Por qué es imprescindible antes de dividirse?**

2. **Si 2n = 20 en el maíz, ¿cuántos cromosomas tiene un grano de polen (gameto)?**

3. **Ordena las fases: anafase, profase, telofase, metafase.**

4. **Indica dos procesos del cuerpo en los que sea importante la mitosis.**

5. **¿Qué es la metástasis?**

6. **Dibuja un cromosoma en metafase y señala las cromátidas hermanas, el centrómero y los telómeros.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Nombra las tres fases de la interfase y lo que ocurre en cada una.**

9. **¿Qué es el huso mitótico y para qué sirve?**

10. **¿Qué es la apoptosis? Pon un ejemplo de su utilidad.**

11. **¿Qué cromosomas sexuales tiene una mujer? ¿Y un hombre? ¿Cuántos autosomas tiene una persona?**

12. **Explica qué significa que la replicación del ADN es semiconservativa.**

13. **¿En qué se diferencia la citocinesis animal de la vegetal?**

14. **Explica dos mecanismos de la meiosis que generan variabilidad.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **¿Por qué los hermanos, salvo los gemelos idénticos, no son genéticamente iguales?**

16. **Completa la tabla mental: mitosis → … células, 2n → …; meiosis → … células, 2n → …**

17. **Indica tres hábitos que reducen el riesgo de cáncer.**

18. **Diferencia entre cromosomas homólogos y cromátidas hermanas.**

19. **Un gato tiene 2n = 38. Indica el número de cromosomas de: una célula de su piel, un espermatozoide, el cigoto, una célula hija tras la mitosis.**

20. **¿Por qué un infarto deja una cicatriz permanente en el corazón y una herida en la piel se regenera?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **¿Qué ocurre en la anafase I y en qué se diferencia de la anafase de la mitosis?**

23. **¿Por qué de la ovogénesis sale un solo óvulo y no cuatro?**

24. **Explica qué es la no disyunción y cómo produce el síndrome de Down.**

25. **Una especie tiene 2n = 10. ¿Cuántas combinaciones de cromosomas puede formar en sus gametos por segregación al azar? Explica por qué el número real es aún mayor.**

26. **Una célula tiene 4C de ADN y sus cromosomas tienen dos cromátidas. ¿En qué fases del ciclo puede estar? Justifica.**

27. **Las células cancerosas se dividen mucho más que las normales. Explica por qué la quimioterapia provoca caída del pelo y llagas en la boca.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **¿Qué ventaja evolutiva tiene la reproducción sexual, con meiosis, frente a la asexual, que solo usa mitosis?**

29. **Diseña el procedimiento para observar mitosis en raíces de cebolla y explica por qué se usan las puntas de la raíz.**

30. **El riesgo de trisomía 21 aumenta con la edad de la madre, pero mucho menos con la del padre. Propón una explicación basándote en la gametogénesis.**

31. **Una persona tiene cariotipo 47, XXY. ¿Qué gametos pudieron originarlo? Plantea dos posibilidades.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **¿Qué une a las dos cromátidas hermanas de un cromosoma?**
   - **A)** El telómero
   - **B)** El centrómero
   - **C)** El centriolo
   - **D)** El nucléolo
2. **Si 2n = 46, el número haploide es...**
   - **A)** 92
   - **B)** 46
   - **C)** 22
   - **D)** 23
3. **¿En qué fase del ciclo se replica el ADN?**
   - **A)** S
   - **B)** G1
   - **C)** G2
   - **D)** Metafase
4. **Las células que han salido del ciclo y no se dividen están en...**
   - **A)** G2
   - **B)** fase M
   - **C)** G0
   - **D)** profase
5. **La proteína p53 se conoce como...**
   - **A)** el motor del huso
   - **B)** la enzima de la replicación
   - **C)** el guardián del genoma
   - **D)** la hormona del crecimiento
6. **La muerte celular programada se llama...**
   - **A)** apoptosis
   - **B)** necrosis
   - **C)** metástasis

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) Metafase
B) Anafase
C) Telofase
D) Profase

8. **En la anafase de la mitosis...**

A) se forman los núcleos
B) se separan las cromátidas hermanas
C) se condensan los cromosomas
D) se duplica el ADN

9. **En las células vegetales, la citocinesis se produce por...**

A) un tabique que forma la nueva pared
B) un anillo que estrangula
C) meiosis
D) un flagelo

10. **La replicación del ADN es semiconservativa porque...**

A) solo se copia la mitad del ADN
B) se pierden la mitad de las bases
C) cada molécula nueva tiene una hebra vieja y una nueva
D) solo ocurre en la mitad de las células

11. **Un tumor que invade otros órganos es...**

A) benigno
B) maligno
C) un quiste
D) una mitosis normal

12. **¿Cuál de estos es un agente mutágeno?**

A) El agua
B) La vitamina C
C) El ejercicio
D) La radiación ultravioleta

13. **La meiosis produce...**

A) 2 células 2n

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) 4 células n

14. **¿En qué fase de la meiosis ocurre el sobrecruzamiento?**

    A) Metafase II

    B) Profase I

    C) Anafase II

    D) Telofase I

15. **En la anafase I se separan…**

    A) las cromátidas hermanas

    B) los centriolos

    C) los homólogos

    D) los núcleos

16. **¿Cuántas combinaciones de cromosomas puede formar una persona solo por segregación al azar?**

    A) 2^{23}, más de 8 millones

    B) 46

    C) 23^2

    D) 1

17. **De una célula madre de la espermatogénesis salen…**

    A) 1 espermatozoide

    B) 4 espermatozoides

    C) 2 espermatozoides

    D) 8 espermatozoides

18. **El síndrome de Down se debe a…**

    A) una trisomía del cromosoma 21

    B) la falta del cromosoma X

    C) una mutación en la p53

    D) un virus

19. **Las fibras musculares esqueléticas tienen varios núcleos porque…**

    A) hacen meiosis

    B) no tienen ADN

    C) son haploides

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) Cerrar una herida

B) Crecer en la adolescencia

C) Formar espermatozoides


D) Reproducir una planta por esqueje

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un cromosoma y qué son las cromátidas hermanas; Las fases del ciclo celular; Las cuatro fases de la mitosis con el truco PROMETe ANA TELO; Por qué la meiosis reduce a la mitad los cromosomas; Cómo genera variabilidad la meiosis.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Cromosoma	ADN compactado con proteínas que se hace visible durante la división.
Cromátidas hermanas	Las dos copias idénticas de un cromosoma unidas por el centrómero.
Centrómero	Punto donde se unen las cromátidas y se engancha el huso.
Telómero	Extremo protector de un cromosoma.
Cariotipo	Conjunto de cromosomas de una célula ordenados por parejas.
Homólogos	Los dos cromosomas de una pareja, uno paterno y otro materno.
Diploide (2n)	Célula con dos juegos de cromosomas.
Haploide (n)	Célula con un solo juego de cromosomas, como los gametos.
Replicación	Copia del ADN antes de la división; es semiconservativa.
Interfase	Etapa del ciclo en la que la célula crece y replica su ADN (G1, S, G2).
Huso mitótico	Fibras de proteína que mueven los cromosomas durante

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Citocinesis	División del citoplasma.
Meiosis	Doble división que produce cuatro células haploides distintas.
Sobrecruzamiento	Intercambio de fragmentos entre homólogos en la meiosis I.
Apoptosis	Muerte celular programada.
Metástasis	Extensión de un cáncer a otros órganos.
Aneuploidía	Alteración con cromosomas de más o de menos, como una trisomía.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fases de la mitosis

Profase, metafase, anafase y telofase.

¿Qué ocurre en la anafase?

Las cromátidas hermanas se separan y van a polos opuestos.

Resultado de la mitosis

Dos células hijas diploides idénticas a la madre.

Resultado de la meiosis

Cuatro células hijas haploides genéticamente distintas.

Número de cromosomas humanos

46 (2n) en las células del cuerpo y 23 (n) en los gametos.

Diploide y haploide

2n: cromosomas en parejas (células del cuerpo). n: uno de cada pareja (gametos).

Citocinesis

División del citoplasma tras la mitosis.

Metástasis

Extensión de un cáncer a otros órganos.

Fases de la interfase

G1 (crece), S (replica el ADN) y G2 (se prepara para dividirse).

Apoptosis

Muerte celular programada: la célula se autodestruye de forma ordenada.

Sobrecruzamiento

Intercambio de fragmentos entre cromosomas homólogos en la profase I.

No disyunción

Fallo en la separación de cromosomas en la meiosis; origina trisomías como el síndrome de Down.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Es el estrechamiento central del cromosoma.
2. **D)** n es la mitad: un cromosoma de cada pareja.
3. **A)** S de síntesis.
4. **C)** Por ejemplo, la mayoría de las neuronas.
5. **C)** Frena el ciclo si el ADN está dañado.
6. **A)** Es una autodestrucción ordenada.
7. **D)** Al mismo tiempo se condensan los cromosomas.
8. **B)** Cada cromátida va a un polo.
9. **A)** La pared rígida impide el estrangulamiento.
10. **C)** Lo demostraron Meselson y Stahl.
11. **B)** La propagación se llama metástasis.
12. **D)** También el tabaco o algunos virus.
13. **D)** Cuatro células haploides.
14. **B)** Cuando los homólogos están emparejados.
15. **C)** Por eso se reduce el número de cromosomas.
16. **A)** Dos orientaciones posibles para cada una de las 23 parejas.
17. **B)** En la ovogénesis sale 1 óvulo.
18. **A)** Hay 47 cromosomas.
19. **D)** Se forman núcleos sin dividir el citoplasma.
20. **C)** Los gametos se forman por meiosis.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Se replica el ADN. Sin esa copia, las células hijas no recibirían la información genética completa.
2. n = 10.
3. Profase, metafase, anafase y telofase.
4. El crecimiento (por ejemplo, de los huesos en la adolescencia) y la reparación de tejidos (cicatrización de una herida).
5. La propagación de células cancerosas desde el tumor original a otros órganos a través de la sangre o la linfa.
6. Debe aparecer una «X» con dos brazos iguales (las cromátidas hermanas) unidos por un estrechamiento central (centrómero) y con los extremos marcados como telómeros.
7. Diploide (2n): tiene dos juegos de cromosomas, por parejas; ejemplo, una célula de la piel (46). Haploide (n): un solo juego; ejemplo, un óvulo o un espermatozoide (23).
8. G1: la célula crece y trabaja. S: se replica el ADN. G2: sigue creciendo y se prepara para dividirse.
9. Es un conjunto de fibras de proteína (microtúbulos) que se forma en la profase; se une a los centrómeros, coloca los cromosomas en el ecuador y separa las cromátidas hacia los polos.
10. Es la muerte celular programada, una autodestrucción ordenada de la célula. Ejemplos: elimina células con el ADN dañado; separa los dedos del embrión eliminando la membrana que los une.
11. Mujer: XX. Hombre: XY. Hay 22 parejas de autosomas, es decir, 44 autosomas.
12. Que cada una de las dos moléculas de ADN resultantes conserva una hebra de la molécula original y tiene una hebra nueva.
13. En la animal la célula se estrangula con un anillo de proteínas; en la vegetal se forma una pared nueva en el centro (fragmoplasto).
14. El sobrecruzamiento, que intercambia trozos entre cromosomas homólogos, y el reparto al azar de cada pareja de homólogos a una u otra célula hija.
15. Porque cada uno procede de un óvulo y un espermatozoide distintos, y la meiosis hace que cada gameto lleve una combinación diferente de genes.
16. Mitosis: 2 células, 2n → 2n. Meiosis: 4 células, 2n → n.
17. No fumar, protegerse del sol y llevar una alimentación sana con ejercicio físico (también evitar el alcohol).
18. Los homólogos son dos cromosomas distintos de una misma pareja, uno de origen paterno y otro materno; tienen los mismos genes pero pueden llevar versiones distintas. Las cromátidas hermanas son las dos copias idénticas de un mismo cromosoma, unidas por el centrómero tras la replicación.
19. Piel: 38. Espermatozoide: 19. Cigoto: 38. Célula hija tras mitosis: 38.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

21. El benigno está localizado y no invade otros tejidos; el maligno invade los tejidos vecinos y puede viajar por la sangre o la linfa a otros órganos y formar nuevos tumores: eso es la metástasis.
22. En la anafase I se separan los cromosomas homólogos de cada pareja (cada uno con sus dos cromátidas). En la anafase de la mitosis se separan las cromátidas hermanas de cada cromosoma.
23. Porque el citoplasma se reparte de forma desigual: casi todo va a una célula, que será el óvulo con reservas para el embrión, y las otras tres (corpúsculos polares) son pequeñas y degeneran.
24. Es el fallo en la separación de dos homólogos o dos cromátidas en la meiosis. Se forma un gameto con 24 cromosomas (dos copias del 21); si se une a un gameto normal de 23, el cigoto tiene 47 cromosomas, con tres cromosomas 21: trisomía 21 o síndrome de Down.
25. n = 5, combinaciones = 2^5 = 32. El número real es mucho mayor porque el sobrecruzamiento intercambia fragmentos entre homólogos y crea cromosomas nuevos, combinados.
26. En G2, en la profase o en la metafase de la mitosis (o en la meiosis I hasta la anafase I): el ADN ya se ha replicado en la fase S y las cromátidas aún no se han separado.
27. Muchos fármacos de quimioterapia atacan a las células que se dividen rápido (por ejemplo, impidiendo formar el huso o copiar el ADN). También afectan a las células sanas que se dividen mucho, como las de los folículos del pelo y las del revestimiento de la boca y el intestino.
28. La sexual genera descendientes genéticamente variados, por lo que es más probable que algunos sobrevivan a cambios del ambiente, enfermedades o parásitos. La asexual es más rápida y no necesita pareja, pero produce clones: un cambio desfavorable puede afectar a todos por igual.
29. Poner una cebolla con la base en agua varios días; cortar 2-3 mm de las puntas de las raíces; teñir con orceína acética calentando suavemente; aplastar la muestra entre porta y cubre (squash) y observar a 400×. Se usan las puntas porque allí está el meristemo, tejido de crecimiento donde las células se dividen mucho.
30. Los óvulos empiezan la meiosis antes del nacimiento y la dejan detenida hasta la ovulación, muchos años después; con el tiempo, las estructuras que mantienen unidos y separan los cromosomas se deterioran y aumenta la no disyunción. Los espermatozoides se forman continuamente y su meiosis dura pocas semanas.
31. 1) Un óvulo XX (no disyunción en la madre) fecundado por un espermatozoide Y. 2) Un óvulo X fecundado por un espermatozoide XY (no disyunción en la meiosis I del padre).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información