# Primeros auxilios

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Aplicar la conducta PAS ante un accidente
- Hacer la valoración primaria y colocar en posición lateral de seguridad
- Conocer la RCP básica, el uso del desfibrilador y la maniobra de Heimlich
- Actuar ante heridas, hemorragias, quemaduras y golpes de calor
- Conocer el botiquín y cómo llamar al 112

## Para pensar

**Si alguien se desploma en la calle y no respira, ¿cuánto tiempo hay para empezar a ayudarle?**

## Explicación

### La conducta PAS

Ante cualquier accidente, tres pasos en orden:

- **Proteger**: que la zona sea segura para ti y para la víctima.
- **Avisar**: llamar al 112 y decir qué pasa y dónde.
- **Socorrer**: ayudar con lo que sabes, sin hacer más daño.





### Cómo llamar al 112

El 112 es el teléfono único de emergencias en toda la Unión Europea, gratuito y disponible aunque el móvil no tenga saldo. Al llamar, mantén la calma y explica: **dónde** estás (dirección, punto de referencia), **qué** ha pasado, **cuántas** personas están afectadas y en qué **estado** (¿responden?, ¿respiran?, ¿sangran?). Responde a lo que te pregunten y **no cuelgues** hasta que te lo indiquen: el operador puede guiarte en la reanimación. Si es posible, que otra persona llame mientras tú atiendes a la víctima.

undefined


### Valoración primaria

Comprueba primero si está **consciente**: háblale y tócale los hombros. Si no responde, pide ayuda, abre la vía aérea con la maniobra **frente-mentón** y comprueba si respira (ver, oír y sentir durante 10 s).




## Posición lateral de seguridad

Si está inconsciente pero **respira**, colócale de lado con la pierna de arriba flexionada y la cabeza ligeramente hacia atrás. Así, si vomita, no se ahoga. Vigila que siga respirando hasta que llegue la ayuda. No se usa si sospechas una lesión de columna.




## RCP y desfibrilador

Si **no respira**: llama al 112 y empieza la RCP. Talón de la mano en el **centro del pecho**, brazos rectos, compresiones de 5–6 cm a 100–120 por minuto (el ritmo de «Stayin' Alive»). Si sabes, alterna 30 compresiones y 2 insuflaciones. Si hay un **DEA** cerca, úsalo: te va diciendo qué hacer.



## Atragantamiento y lesiones comunes

Si alguien se atraganta y **no puede toser ni hablar**: 5 golpes en la espalda y, si no sale, la maniobra de Heimlich (compresiones bajo el esternón hacia dentro y arriba). Ante un esguince o golpe: reposo, **hielo** envuelto en un paño, compresión y elevación. Una hemorragia: presión directa con una gasa.




## Heridas, hemorragias y quemaduras

| Situación | Qué hacer | Qué NO hacer |
|---|---|---|
| Herida leve | lavarse las manos, limpiar con agua y jabón, desinfectar y tapar | usar algodón o alcohol directamente en la herida |
| Hemorragia | presionar fuerte con una gasa o tela limpia y elevar la zona | quitar la gasa empapada: se añade otra encima |
| Hemorragia nasal | inclinar la cabeza hacia delante y presionar la nariz 10 min | echar la cabeza hacia atrás |
| Quemadura | enfriar con agua a temperatura ambiente 10-20 min y cubrir | poner hielo, pasta de dientes o reventar ampollas |

undefined

## Golpe de calor y el botiquín

El golpe de calor aparece al hacer esfuerzo con mucho calor: piel muy caliente, mareo, dolor de cabeza, confusión. Hay que llevar a la persona a la sombra, aflojar la ropa, refrescarla con agua y, si está consciente, darle de beber poco a poco; si

empeora, llamar al 112. Un **botiquín** básico contiene guantes desechables, gasas estériles, vendas, esparadrapo, tiritas, suero fisiológico, antiséptico (clorhexidina o povidona yodada), tijeras de punta redonda, manta térmica y un listado de teléfonos de emergencia. Los medicamentos solo deben darse con indicación médica.

undefined

### Cadena de supervivencia

| | |
|---|---|
| **1. Reconocer y llamar** | ¿responde? ¿respira? → 112 |
| **2. RCP precoz** | compresiones en el centro del pecho, 100–120/min |
| **3. Desfibrilación** | usar el DEA en cuanto llegue |
| **4. Atención sanitaria** | la ambulancia toma el relevo |

## Ejercicios

1. **¿Qué significa la conducta PAS?**

2. **¿Qué información das al llamar al 112?**

3. **¿Cuál es el ritmo de las compresiones en la RCP?**

4. **¿Qué es un DEA?**

5. **¿Cuándo se usa la posición lateral de seguridad?**

6. **Explica la maniobra de Heimlich.**

7. **¿Cómo se trata una hemorragia nasal?**

8. **¿Cuánto tiempo hay que enfriar una quemadura?**

9. **Cita cinco elementos de un botiquín.**

10. **¿Qué harías ante un golpe de calor?**

## Practica

1. **¿Qué significa PAS?**
   - **A)** Parar, Ayudar, Salir
   - **B)** Proteger, Avisar, Socorrer
   - **C)** Pulso, Aire, Sangre
2. **¿A qué número se llama ante una emergencia en Europa?**
   - **A)** 091
   - **B)** 112
   - **C)** 061
3. **Si está inconsciente pero respira, se le coloca en...**
   - **A)** posición lateral de seguridad
   - **B)** sentado
   - **C)** boca arriba con las piernas dobladas
4. **¿A qué ritmo se hacen las compresiones de la RCP?**
   - **A)** 30–40 por minuto
   - **B)** 100–120 por minuto
   - **C)** 200 por minuto
5. **Ante un esguince de tobillo aplicamos...**
   - **A)** calor
   - **B)** hielo envuelto y elevación
   - **C)** masaje fuerte
6. **El 112 funciona...**
   - **A)** en toda la UE y sin saldo
   - **B)** solo en Madrid
   - **C)** solo con internet
7. **Si la gasa se empapa de sangre...**
   - **A)** se pone otra encima
   - **B)** se quita y se lava
   - **C)** se deja de presionar
8. **Para una quemadura se usa...**
   - **A)** agua del grifo

**B)** hielo

**C)** aceite

9. **Ante una hemorragia nasal, la cabeza va...**

**A)** hacia delante

**B)** hacia atrás

**C)** de lado

10. **Un antiséptico sirve para...**

**A)** desinfectar heridas

**B)** bajar la fiebre

**C)** enfriar quemaduras

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la conducta PAS; Cómo se hace la valoración primaria; Cuándo y cómo se hace la RCP; Qué hacer ante un atragantamiento.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**PAS**

Proteger, Avisar (112) y Socorrer.

**¿Inconsciente pero respira?**

Posición lateral de seguridad.

**¿No respira?**

112 y RCP: compresiones en el centro del pecho a 100–120/min.

**DEA**

Desfibrilador externo automático: da instrucciones por voz.

**Atragantamiento sin tos**

5 golpes en la espalda y maniobra de Heimlich.

**112**

Teléfono europeo de emergencias.

**Hemorragia**

Presión directa y elevar la zona.

**Golpe de calor**

Sombra, refrescar e hidratar; 112 si empeora.

## Soluciones

1. **B)** La conducta básica ante un accidente.
2. **B)** Es el número único europeo.
3. **A)** Evita que se ahogue.
4. **B)** Como la canción «Stayin' Alive».
5. **B)** Reduce la inflamación.
6. **A)** Gratuito.
7. **A)** Para no arrancar el coágulo.
8. **A)** 10-20 minutos.
9. **A)** Para no tragar sangre.
10. **A)** Clorhexidina, por ejemplo.

## Soluciones de los ejercicios

1. Proteger, Avisar y Socorrer.
2. Dónde estás, qué ha pasado, cuántas víctimas hay y en qué estado.
3. Entre 100 y 120 por minuto, hundiendo el pecho unos 5-6 cm.
4. Un desfibrilador externo automático, que analiza el ritmo del corazón y da una descarga si hace falta.
5. Cuando la víctima no responde pero respira con normalidad.
6. Desde detrás, con el puño entre el ombligo y el esternón, se hacen compresiones hacia dentro y hacia arriba para expulsar el objeto.
7. Cabeza hacia delante y presionar la nariz durante unos 10 minutos.
8. Entre 10 y 20 minutos con agua a temperatura ambiente.
9. Guantes, gasas estériles, vendas, suero fisiológico y antiséptico.
10. Llevar a la sombra, aflojar la ropa, refrescar, dar agua si está consciente y llamar al 112 si empeora.