Los números naturales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Leer, escribir y descomponer números naturales usando el valor de posición
- Comparar, ordenar y representar números naturales en la recta
- Aproximar números por redondeo y truncamiento y estimar resultados
- Sumar, restar, multiplicar y dividir con seguridad y conocer sus propiedades
- Aplicar la jerarquía de las operaciones en cálculos combinados
- Resolver problemas de la vida diaria siguiendo un método

Para pensar

Un estadio tiene 47 filas con 236 asientos cada una. ¿Caben los 10 000 aficionados de tu equipo?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 ¿Qué son los números naturales?

Los **números naturales** son los que usamos para **contar**: 0, 1, 2, 3, 4... El conjunto de todos ellos se representa con la letra $\mathbb{N}$. Hay quien empieza en el 1, pero en este curso incluimos el 0, que sirve para decir que no hay ningún objeto.

Los naturales tienen tres propiedades importantes. Tienen un **primer elemento**, el 0. Cada número tiene un **siguiente**, que se obtiene sumando 1: el siguiente de 99 es 100. Y **no hay un último**: por grande que sea un número, siempre puedes sumarle 1. Por eso decimos que hay infinitos naturales.

Usamos los naturales para contar (hay 28 alumnos), para ordenar (llegó el 3.º, aunque aquí se llaman ordinales) y para identificar cosas (el autobús 27 o el código postal 08001). En este último caso no tiene sentido operar con ellos: sumar dos códigos postales no da nada útil.




1.2 El sistema de numeración decimal

Nuestro sistema de numeración es **decimal** porque usa diez cifras (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) y porque **diez unidades de un orden forman una unidad del orden siguiente**: 10 unidades son 1 decena, 10 decenas son 1 centena, 10 centenas son 1 millar.

Además es **posicional**: el valor de una cifra depende del lugar que ocupa. En el número 3 333 las cuatro cifras son iguales, pero la primera vale 3 000, la segunda 300, la tercera 30 y la última 3. Cada lugar vale diez veces más que el de su derecha.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

imprescindible: indica que no hay unidades de millar. Sin él, 40 562 y 4 562 se confundirían.



1.3 Otros sistemas: los números romanos

No todos los sistemas son posicionales. Los romanos usaban siete letras con un valor fijo:

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1 000

Para leerlos se suman los valores (XVI = 10 + 5 + 1 = 16), pero si una letra menor va **delante** de una mayor, se resta: IV = 4, IX = 9, XL = 40, XC = 90, CD = 400, CM = 900. Una misma letra no se repite más de tres veces seguidas, y V, L y D no se repiten nunca. Una raya encima multiplica por mil.

Así, MMXXVI es 2026 y CDXLIV es 444. Hoy los vemos en relojes, en capítulos de libros, en los siglos (siglo XXI) y en los nombres de reyes y papas. Compararlos con nuestro sistema te ayuda a valorar lo práctico que es tener el cero y el valor de posición.

undefined

1.4 Leer y escribir números grandes

Para leer un número grande se separan las cifras en **grupos de tres** empezando por la derecha. Cada grupo forma una clase: unidades, millares (miles), millones y

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

En España se deja un pequeño **espacio** entre los grupos (7 305 040 218), aunque también verás puntos en algunos libros y periódicos. Nunca se usa la coma, que se reserva para los decimales. Los números de cuatro cifras pueden escribirse juntos: 2026.

¡Cuidado con el «billón»! En español, un billón es un millón de millones (1 000 000 000 000, un 1 con doce ceros). En inglés, *billion* son solo mil millones. Por eso, al traducir noticias de economía o de astronomía hay que tener mucho ojo para no equivocarse en mil veces.



1.5 Comparar y ordenar

Para comparar dos números naturales se usan los símbolos **<** (menor que) y **>** (mayor que). La punta siempre señala al menor: 85 < 112 y 2 001 > 1 999.

Si dos números tienen **distinta cantidad de cifras**, es mayor el que tiene más (sin contar ceros a la izquierda). Si tienen las **mismas cifras**, se comparan de izquierda a derecha hasta encontrar la primera diferente: en 45 372 y 45 327, las tres primeras coinciden, y en las decenas 7 > 2, así que 45 372 > 45 327.

Los números naturales se pueden colocar en una **recta numérica**: se marca el 0, se elige una unidad de longitud y se van poniendo los números a la misma distancia. En la recta, un número es mayor cuanto más a la derecha está. Ordenar de menor a mayor es ir leyendo de izquierda a derecha.

undefined

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Muchas veces no necesitamos un número exacto: «al concierto fueron unas 3 700 personas». **Aproximar** es sustituir un número por otro cercano y más sencillo. Hay dos formas.

Para **truncar** a un orden, se cambian por ceros todas las cifras de la derecha: 3 742 truncado a las centenas es 3 700. Para **redondear**, se mira la primera cifra que se elimina: si es 5 o mayor, se suma 1 a la cifra anterior; si es menor que 5, se deja igual. Así, 3 742 redondeado a las centenas es 3 700 (porque $4 < 5$) y 3 762 es 3 800 (porque $6 \geq 5$).

El redondeo da el número **más cercano**, como se ve en la recta. El **error** cometido es la diferencia entre el valor real y la aproximación: al redondear 3 742 a 3 700 el error es 42. Cuanto menor sea el orden al que redondeamos, más pequeño será el error.



1.7 Estimar antes de calcular

Estimar es calcular un resultado aproximado usando números redondeados. Es una herramienta muy poderosa para dos cosas: decidir rápido sin calculadora y **detectar errores**.

Por ejemplo, para saber si 10 € llegan para 3 libretas de 2,95 €, piensas: $3 \cdot 3 = 9$ € como mucho. Y si al multiplicar $48 \cdot 52$ la calculadora te da 24 960, algo va mal, porque $50 \cdot 50 = 2\,500$. ¡Has pulsado un cero de más!

Para estimar se redondea cada número a su primera cifra o a un número cómodo, y luego se opera mentalmente. En una suma larga de precios de la compra, redondear cada producto al euro más cercano da una idea muy buena del total. Acostúmbrate a estimar siempre antes de hacer la cuenta exacta: es lo que hacen

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.1 Sumar y restar

En la **suma**, los números que se suman son los **sumandos** y el resultado es la **suma** o total. La suma cumple la propiedad **conmutativa** (el orden no cambia el resultado: 7 + 5 = 5 + 7) y la **asociativa** (se pueden agrupar como queramos: (8 + 6) + 4 = 8 + (6 + 4)). Estas propiedades permiten buscar parejas que suman 10 o 100 para calcular mentalmente: 37 + 48 + 63 = (37 + 63) + 48 = 148.

En la **resta**, el **minuendo** menos el **sustraendo** da la **diferencia**. La resta **no** es conmutativa: 9 – 4 no es igual que 4 – 9 (con naturales, esta última ni siquiera se puede hacer). La resta es la operación **inversa** de la suma, y eso da una prueba: diferencia + sustraendo = minuendo. Si 532 – 178 = 354, comprueba: 354 + 178 = 532.




2.2 Multiplicar y sus propiedades

Multiplicar es una forma rápida de sumar varias veces el mismo número: 6 · 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24. Los números que se multiplican son los **factores** y el resultado, el **producto**. En matemáticas se escribe el punto «·» en lugar de la cruz para no confundirla con la letra x.

La multiplicación es **conmutativa** y **asociativa**, tiene **elemento neutro**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Leída al revés se llama **sacar factor común**: 8 · 27 + 8 · 73 = 8 · (27 + 73) = 8 · 100 = 800. En el tema de álgebra verás que esta propiedad es la base para trabajar con letras.




2.3 Dividir: exacta y entera

Dividir es **repartir en partes iguales** o averiguar cuántas veces cabe un número en otro. Sus términos son el **dividendo** (lo que se reparte), el **divisor** (entre cuántos), el **cociente** (lo que toca a cada uno) y el **resto** (lo que sobra).

Si el resto es 0, la división es **exacta**: 72 : 8 = 9. Si no, es **entera**: al repartir 347 cromos entre 8 amigos tocan 43 a cada uno y sobran 3. Siempre se cumple la **prueba de la división**: dividendo = divisor · cociente + resto, y el resto tiene que ser **menor que el divisor** (si no, todavía se podría repartir más).

Dos avisos: **no se puede dividir entre 0** (¿cómo vas a repartir algo entre cero personas?), y si multiplicas o divides dividendo y divisor por el mismo número, el cociente de una división exacta no cambia: 300 : 50 = 30 : 5 = 6.




Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

¿Cuánto vale $2 + 3 \cdot 4$? Si sumas primero salen 20, y si multiplicas primero, 14. Para que todo el mundo obtenga lo mismo, existe un orden acordado, la **jerarquía de las operaciones**:

1. Primero, lo que hay dentro de los **paréntesis** (si hay varios, empezando por los de dentro).
2. Después, las **potencias y raíces**.
3. Luego, **multiplicaciones y divisiones**, de izquierda a derecha.
4. Por último, **sumas y restas**, de izquierda a derecha.

Así, $2 + 3 \cdot 4 = 2 + 12 = 14$. Si queremos sumar primero, hay que escribir el paréntesis: $(2 + 3) \cdot 4 = 20$. Las calculadoras científicas respetan la jerarquía, pero algunas sencillas no: compruébalo con la tuya.

Un consejo: copia la expresión entera en cada paso y subraya la operación que vas a hacer. Así no se te olvida ningún número por el camino.



2.5 Operaciones combinadas paso a paso


Veamos un ejemplo completo: $20 - 3 \cdot (8 - 5) + 12 : 4$.

- Paréntesis: $8 - 5 = 3 \rightarrow 20 - 3 \cdot 3 + 12 : 4$.
- Multiplicaciones y divisiones: $3 \cdot 3 = 9$ y $12 : 4 = 3 \rightarrow 20 - 9 + 3$.
- Sumas y restas de izquierda a derecha: $20 - 9 = 11$ y $11 + 3 =$ **14**.

Fíjate en el último paso: con sumas y restas seguidas se va **de izquierda a derecha**. Si hicieras primero $9 + 3$, te saldría $20 - 12 = 8$, que está mal. Lo mismo pasa con multiplicaciones y divisiones: $24 : 4 \cdot 2 = 6 \cdot 2 = 12$, no $24 : 8 = 3$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

plantear problemas en los que hay que hacer varias cuentas a la vez, como calcular el gasto de una excursión.




2.6 Resolver problemas

Resolver un problema no es buscar números y hacer «la cuenta que toca». Un método que funciona muy bien, propuesto por el matemático George Pólya, tiene cuatro fases:

1. **Comprender**: lee despacio, subraya los datos y la pregunta. Haz un dibujo si ayuda.
2. **Planificar**: decide qué operaciones hay que hacer y en qué orden.
3. **Ejecutar**: calcula con cuidado, escribiendo cada paso.
4. **Comprobar**: ¿el resultado responde a la pregunta? ¿Es razonable? Escribe la solución con una frase y con unidades.

Ejemplo: «Una clase de 27 alumnos va de excursión. El autobús cuesta 324 € y la entrada, 6 € por persona. ¿Cuánto paga cada uno?». Plan: repartir el autobús y sumar la entrada. Cálculo: 324 : 27 = 12 € y 12 + 6 = 18 €. Comprobación: 18 · 27 = 486 = 324 + 162 ✓. Respuesta: cada alumno paga 18 €.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los números naturales en un vistazo

Sistema	decimal y posicional: 10 cifras, cada lugar vale 10 veces más
Aproximar	truncar (ceros) · redondear (mirar si la cifra es ≥ 5)
Operaciones	+ y · conmutativas · distributiva $a(b + c) = ab + ac$
División	$D = d \cdot c + r$, con $r < d$ · no se divide entre 0
Jerarquía	( ) → potencias → · : → + − (de izquierda a derecha)

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe con cifras: a) doscientos mil cuatrocientos ocho; b) tres millones cincuenta mil.**

2. **Escribe con letras: 1 080 015.**

3. **¿Cuánto vale la cifra 7 en 572 340 y en 3 007?**

4. **Descompón 60 409 según el valor de posición de sus cifras.**

5. **Ordena de menor a mayor: 10 101, 10 011, 11 001, 1 110.**

6. **Escribe en números romanos: 14, 49, 390, 2 026.**

7. **Escribe en nuestro sistema: XXIX, CDL, MCMLXXX.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Redondea 7 358 a las decenas, a las centenas y a los millares.**

9. **Trunca 92 786 a las centenas y a los millares.**

10. **Calcula: 4 + 6 · 2 y (4 + 6) · 2.**

11. **Haz la división 1 000 : 7 y escribe la prueba.**

12. **Indica la propiedad: a) 8 · 5 = 5 · 8; b) 3 · (10 + 2) = 30 + 6; c) 17 · 1 = 17.**

13. **Calcula: 30 − 4 · 5 + 18 : 3.**

14. **Calcula: 7 · (9 − 2 · 3) − 12 : (5 − 1).**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Calcula mentalmente con la distributiva: 9 · 23 y 12 · 15.**

17. **Saca factor común y calcula: 14 · 37 + 14 · 63.**

18. **Estima y después calcula: 398 · 21.**

19. **En una división el divisor es 15, el cociente 23 y el resto 9. ¿Cuál es el dividendo?**

20. **Un tren lleva 8 vagones con 64 asientos. Van 437 viajeros. ¿Cuántos asientos quedan libres?**

21. **Pones 2 400 € en una hucha y sacas 85 € al mes. ¿Cuántos meses completos puedes sacar dinero y cuánto queda?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **La población de una ciudad es 1 638 937. Redondéala a los millares y a los millones. ¿Cuál usarías en un titular?**

24. **Coloca paréntesis para que sea cierto: 3 + 5 · 4 − 2 = 30.**

25. **¿Cuántos números naturales de tres cifras hay? ¿Y de cuatro?**

26. **Halla el mayor número de 5 cifras distintas que puedes formar con 0, 3, 5, 7, 9, y el menor.**

27. **Un número redondeado a las centenas da 4 500. ¿Entre qué valores puede estar?**

28. **Una impresora hace 18 páginas por minuto. ¿Cuánto tarda en imprimir 25 copias de un trabajo de 42 páginas? Da el resultado en horas y minutos.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **En una división exacta el dividendo es 1 512 y el cociente 36. Si multiplicamos el divisor por 3, ¿cuál es el nuevo cociente?**

30. **Inventa un problema que se resuelva con la operación $5 \cdot 12 - 3 \cdot 8$ y resuélvelo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El primer número natural es…**

   A) 1
   B) 0
   C) –1
   D) no tiene

2. **¿Hay un número natural mayor que todos?**

   A) Sí, el billón
   B) Sí, el infinito
   C) No
   D) Depende

3. **En 48 215, la cifra 8 vale…**

   A) 8
   B) 800
   C) 8 000
   D) 80 000

4. **Un millón tiene… ceros**

   A) 5
   B) 6
   C) 9
   D) 12

5. **Un billón en español es…**

   A) mil millones
   B) un millón de millones
   C) cien millones
   D) mil billones

6. **XL en romanos vale…**

   A) 60
   B) 40
   C) 90

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 2016
B) 2026
C) 2024
D) 1026

8. **¿Cuál es mayor?**
   A) 90 999
   B) 100 000
   C) 99 990
   D) 9 999

9. **6 482 redondeado a las centenas:**
   A) 6 400
   B) 6 500
   C) 6 480
   D) 6 000

10. **6 482 truncado a las centenas:**
    A) 6 400
    B) 6 500
    C) 6 480
    D) 6 000

11. **Una buena estimación de 49 · 31 es…**
    A) 150
    B) 1 500
    C) 15 000
    D) 800

12. **La propiedad a · (b + c) = a · b + a · c es la…**
    A) conmutativa
    B) asociativa
    C) distributiva
    D) del neutro

13. **¿Qué operación NO es conmutativa?**
    A) suma

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) ninguna

14. **En 85 : 6, el resto es…**

A) 1

B) 4

C) 5

D) 7

15. **Dividendo = …**

A) divisor · cociente − resto

B) divisor · cociente + resto

C) cociente + resto

D) divisor + resto

16. **2 + 3 · 4 =**

A) 20

B) 14

C) 24

D) 9

17. **18 − 6 + 2 =**

A) 10

B) 14

C) 12

D) 22

18. **24 : 4 · 2 =**

A) 3

B) 12

C) 48

D) 6

19. **7 : 0 =**

A) 0

B) 7

C) 1

D) no se puede

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) calcular

C) comprobar


D) copiar

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué nuestro sistema se llama decimal y posicional; Cómo se redondea un número y para qué sirve estimar; Qué orden se sigue en las operaciones combinadas y por qué hace falta; Qué dice la prueba de la división.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Número natural	Número que sirve para contar: 0, 1, 2, 3...
Cifra	Cada uno de los diez símbolos 0, 1, 2... 9.
Sistema posicional	Sistema en el que el valor de una cifra depende de su lugar.
Valor de posición	Lo que vale una cifra según el lugar que ocupa.
Orden de unidades	Unidades, decenas, centenas, millares...
Truncar	Sustituir por ceros las cifras a partir de un orden.
Redondear	Aproximar al número más cercano del orden elegido.
Estimar	Calcular un resultado aproximado con números redondeados.
Factor	Cada número que se multiplica.
Dividendo	Número que se reparte en una división.
Resto	Lo que sobra en una división entera; es menor que el divisor.
Propiedad distributiva	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.
Jerarquía de las operaciones	Orden acordado para hacer las operaciones

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

ℕ

0, 1, 2, 3… (sin último)

Sistema decimal

10 cifras; 10 unidades forman una del orden siguiente

Valor de posición

La cifra vale según su lugar

IV, IX, XL, XC

4, 9, 40, 90

Billón

Un millón de millones (10^{12})

Redondear

Si la cifra eliminada es ≥ 5, se sube

Truncar

Cifras de la derecha → ceros

Distributiva

$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

Prueba de la división

$D = d \cdot c + r$

Resto

Siempre menor que el divisor

Jerarquía

( ) → potencias → · : → + −

Pólya

Comprender, planificar, hacer, comprobar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** En este curso incluimos el 0.
2. **C)** Siempre se puede sumar 1.
3. **C)** Está en las unidades de millar.
4. **B)** 1 000 000.
5. **B)** 10^{12}.
6. **B)** 50 − 10.
7. **B)** 2 000 + 20 + 6.
8. **B)** Es el que tiene más cifras.
9. **B)** 8 ≥ 5, se sube.
10. **A)** Se cambian por ceros.
11. **B)** 50 · 30.
12. **C)** Reparte el factor.
13. **C)** 9 − 4 ≠ 4 − 9.
14. **A)** 6 · 14 = 84.
15. **B)** Prueba de la división.
16. **B)** Primero el producto.
17. **B)** De izquierda a derecha.
18. **B)** De izquierda a derecha: 6 · 2.
19. **D)** No se divide entre 0.
20. **C)** Revisar si el resultado tiene sentido.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. a) 200 408. b) 3 050 000.
2. Un millón ochenta mil quince.
3. En 572 340 es la DM: 70 000. En 3 007 son 7 unidades: 7.
4. 6 DM + 4 C + 9 U = 60 000 + 400 + 9.
5. 1 110 < 10 011 < 10 101 < 11 001.
6. XIV; XLIX; CCCXC; MMXXVI.
7. 29; 450; 1 980.
8. Decenas: 7 360 (8 ≥ 5). Centenas: 7 400 (5 ≥ 5). Millares: 7 000 (3 < 5).
9. 92 700 y 92 000.
10. 4 + 12 = 16. 10 · 2 = 20. El paréntesis cambia el resultado.
11. Cociente 142, resto 6. Prueba: 7 · 142 + 6 = 994 + 6 = 1 000.
12. a) Conmutativa. b) Distributiva. c) Elemento neutro.
13. 30 − 20 + 6 = 16.
14. Paréntesis: 9 − 6 = 3 y 5 − 1 = 4. 7 · 3 − 12 : 4 = 21 − 3 = 18.
15. 8 − 6 = 2; 3 · 2 = 6; 15 + 6 = 21; $2^3 = 8$. 60 − 21 + 8 = 47.
16. 9 · 23 = 9 · 20 + 9 · 3 = 180 + 27 = 207. 12 · 15 = 12 · 10 + 12 · 5 = 120 + 60 = 180.
17. 14 · (37 + 63) = 14 · 100 = 1 400.
18. Estimación: 400 · 20 = 8 000. Exacto: 398 · 21 = 8 358.
19. D = 15 · 23 + 9 = 345 + 9 = 354.
20. 8 · 64 = 512 asientos. 512 − 437 = 75 libres.
21. 2 400 : 85 → cociente 28, resto 20. 28 meses completos y quedan 20 €.
22. 2 · 15 − 3 · 7 = 30 − 21 = 9.
23. 1 639 000 y 2 000 000. En un titular: «1,6 millones» o «1 639 000», que es más preciso.
24. (3 + 5) · 4 − 2 = 8 · 4 − 2 = 32 − 2 = 30 ✓. Sin paréntesis daría 3 + 20 − 2 = 21.
25. De 100 a 999: 999 − 100 + 1 = 900. De 1 000 a 9 999: 9 000.
26. Mayor: 97 530. Menor: 30 579 (el 0 no puede ir delante).
27. Entre 4 450 y 4 549, ambos incluidos.
28. 25 · 42 = 1 050 páginas. 1 050 : 18 = 58 min y sobran 6 páginas, que necesitan 1 minuto más: 59 min. Menos de 1 hora.
29. Divisor = 1 512 : 36 = 42. Nuevo divisor 126: 1 512 : 126 = 12 (un tercio de 36).
30. Ejemplo: «Compro 5 cajas de 12 rotuladores y regalo 3 paquetes de 8. ¿Cuántos me quedan?». 60 − 24 = 36 rotuladores.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información