# Funciones y gráficas

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Reconocer funciones y expresarlas con enunciados, tablas, fórmulas y gráficas
- Determinar el dominio, el recorrido y los puntos de corte con los ejes
- Estudiar continuidad, crecimiento, máximos y mínimos de una función a partir de su gráfica
- Calcular e interpretar la tasa de variación media
- Reconocer simetrías, periodicidad y tendencias
- Interpretar gráficas de situaciones reales de forma crítica

## Para pensar

**En una app de bicis ves la gráfica de tu ruta: altura frente a distancia. ¿Cómo sabes dónde está la cuesta más dura?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar


## Explicación

### 1.1 Qué es una función

Una **función** es una relación entre dos magnitudes que asigna a cada valor de la primera **un único valor** de la segunda. La primera magnitud es la **variable independiente** (x), y la segunda, la **variable dependiente** (y), porque su valor depende de x. Se escribe $y = f(x)$, que se lee «y es función de x».

Ejemplos: el precio de una compra es función del peso de fruta; la altura de una pelota es función del tiempo; el área de un cuadrado es función de su lado ($A = l^2$). En cambio, la relación «persona → número de teléfono» no es función si alguien tiene dos teléfonos, porque a un mismo valor le corresponderían dos.

Se puede imaginar una función como una máquina: entra x, la máquina aplica una regla y sale un único y. Si $f(x) = 2x + 1$, entonces $f(3) = 7$: decimos que 7 es la **imagen** de 3, y que 3 es la **antiimagen** de 7.




### 1.2 Formas de expresar una función


Una misma función se puede dar de cuatro maneras, y conviene saber pasar de una a otra:

- **Enunciado**: «un taxi cobra 3 € de bajada de bandera y 1 € por kilómetro».
- **Tabla de valores**: para x = 0, 1, 2, 3 km, y = 3, 4, 5, 6 €.
- **Fórmula** o expresión algebraica: $y = 3 + x$.
- **Gráfica**: los puntos (x, y) dibujados en unos ejes cartesianos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

obtenidos en un experimento. La gráfica muestra de un vistazo el comportamiento global: si crece, si tiene saltos, dónde está el máximo.

No todas las funciones tienen fórmula: la temperatura de una ciudad a lo largo del día es una función, pero solo se conoce midiéndola. Para dibujar una gráfica desde una fórmula, se hace primero una tabla con suficientes valores.




## 1.3 ¿Es una gráfica de una función?

Para que una gráfica represente una función, cada valor de x debe tener **como mucho una** imagen. Se comprueba con la **prueba de la recta vertical**: si alguna recta vertical corta a la gráfica en **más de un punto**, no es una función.

Una recta no vertical, una parábola o una curva que sube y baja como una montaña rusa son funciones. Una circunferencia no lo es: la vertical x = 0 la corta arriba y abajo. Tampoco una recta vertical, como x = 3, porque a x = 3 le corresponden infinitos valores de y.

Esta condición tiene sentido en la vida real: en un instante concreto, un coche solo puede estar en un lugar; por eso la gráfica «posición frente a tiempo» siempre es una función. En cambio, una misma posición puede repetirse en distintos instantes (el coche vuelve a casa), y eso sí está permitido.





Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El **dominio** de una función, Dom f, es el conjunto de valores de x que tienen imagen. El **recorrido** o imagen, Im f, es el conjunto de valores de y que toma la función. En una gráfica, el dominio se lee en el eje horizontal (la «sombra» de la gráfica sobre el eje X) y el recorrido en el eje vertical (su sombra sobre el eje Y).

En el dibujo, la función está definida de x = –2 a x = 5, así que Dom f = [–2, 5]; y toma valores de –1 a 4, así que Im f = [–1, 4]. Los intervalos se escriben con corchetes si el extremo está incluido y con paréntesis si no.

Si la función viene dada por una fórmula, el dominio son todos los números reales salvo los que hacen imposible el cálculo: por ejemplo, un denominador igual a 0 (en y = 1/(x – 2), x ≠ 2) o una raíz cuadrada de un número negativo (en y = √x, x ≥ 0). En los problemas reales, el contexto también limita el dominio: un tiempo o una longitud no pueden ser negativos.





## 1.5 Puntos de corte con los ejes

Los puntos donde la gráfica corta a los ejes dan información muy valiosa. El **corte con el eje Y** se obtiene haciendo x = 0: es el punto (0, f(0)). Una función tiene como mucho un corte con el eje Y, porque a x = 0 solo le corresponde una imagen.

Los **cortes con el eje X** se obtienen haciendo y = 0 y resolviendo la ecuación f(x) = 0. Sus soluciones se llaman **ceros** o raíces de la función. Puede haber varios, uno o ninguno.

Ejemplo: $y = x^2 - x - 2$. Con x = 0, y = –2: corta al eje Y en (0, –2). Con y = 0, $x^2 - x - 2 = 0$, que da x = 2 y x = –1: corta al eje X en (2, 0) y (–1, 0). Así se conecta lo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información





## 1.6 Continuidad

Una función es **continua** si su gráfica se puede dibujar **sin levantar el lápiz** del papel. Si hay algún salto, hueco o rotura, es **discontinua** en ese punto.

Muchas funciones reales son continuas: la temperatura cambia de forma gradual, igual que la altura de una persona o la distancia recorrida por un coche. Otras, en cambio, dan **saltos**: el precio de un aparcamiento que cobra 2 € la primera hora o fracción, 4 € hasta dos horas, etc.; la tarifa de envío de un paquete según su peso; o el número de alumnos de una clase a lo largo del curso.

En las gráficas con saltos se usa un convenio: un **punto relleno** indica que ese valor pertenece a la función y un **punto hueco**, que no. En el aparcamiento del dibujo, si aparcas exactamente 1 hora pagas 2 €, pero con 1 hora y 1 minuto ya pagas 4 €.





## 2.1 Crecimiento y decrecimiento

Una función es **creciente** en un intervalo si, al aumentar x, también aumenta y: la gráfica sube al leerla de izquierda a derecha. Es **decreciente** si, al aumentar x, y

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El crecimiento se expresa con intervalos del eje X. En el dibujo, la función crece en (−0,5; 2), decrece en (2, 6) y vuelve a crecer a partir de 6. Fíjate en que los intervalos se dan siempre con valores de **x**, nunca de y: es un error frecuente.

En una gráfica real, crecer y decrecer tienen significado: en una gráfica de temperatura, crecer es calentarse; en una de cuenta bancaria, ganar dinero; en la gráfica de la ruta en bici, subir. Y no solo importa si crece, sino cuánto: una subida suave no es lo mismo que una muy inclinada.





## 2.2 Máximos y mínimos

Una función tiene un **máximo relativo** en un punto si en él pasa de crecer a decrecer: es la «cima» de una colina de la gráfica. Tiene un **mínimo relativo** si pasa de decrecer a crecer: es el fondo de un «valle». En el dibujo anterior hay un máximo en (2, 4) y un mínimo en (6, 1).

El **máximo absoluto** es el mayor valor que alcanza la función en todo su dominio, y el **mínimo absoluto**, el menor. Un máximo relativo no tiene por qué ser absoluto: una montaña puede tener varias cimas, pero solo una es la más alta.

Los máximos y mínimos responden a preguntas prácticas: ¿a qué hora hizo más calor?, ¿en qué mes hubo menos ventas?, ¿cuál es la altura máxima de un balón lanzado?, ¿qué precio da el mayor beneficio? Se expresan dando el punto completo: «el máximo se alcanza en x = 2 y vale 4». En este dibujo, la función tiene dos cimas, pero solo la de la derecha es el máximo absoluto.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




## 2.3 Tasa de variación media


Para medir **cuánto** cambia una función en un intervalo [a, b] se usa la **tasa de variación media**:

$$TVM[a, b] = (f(b) - f(a)) / (b - a)$$

Indica cuánto cambia y, en promedio, por cada unidad que aumenta x. Si es positiva, la función crece en media en ese intervalo; si es negativa, decrece; cuanto mayor es su valor absoluto, más rápido es el cambio.

Ejemplo: un coche está a 40 km de casa a las 10:00 y a 220 km a las 12:00. TVM = (220 − 40)/(12 − 10) = 90 km/h: es su **velocidad media**. En la ruta en bici, la TVM de la altura entre los km 8 y 12 es (700 − 400)/4 = 75 m por km, la mayor de toda la ruta: ahí está la cuesta más dura.

Geométricamente, la TVM es la **pendiente** del segmento que une los puntos (a, f(a)) y (b, f(b)). En las funciones lineales del próximo tema, la TVM es la misma en cualquier intervalo.





Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Algunas funciones tienen gráficas simétricas, y saberlo ahorra la mitad del trabajo al dibujarlas. Una función es **par** si $f(-x) = f(x)$ para todo x: su gráfica es simétrica respecto del **eje Y**, como un reflejo en un espejo. Ejemplos: $y = x^2$, $y = x^4$, $y = |x|$.

Una función es **impar** si $f(-x) = -f(x)$: su gráfica es simétrica respecto del **origen**, es decir, no cambia al girarla 180° alrededor de (0, 0). Ejemplos: $y = x^3$, $y = 1/x$, $y = 2x$.

Para comprobarlo con la fórmula, se calcula $f(-x)$. Si $f(x) = x^2 + 1$, $f(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1 = f(x)$: es par. Si $f(x) = x^3 - x$, $f(-x) = -x^3 + x = -f(x)$: es impar. La mayoría de las funciones, como $y = x + 1$, no son ni pares ni impares.





## 2.5 Funciones periódicas

Una función es **periódica** si su gráfica se repite cada cierto intervalo de x, llamado **periodo**. Si el periodo es T, se cumple $f(x + T) = f(x)$ para todo x.

La naturaleza y la técnica están llenas de funciones periódicas: la altura de una cabina de una noria (periodo: el tiempo de una vuelta), la altura de la marea (unas 12 horas y 25 minutos), el latido del corazón en un electrocardiograma, las fases de la Luna (29,5 días) o la corriente alterna de los enchufes (1/50 de segundo).

Conocer el periodo permite predecir: si una noria tarda 4 minutos en dar una vuelta, a los 13 minutos la cabina estará en la misma posición que al minuto 1, porque $13 = 3 \cdot 4 + 1$. Las funciones trigonométricas que estudiarás en 4º son el modelo matemático de todos estos fenómenos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información





## 2.6 Tendencia de una función

Muchas veces interesa saber qué hace una función cuando x se hace muy grande. Esa es su **tendencia**. Un café recién servido a 85 °C en una habitación a 20 °C se enfría rápido al principio y cada vez más despacio: su temperatura **tiende** a 20 °C, sin bajar nunca de ahí. Se dice que la recta y = 20 es una **asíntota** de la gráfica.

Otras funciones tienden a crecer sin límite, como la población de bacterias, o a acercarse a 0, como la cantidad de un medicamento en la sangre horas después de tomarlo. Y algunas oscilan sin tender a ningún valor, como las periódicas.

Estudiar la tendencia permite hacer previsiones razonables: hasta dónde bajará la temperatura, cuándo se estabilizarán las ventas o qué ocurrirá con una epidemia si no se toman medidas. Pero hay que ser prudentes: extrapolar mucho más allá de los datos conocidos puede llevar a errores.





## 3.1 Interpretar gráficas de la vida real

Leer una gráfica es contar la historia que esconde. Antes de nada, mira **qué**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

En la gráfica de la ruta en bici, la altura sube suavemente los primeros 8 km, sube mucho entre el km 8 y el 12 (la cuesta más dura, con la mayor TVM), alcanza el punto más alto, de 700 m, en el km 12, baja hasta el km 20 y termina con un llano casi constante.

Cuidado con las **gráficas engañosas**: un eje vertical que no empieza en 0 puede exagerar mucho una pequeña subida, y unas escalas distintas pueden hacer que dos gráficas parezcan muy diferentes cuando no lo son. Mira siempre los números de los ejes antes de sacar conclusiones.





## 3.2 Un primer vistazo a las familias de funciones

Hay funciones que aparecen una y otra vez y forman «familias» con gráficas características. Las **funciones lineales y afines**, $y = mx + n$, tienen por gráfica una **recta** y describen cambios a ritmo constante; las estudiarás en el próximo tema.

Las **cuadráticas**, $y = ax^2 + bx + c$, tienen por gráfica una **parábola**: es la trayectoria de un balón lanzado o la forma de una antena parabólica. Las de **proporcionalidad inversa**, $y = k/x$, tienen por gráfica una **hipérbola**: es la relación entre la velocidad y el tiempo para recorrer una distancia fija. Las **exponenciales**, $y = a^x$, describen crecimientos que se multiplican, como el interés compuesto.

Reconocer la familia a la que pertenece una situación ayuda a elegir el modelo adecuado y a predecir su comportamiento. Es lo que hacen los científicos cuando ajustan una fórmula a los datos de un experimento.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




## Cómo estudiar una gráfica

| | |
|---|---|
| **Dominio y recorrido** | valores de x (eje X) y de y (eje Y) |
| **Cortes** | eje Y: x = 0 · eje X: resolver f(x) = 0 |
| **Monotonía y extremos** | crece, decrece · máximos y mínimos (intervalos de x) |
| **Otras** | continuidad · TVM · simetría · periodo · tendencia |

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Ejercicios

1. **¿Cuál es la variable independiente y cuál la dependiente? a) El precio de una llamada y su duración b) La altura de una planta y los días.**

2. **Para $f(x) = 3x - 2$, calcula $f(0)$, $f(4)$, $f(-1)$ y la antiimagen de 10.**

3. **Un kilo de naranjas cuesta 1,80 €. Haz una tabla para 0, 1, 2, 3 y 5 kg, escribe la fórmula y dibuja la gráfica.**

4. **¿Representa una circunferencia una función? Explícalo con la prueba de la vertical.**

5. **Halla los puntos de corte con los ejes de $y = -x + 4$.**

6. **Halla el dominio de $y = 1/x$ y de $y = x^2 + 1$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Pon un ejemplo de función continua y otro de discontinua de la vida real.**

9. **Calcula la TVM de $f(x) = 2x + 3$ en $[0, 2]$ y en $[5, 10]$.**

10. **Di si es par o impar: $y = x^2$, $y = x^3$, $y = x + 1$.**

11. **Las mareas tienen un periodo de unas 12,4 horas. Si hay marea alta a las 6:00, ¿cuándo será la siguiente?**

12. **Un coche recorre 150 km entre las 9:00 y las 10:30. ¿Cuál es su velocidad media?**

13. **Halla dominio y cortes con los ejes de $y = (x - 2)/(x + 3)$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Halla los cortes con los ejes de $y = x^2 - 4x + 3$.**

16. **Calcula la TVM de $f(x) = x^2 - 2x$ en $[0, 2]$, $[2, 4]$ e interpreta.**

17. **Estudia la simetría de $f(x) = 3x^4 - x^2 + 5$ y de $g(x) = x/(x^2 + 1)$.**

18. **Un aparcamiento cobra 1,50 € por hora o fracción, con un máximo de 12 € al día. Dibuja la función para 0 a 10 horas y di si es continua.**

19. **La temperatura de un día fue: 0 h: 8 °C; 6 h: 5 °C; 12 h: 15 °C; 15 h: 18 °C; 21 h: 11 °C. Describe la función y calcula la TVM entre 6 h y 15 h.**

20. **Dibuja una función con dominio $[0, 6]$, recorrido $[-2, 3]$, un máximo en $(2, 3)$ y un mínimo en $(5, -2)$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Un depósito tiene 500 L y pierde 20 L por hora. Escribe la función, su dominio con sentido y el corte con el eje X.**

23. **Una noria de 30 m de diámetro tarda 8 minutos por vuelta. Dibuja la altura de una cabina durante 24 minutos, empezando abajo (a 2 m del suelo).**

24. **Explica por qué un eje vertical que empieza en 95 puede hacer que una subida de 96 a 98 parezca enorme.**

25. **Halla el dominio de $y = \sqrt{(x - 1)/(x - 5)}$.**

26. **La altura de un balón es $h(t) = 20t - 5t^2$. Halla cuándo está en el suelo, la altura máxima (por simetría) y el dominio con sentido.**

27. **Para $f(x) = x^3$, calcula la TVM en [0, 1], [1, 2] y [2, 3]. ¿Qué observas?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Demuestra que la suma de dos funciones pares es par.**

29. **¿Puede una función impar definida en $x = 0$ no pasar por el origen? Razónalo.**

30. **Un móvil va de A a B (120 km) a 60 km/h, para 30 minutos y vuelve a 80 km/h. Dibuja la gráfica distancia a A-tiempo e indica dominio, recorrido y TVM de cada tramo.**

31. **La cantidad de un medicamento en sangre es $C(t) = 100 \cdot 0{,}8^t$ mg (t en horas). Calcula $C(0)$, $C(3)$, $C(10)$ y describe la tendencia.**

32. **Busca en un periódico o web una gráfica real, analízala (ejes, crecimiento, máximos, tendencia) y di si es engañosa.**

33. **Halla una función cuadrática que corte al eje X en $-2$ y $3$ y al eje Y en $-12$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Practica

1. **Una función asigna a cada x…**

   **A)** dos valores
   **B)** un único valor
   **C)** ningún valor
   **D)** cualquier número de valores

2. **En y = f(x), x es la variable…**

   **A)** dependiente
   **B)** independiente
   **C)** constante
   **D)** imagen

3. **Si $f(x) = x^2 + 1$, $f(-2)$ =**

   **A)** −3
   **B)** 5
   **C)** 3
   **D)** −5

4. **La prueba de la recta vertical sirve para…**

   **A)** calcular el dominio
   **B)** saber si una gráfica es función
   **C)** hallar máximos
   **D)** medir la TVM

5. **El dominio se lee en el eje…**

   **A)** X
   **B)** Y
   **C)** los dos
   **D)** ninguno

6. **Dominio de $y = 1/(x + 1)$:**

   **A)** $\mathbb{R}$
   **B)** $\mathbb{R} - \{1\}$
   **C)** $\mathbb{R} - \{-1\}$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**A)** $\mathbb{R}$

**B)** $x \geq 0$

**C)** $x > 0$

**D)** $x \leq 0$

8. **Corte con el eje Y de y = 3x − 5:**

**A)** (0, −5)

**B)** (5/3, 0)

**C)** (0, 3)

**D)** (−5, 0)

9. **Los ceros de una función son...**

**A)** los cortes con el eje Y

**B)** los cortes con el eje X

**C)** los máximos

**D)** los saltos

10. **Una función continua se dibuja...**

**A)** con saltos

**B)** sin levantar el lápiz

**C)** con puntos huecos

**D)** solo con rectas

11. **Un punto hueco en una gráfica indica que...**

**A)** pertenece a la función

**B)** no pertenece

**C)** es un máximo

**D)** es un corte

12. **Si al aumentar x disminuye y, la función es...**

**A)** creciente

**B)** decreciente

**C)** constante

**D)** periódica

13. **Un máximo relativo es un punto donde la función...**

**A)** pasa de crecer a decrecer

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**D)** es discontinua

14. **TVM de $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$:**

**A)** 4

**B)** 2

**C)** 1

**D)** 0

15. **Una TVM negativa indica que la función...**

**A)** crece en media

**B)** decrece en media

**C)** es constante

**D)** no existe

16. **$y = x^2$ es...**

**A)** par

**B)** impar

**C)** periódica

**D)** discontinua

17. **Una función impar es simétrica respecto...**

**A)** del eje X

**B)** del eje Y

**C)** del origen

**D)** de $y = x$

18. **La altura de una noria a lo largo del tiempo es...**

**A)** lineal

**B)** periódica

**C)** decreciente

**D)** discontinua

19. **La temperatura de un café que se enfría tiende...**

**A)** a 0 °C

**B)** a la temperatura ambiente

**C)** a crecer

**D)** a oscilar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**B)** los ejes y sus unidades

**C)** el título solo


**D)** el máximo

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una función y cómo se reconoce en una gráfica; Qué son el dominio y el recorrido; Cómo se describe el crecimiento y los extremos de una gráfica; Qué mide la tasa de variación media.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Función** | Relación que asigna a cada x un único valor y. |
| **Variable independiente** | La que se elige libremente (x). |
| **Variable dependiente** | La que depende de la otra (y). |
| **Imagen** | Valor f(x) que corresponde a x. |
| **Dominio** | Conjunto de valores de x que tienen imagen. |
| **Recorrido** | Conjunto de valores que toma y. |
| **Cero de una función** | Valor de x con f(x) = 0; corte con el eje X. |
| **Función continua** | Se dibuja sin levantar el lápiz. |
| **Función creciente** | Al aumentar x, aumenta y. |
| **Máximo relativo** | Punto donde la función pasa de crecer a decrecer. |
| **Mínimo relativo** | Punto donde la función pasa de decrecer a crecer. |
| **Tasa de variación media** | (f(b) – f(a))/(b – a): cambio medio por unidad. |
| **Función par** | f(–x) = f(x): simétrica respecto del eje Y. |
| **Función impar** | f(–x) = –f(x): simétrica respecto del origen. |
| **Función periódica** | Se repite cada cierto intervalo, el periodo. |
| **Asíntota** | Recta a la que se acerca la gráfica sin llegar a tocarla. |

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Función**

A cada x, un único y.

**Prueba vertical**

Más de un corte → no es función.

**Dominio**

Valores de x (eje X).

**Recorrido**

Valores de y (eje Y).

**Corte eje Y**

Hacer x = 0.

**Corte eje X**

Resolver f(x) = 0.

**Continua**

Sin levantar el lápiz.

**Creciente**

Sube de izquierda a derecha.

**Máximo relativo**

Pasa de crecer a decrecer.

**TVM**

(f(b) – f(a))/(b – a)

**Par / impar**

f(–x) = f(x) / f(–x) = –f(x)

**Periódica**

Se repite cada periodo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones

1. **B)** Definición de función.
2. **B)** Se elige libremente.
3. **B)** 4 + 1.
4. **B)** Cada vertical, como mucho un corte.
5. **A)** Valores de x.
6. **C)** $x + 1 \neq 0$.
7. **B)** Radicando no negativo.
8. **A)** $x = 0$.
9. **B)** $f(x) = 0$.
10. **B)** Sin roturas.
11. **B)** Convenio.
12. **B)** La gráfica baja.
13. **A)** Cima de una colina.
14. **B)** $(4 - 0)/2$.
15. **B)** $f(b) < f(a)$.
16. **A)** Simétrica respecto del eje Y.
17. **C)** $f(-x) = -f(x)$.
18. **B)** Se repite cada vuelta.
19. **B)** Asíntota horizontal.
20. **B)** Qué se representa y en qué escala.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones de los ejercicios

1. a) Independiente: duración; dependiente: precio. b) Independiente: días; dependiente: altura.
2. −2; 10; −5. $3x - 2 = 10 \rightarrow x = 4$.
3. 0; 1,80; 3,60; 5,40; 9,00. $y = 1{,}8x$. Puntos alineados que pasan por el origen.
4. No: hay verticales que la cortan en dos puntos (un x con dos imágenes).
5. Eje Y: (0, 4). Eje X: $-x + 4 = 0 \rightarrow (4, 0)$.
6. $\mathbb{R} - \{0\}$; $\mathbb{R}$.
7. Crece en (−3, 1), decrece en (1, 4); máximo relativo en (1, 5).
8. Continua: temperatura a lo largo del día. Discontinua: precio de un envío según el peso por tramos.
9. $(7 - 3)/2 = 2$; $(23 - 13)/5 = 2$. Es la misma: la función es lineal.
10. Par; impar; ninguna.
11. Hacia las 18:24.
12. TVM = 150/1,5 = 100 km/h.
13. Dom = $\mathbb{R} - \{-3\}$. Eje Y: (0, −2/3). Eje X: $x = 2 \rightarrow (2, 0)$.
14. $6 - 2x \geq 0 \rightarrow x \leq 3$. Dom = $(-\infty, 3]$.
15. Eje Y: (0, 3). $x^2 - 4x + 3 = 0 \rightarrow x = 1$ y 3: (1, 0) y (3, 0).
16. $(0 - 0)/2 = 0$; $(8 - 0)/2 = 4$. En [0, 2] baja y vuelve a subir (media 0); en [2, 4] crece.
17. $f(-x) = f(x)$: par. $g(-x) = -x/(x^2 + 1) = -g(x)$: impar.
18. Escalones de 1,50 en 1,50 hasta 12 € a partir de 8 h; discontinua en cada hora entera.
19. Decrece de 0 a 6 h (mínimo 5 °C), crece hasta las 15 h (máximo 18 °C) y luego decrece. TVM = 13/9 ≈ 1,44 °C/h.
20. Respuesta abierta: por ejemplo, empieza en (0, 0), sube a (2, 3), baja a (5, −2) y sube hasta (6, −1).
21. En cada instante solo hay una distancia; pero una misma distancia puede alcanzarse en varios instantes (ida y vuelta).
22. $V(t) = 500 - 20t$. Se vacía en t = 25 h. Dominio [0, 25].
23. Función periódica de periodo 8 min: mínimo 2 m en 0, 8, 16, 24 min y máximo 32 m en 4, 12, 20 min.
24. La diferencia (2) ocupa casi toda la altura del gráfico; con el eje desde 0, sería una subida pequeña (≈ 2 %).
25. $x - 1 \geq 0$ y $x \neq 5$: Dom = $[1, 5) \cup (5, +\infty)$.
26. $h = 0 \rightarrow t = 0$ y t = 4 s. Por simetría, el máximo está en t = 2: h = 20 m. Dominio [0, 4].
27. 1, 7, 19. Crece cada vez más deprisa.
28. Si $f(-x) = f(x)$ y $g(-x) = g(x)$, entonces $(f + g)(-x) = f(x) + g(x) = (f + g)(x)$.
29. No: $f(-0) = -f(0) \rightarrow f(0) = -f(0) \rightarrow f(0) = 0$.
30. Ida 2 h (TVM 60), parada 0,5 h (TVM 0), vuelta 1,5 h (TVM −80). Dom [0, 4], Im [0, 120].

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

33. $y = a(x + 2)(x - 3)$; en $x = 0$, $-6a = -12 \rightarrow a = 2$. $y = 2(x + 2)(x - 3) = 2x^2 - 2x - 12$.
34. No si es continua en un intervalo: entre dos cimas tiene que haber un valle (un mínimo relativo). Con discontinuidades sí podría.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información