# Genética humana

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Interpretar el cariotipo humano y explicar la determinación del sexo
- Distinguir caracteres mendelianos y poligénicos en la especie humana
- Resolver problemas de herencia ligada al sexo (daltonismo, hemofilia)
- Resolver problemas de grupos sanguíneos ABO y Rh y aplicarlos a las transfusiones
- Conocer enfermedades genéticas y alteraciones cromosómicas e interpretar árboles genealógicos
- Valorar el diagnóstico y el consejo genético y debatir sus implicaciones éticas

## Para pensar

**El daltonismo afecta a 1 de cada 12 hombres, pero solo a 1 de cada 200 mujeres. Si es un gen, ¿por qué no le toca a todos por igual?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

## Explicación

### 1.1 El cariotipo humano y la determinación del sexo

El cariotipo es el conjunto de cromosomas de una persona, fotografiados durante la división celular y ordenados por parejas según su tamaño y la posición del centrómero. Las células humanas tienen **46 cromosomas** en **23 parejas**: 22 parejas de **autosomas**, numeradas del 1 (el más grande) al 22, y una pareja de **cromosomas sexuales**, que en las mujeres es **XX** y en los hombres **XY**. El cromosoma X es mediano y tiene más de 800 genes; el Y es pequeño y tiene unos 70.

Esto explica la determinación del sexo. En la meiosis, todos los óvulos reciben un cromosoma X. Los espermatozoides, en cambio, son de dos tipos en igual proporción: la mitad lleva X y la mitad lleva Y. Si el óvulo es fecundado por un espermatozoide X, el cigoto será XX (niña); si lo fecunda uno Y, será XY (niño). Por tanto, **el sexo lo determina el espermatozoide**, y la probabilidad es del 50 % en cada embarazo.

En el cromosoma Y hay un gen clave, el **SRY**, que hacia la séptima semana del embarazo activa la formación de los testículos. No todos los animales determinan el sexo así: en las aves las hembras son ZW y los machos ZZ, y en muchas tortugas lo decide la temperatura de incubación de los huevos.




### 1.2 Cómo se estudia la herencia humana

Estudiar la genética de nuestra especie es más difícil que estudiar guisantes o

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

• Los árboles genealógicos: siguen un carácter a lo largo de varias generaciones de una familia para deducir cómo se hereda.
• Los **estudios de gemelos**: los gemelos idénticos (univitelinos) tienen el mismo ADN, y los mellizos (bivitelinos) comparten la mitad, como cualquier pareja de hermanos. Comparando lo que se parecen unos y otros se estima cuánto influyen los genes y cuánto el ambiente en un carácter.
• Los **estudios de poblaciones**: comparan la frecuencia de un rasgo o una enfermedad en distintos grupos humanos.
• El **análisis del ADN**: hoy se puede leer directamente el genoma de una persona y buscar las variantes de un gen.

Gracias a estos métodos se han identificado miles de genes relacionados con enfermedades. La base de datos internacional OMIM recoge más de 7.000 enfermedades de origen genético conocido, la mayoría poco frecuentes, que en conjunto afectan a alrededor de un 6 % de la población.




## 1.3 Caracteres mendelianos y poligénicos


Algunos caracteres humanos dependen de **un solo gen** con dos alelos y siguen las leyes de Mendel: se llaman caracteres mendelianos o monogénicos. Se suelen poner como ejemplo el lóbulo de la oreja suelto (dominante) o pegado, los hoyuelos en las mejillas, la capacidad de notar el sabor amargo de la feniltiocarbamida o el tipo de cerumen. Muchas enfermedades hereditarias también son monogénicas.

Sin embargo, la mayoría de nuestros rasgos son poligénicos: dependen de **muchos genes** a la vez, cada uno con un pequeño efecto que se suma a los

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

representas la altura de los alumnos de un instituto, obtienes una curva en forma de campana, con muchos valores intermedios y pocos extremos.

Además, muchos caracteres son **multifactoriales**: el ambiente influye mucho. La altura depende de la alimentación y la salud en la infancia (la altura media en España ha subido más de 10 cm en un siglo, sin que cambien los genes), y el riesgo de diabetes tipo 2 o de enfermedades del corazón depende de los genes, pero también de la dieta, el ejercicio y el tabaco.




## 2.1 La herencia ligada al sexo

Los cromosomas X e Y son muy distintos: el X tiene cientos de genes que no tienen pareja en el Y. Los caracteres determinados por genes del cromosoma X siguen una **herencia ligada al sexo**, distinta en hombres y mujeres.


Para escribirlos se pone el cromosoma con el alelo como superíndice: $X^D$ (alelo normal, dominante) y $X^d$ (alelo recesivo). Una **mujer** tiene dos cromosomas X, así que puede ser $X^DX^D$ (sana), $X^DX^d$ (portadora: sana, pero puede transmitir el alelo) o $X^dX^d$ (afectada). Un **hombre** tiene un solo X, de modo que **basta un alelo recesivo para que lo manifieste**: $X^DY$ (sano) o $X^dY$ (afectado). Se dice que el hombre es **hemicigoto** para esos genes.

Hay tres reglas útiles para resolver problemas:

1) Los **hijos varones reciben el X de su madre** y el Y de su padre; por eso un padre afectado nunca transmite la enfermedad a sus hijos varones.
2) Las **hijas reciben un X de cada progenitor**; todas las hijas de un padre

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

hombres: una mujer necesita heredar dos alelos recesivos, uno de cada progenitor.




## 2.2 Daltonismo y hemofilia

El daltonismo es la dificultad para distinguir algunos colores, sobre todo el rojo y el verde. Se debe a alelos recesivos de genes del cromosoma X que codifican los pigmentos de los conos de la retina. Afecta a un 8 % de los hombres y a menos de un 0,5 % de las mujeres. Se diagnostica con las láminas de Ishihara, círculos de puntos de colores con un número escondido. Toma su nombre del químico John Dalton, que lo describió en sí mismo en 1794.

La hemofilia es una enfermedad en la que la sangre no coagula bien porque falta un factor de coagulación (el VIII en la hemofilia A, el IX en la B). Las personas afectadas sufren hemorragias prolongadas y sangrados internos en las articulaciones. Es también recesiva y ligada al X, y afecta a unos 1 de cada 5.000 varones. Hoy se trata con inyecciones del factor que falta, fabricado por biotecnología, y los pacientes llevan una vida casi normal.

El caso más famoso es el de la **reina Victoria**, portadora ($X^HX^h$). Su hijo Leopoldo fue hemofílico ($X^hY$), y dos hijas portadoras extendieron el alelo a las casas reales de Rusia y España. Un ejemplo de cruce: madre portadora × padre sano → **1/2 de las hijas portadoras y 1/2 de los hijos afectados**.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

| | $X^H$ (madre) | $X^h$ (madre) |
|---|---|---|
| $X^H$ (padre) | $X^HX^H$ hija sana | $X^HX^h$ portadora |
| Y (padre) | $X^HY$ hijo sano | $X^hY$ hemofílico |

## 2.3 Herencia ligada al Y e influida por el sexo

El cromosoma Y tiene pocos genes, y los que tiene se transmiten solo de padres a hijos varones, generación tras generación, sin pasar nunca por las mujeres: es la **herencia holándrica**. Además del gen SRY, que determina el desarrollo masculino, hay genes relacionados con la formación de espermatozoides. Como el Y se hereda casi sin cambios por línea paterna, se usa para estudiar genealogías y migraciones humanas antiguas. Del mismo modo, el ADN de las **mitocondrias** se hereda solo de la madre, porque el espermatozoide no aporta mitocondrias al cigoto.

No hay que confundir la herencia ligada al sexo con la herencia influida por el sexo. En esta, el gen está en un **autosoma**, pero se expresa de forma distinta en hombres y mujeres por efecto de las hormonas. El ejemplo típico es la **calvicie común** (alopecia androgénica): el alelo de la calvicie se comporta como dominante en los hombres y como recesivo en las mujeres. Un hombre heterocigoto se quedará calvo, mientras que una mujer necesita dos copias, y aun así suele tener solo un aclarado del pelo.

También hay caracteres **limitados a un sexo**: los genes están en los dos sexos, pero solo se expresan en uno, como los relacionados con la producción de leche o con la barba.




Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## 3.1 Los grupos sanguíneos ABO

Los glóbulos rojos llevan en su membrana unas moléculas, los **antígenos**, que determinan el grupo sanguíneo. En el sistema ABO hay dos antígenos posibles, A y B, controlados por un gen con **tres alelos** (alelismo múltiple): $I^A$ (produce antígeno A), $I^B$ (produce antígeno B) e **i** (no produce ninguno).

$I^A$ e $I^B$ son codominantes: si están juntos, se expresan los dos (grupo AB). Ambos son **dominantes sobre i**. Por eso el grupo A puede ser $I^AI^A$ o $I^Ai$; el B, $I^BI^B$ o $I^Bi$; el AB solo $I^AI^B$; y el 0 solo ii.

Además, en el plasma tenemos de forma natural **anticuerpos** contra los antígenos que no tenemos: una persona de grupo A tiene anticuerpos anti-B; una de grupo B, anti-A; una de grupo 0, los dos; y una AB, ninguno. Si se mezcla sangre incompatible, los anticuerpos se unen a los glóbulos rojos y los aglutinan (forman grumos), lo que puede ser mortal.

En España, el grupo más frecuente es el A (alrededor del 45 %), seguido del 0 (alrededor del 42 %), el B (alrededor del 9 %) y el AB (alrededor del 4 %). Los grupos fueron descubiertos en 1901 por Karl Landsteiner, Nobel de Medicina en 1930.




## 3.2 El factor Rh y las transfusiones

Además del sistema ABO hay otro muy importante, el factor Rh. Las personas que tienen el antígeno D en sus glóbulos rojos son **Rh+**, y las que no lo tienen, **Rh−**. Simplificando, depende de un gen con un alelo dominante (D, Rh+) y uno

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Al combinar los dos sistemas se obtienen los ocho grupos: A+, A–, B+, B–, AB+, AB–, 0+ y 0–. En las transfusiones, lo esencial es que el donante no aporte antígenos que el receptor no tenga. Por eso la sangre **0–**, sin antígenos A, B ni D, se considera **donante universal** (se usa en urgencias cuando no da tiempo a analizar), y el **AB+**, que tiene los tres antígenos y no fabrica anticuerpos contra ellos, es **receptor universal**.

El factor Rh es importante en el embarazo. Si una madre Rh– espera un bebé Rh+ (que heredó D del padre), en el parto puede pasar algo de sangre del bebé a la madre y ella fabrica anticuerpos anti-Rh. En un segundo embarazo de un bebé Rh+, esos anticuerpos atacarían sus glóbulos rojos (**enfermedad hemolítica del recién nacido**). Hoy se evita con una inyección de anticuerpos anti-D a la madre.

| Grupo | Puede donar a | Recibe de |
|---|---|---|
| **0** | 0, A, B, AB | 0 |
| **A** | A, AB | A, 0 |
| **B** | B, AB | B, 0 |
| **AB** | AB | todos |

## 4.1 Enfermedades por mutaciones de un gen

Muchas enfermedades hereditarias se deben a una **mutación en un solo gen**. Según dónde esté el gen y cómo sea el alelo, se heredan de formas distintas:

• **Autosómicas recesivas**: solo se manifiestan en homocigotos (aa). Los padres suelen ser portadores sanos (Aa), y cada hijo tiene 1/4 de probabilidad de estar afectado. Son ejemplos la **fibrosis quística** (moco espeso en pulmones y páncreas; es la más frecuente en población europea, y 1 de cada 25 personas es portadora), la **anemia falciforme** (glóbulos rojos en forma de hoz) y la **fenilcetonuria** (no se puede degradar el aminoácido fenilalanina; se detecta con la prueba del talón al nacer y se trata con una dieta especial).
• **Autosómicas dominantes**: basta un alelo para padecerlas, y un progenitor afectado heterocigoto tiene 1/2 de probabilidad de transmitirla a cada hijo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Curiosamente, ser portador de la anemia falciforme protege en parte contra la malaria. Por eso este alelo es frecuente en zonas de África donde esa enfermedad es común.

| Herencia | Ejemplo |
|---|---|
| **Autosómica recesiva** | fibrosis quística |
| **Autosómica dominante** | Huntington |
| **Ligada al X** | hemofilia, daltonismo |
| **Cromosómica** | síndrome de Down |

## 4.2 Alteraciones en el número de cromosomas

Otras enfermedades no se deben a un gen, sino a **cromosomas de más o de menos**. Casi siempre se originan por una no disyunción en la meiosis: una pareja de cromosomas (o dos cromátidas) no se separa, y se forma un gameto con 24 o con 22 cromosomas. Si participa en la fecundación, el embrión tendrá 47 o 45 cromosomas. Normalmente **no se heredan** de los padres, que tienen cariotipos normales: son un accidente al formarse el óvulo o el espermatozoide.

• **Síndrome de Down** (trisomía 21, 47 cromosomas): la más frecuente, alrededor de 1 de cada 700 nacimientos. Produce discapacidad intelectual de grado variable, rasgos faciales característicos y, a veces, problemas cardíacos. Con apoyo educativo y médico, muchas personas con síndrome de Down estudian, trabajan y viven de forma autónoma. Su probabilidad aumenta con la edad de la madre.
• **Síndrome de Edwards** (trisomía 18) y **de Patau** (trisomía 13): mucho más graves; pocos bebés sobreviven al primer año.
• **Síndrome de Turner** (45, X0): mujeres de baja estatura, generalmente estériles.
• **Síndrome de Klinefelter** (47, XXY): hombres altos, con fertilidad reducida.

También hay alteraciones de la **estructura** de los cromosomas: la pérdida de un trozo del cromosoma 5 causa el síndrome del maullido de gato.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




## 4.3 Los árboles genealógicos


Un árbol genealógico o pedigrí muestra cómo se transmite un carácter en una familia a lo largo de varias generaciones. Tiene unos símbolos fijos: los **cuadrados** son hombres y los **círculos**, mujeres; los símbolos **rellenos** indican personas afectadas; una línea horizontal une a la pareja, y de ella baja una línea vertical hacia los hijos, ordenados de mayor a menor. Las generaciones se numeran con números romanos (I, II, III) y los individuos de cada una con números árabes.

Para deducir el tipo de herencia, busca estas pistas:

- Si **dos padres sanos tienen un hijo afectado**, el carácter es recesivo: los dos padres eran portadores.
- Si **dos padres afectados tienen un hijo sano**, el carácter es dominante: los dos padres eran heterocigotos.
- En un carácter dominante, todo afectado tiene al menos un progenitor afectado: el carácter no se salta generaciones.
- Si casi todos los afectados son varones y lo heredan de madres sanas, sospecha herencia **ligada al X**.

Después se escriben los genotipos de cada persona: primero los seguros (los recesivos son aa) y luego los que se deducen a partir de padres e hijos. Los árboles son la herramienta básica del consejo genético.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




## 4.4 Diagnóstico y consejo genético

Hoy se pueden detectar muchas enfermedades genéticas en distintos momentos de la vida:

• **Antes del embarazo**: análisis de portadores en parejas con antecedentes familiares. Con la fecundación in vitro se puede hacer un **diagnóstico genético preimplantacional**, analizando una célula de los embriones antes de implantarlos.
• **Durante el embarazo** (diagnóstico prenatal): ecografías, un análisis de sangre de la madre que detecta fragmentos de ADN fetal y, si hace falta, la **amniocentesis** (se extrae líquido amniótico con células del feto) o la biopsia de corion (placenta) para estudiar el cariotipo y genes concretos.
• **Al nacer**: la **prueba del talón**, que en España detecta una docena de enfermedades tratables, como la fenilcetonuria o el hipotiroidismo congénito.
• **En adultos**: análisis de genes de riesgo, como los BRCA1 y BRCA2, relacionados con el cáncer de mama y de ovario.

El consejo genético lo dan profesionales sanitarios especializados. Estudian el árbol genealógico y los análisis de una familia, calculan las probabilidades de transmitir una enfermedad y explican las opciones de forma clara y respetuosa, para que las personas tomen sus propias decisiones con información.





Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## 4.5 Genética, ética y sociedad

El conocimiento genético plantea preguntas que no son solo científicas, sino también éticas y legales.

• **Privacidad**: los datos genéticos son de los más personales que existen, y además revelan información de tus familiares. ¿Quién puede acceder a ellos? En la Unión Europea están especialmente protegidos, y en España la ley prohíbe discriminar por características genéticas.
• **Tests comerciales**: hay empresas que analizan tu ADN a partir de saliva para conocer tus antepasados o tus riesgos de salud. Sus resultados pueden ser poco fiables o difíciles de interpretar sin un profesional, y conviene leer bien qué hacen con los datos.
• **Derecho a no saber**: una persona puede preferir no conocer si tiene una enfermedad grave sin tratamiento, como la de Huntington.
• **Igualdad y diversidad**: a principios del siglo XX, la eugenesia pretendió «mejorar» la especie humana impidiendo tener hijos a ciertas personas; en varios países se esterilizó a miles de personas a la fuerza. Hoy se rechaza por completo, y se defiende la dignidad y los derechos de todas las personas, también de las que tienen una discapacidad.

Para debatir estos temas hay que separar los **hechos científicos** de las **opiniones y valores**, y escuchar a las personas afectadas.




Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Tipos de herencia en humanos

**Autosómica dominante**

basta un alelo
aparece en cada generación

ej.: acondroplasia

**Autosómica recesiva**

hacen falta dos alelos
puede saltar generaciones

ej.: fibrosis quística

**Ligada al X**

gen en el cromosoma X
más frecuente en hombres

ej.: daltonismo, hemofilia

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Ejercicios

1. **¿Cuántos autosomas y cuántos cromosomas sexuales tiene una célula humana?**

2. **¿Qué genotipos puede tener una persona del grupo B? ¿Y una del grupo O?**

3. **¿Por qué el daltonismo es más frecuente en hombres?**

4. **¿Qué es una trisomía? Pon un ejemplo.**

5. **¿Qué grupo sanguíneo es donante universal y cuál receptor universal?**

6. **Explica por qué la altura no sigue una herencia mendeliana sencilla.**

7. **Explica por qué el sexo del bebé lo determina el espermatozoide.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Escribe los genotipos posibles de una mujer y de un hombre para el daltonismo e indica su fenotipo.**

9. **¿Qué diferencia hay entre gemelos idénticos y mellizos? ¿Para qué sirven en genética?**

10. **Nombra dos enfermedades autosómicas recesivas, una autosómica dominante y una ligada al X.**

11. **¿Qué es la amniocentesis y para qué sirve?**

12. **Explica qué es un carácter poligénico y pon dos ejemplos.**

13. **Una madre AB y un padre O, ¿qué grupos pueden tener sus hijos?**

14. **Unos padres A y B tienen un hijo O. ¿Es posible? Explícalo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Un hombre hemofílico ($X^hY$) tiene hijos con una mujer sana no portadora ($X^HX^H$). ¿Cómo serán?**

16. **¿Puede un hombre daltónico tener un hijo varón daltónico con una mujer no portadora?**

17. **Una mujer daltónica tiene hijos con un hombre de visión normal. ¿Cómo serán sus hijos e hijas?**

18. **¿Puede una pareja de grupos A y B tener hijos de los cuatro grupos? Razónalo.**

19. **Una persona de grupo A+ necesita una transfusión urgente. ¿De qué grupos puede recibir sangre?**

20. **Dos padres afectados por una enfermedad tienen un hijo sano. ¿La enfermedad es dominante o recesiva? ¿Qué genotipo tienen los padres?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

21. **¿Por qué un hombre hemofílico no puede transmitir la hemofilia a sus hijos varones?**

22. **Una mujer de 40 años pregunta si el síndrome de Down se hereda. ¿Qué le explicarías?**

23. **La calvicie común es más frecuente en hombres, igual que el daltonismo. ¿Se heredan igual? Explica la diferencia.**

24. **Una mujer de visión normal, cuyo padre era daltónico, tiene hijos con un hombre de visión normal. Calcula la probabilidad de un hijo varón daltónico y de una hija daltónica.**

25. **Una pareja de grupos A Rh+ y B Rh+ tiene un hijo 0 Rh−. ¿Qué genotipo tienen los padres? ¿Qué probabilidad tienen de tener otro hijo 0 Rh−?**

26. **En un árbol genealógico, un carácter aparece en tres generaciones seguidas y todos los afectados tienen un progenitor afectado; hombres y mujeres se afectan por igual y un padre afectado tiene hijos varones**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

27. **La fibrosis quística afecta a 1 de cada 2.500 recién nacidos en Europa, y 1 de cada 25 personas es portadora. Si dos personas al azar tienen un hijo, comprueba esa frecuencia.**

28. **Explica, con un cruce, por qué una madre Rh– puede tener problemas en un segundo embarazo y cómo se previenen.**

29. **Una persona tiene cariotipo 47, XXY. Explica dos maneras en que pudo originarse.**

30. **¿Por qué el alelo de la anemia falciforme, perjudicial en homocigosis, es frecuente en algunas zonas de África?**

31. **Redacta tres argumentos, uno a favor y dos de precaución, sobre los tests genéticos comerciales que se compran por internet.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Practica

1. **¿Cuántos cromosomas tiene una célula humana del cuerpo?**

   **A)** 23
   **B)** 46
   **C)** 44
   **D)** 48

2. **Los cromosomas sexuales de un hombre son...**

   **A)** XX
   **B)** YY
   **C)** X0
   **D)** XY

3. **¿Qué gen del cromosoma Y activa la formación de los testículos?**

   **A)** SRY
   **B)** BRCA1
   **C)** p53
   **D)** ABO

4. **La altura es un carácter...**

   **A)** de un solo gen
   **B)** ligado al Y
   **C)** poligénico y multifactorial
   **D)** codominante

5. **Una mujer $X^DX^d$ es...**

   **A)** daltónica
   **B)** hemofílica
   **C)** portadora de visión normal
   **D)** imposible

6. **Un hombre daltónico tiene genotipo...**

   **A)** $X^dY$
   **B)** $X^DY$
   **C)** $X^dX^d$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**A)** hemofílicas
**B)** sanas no portadoras
**C)** la mitad hemofílicas
**D)** todas portadoras

8. **Un carácter que pasa solo de padres a hijos varones está ligado al...**
   **A)** cromosoma X
   **B)** cromosoma Y
   **C)** cromosoma 21
   **D)** ADN mitocondrial

9. **El ADN mitocondrial se hereda...**
   **A)** de la madre
   **B)** del padre
   **C)** de los dos por igual
   **D)** de los abuelos paternos

10. **La calvicie común es un ejemplo de herencia...**
    **A)** ligada al X
    **B)** holándrica
    **C)** influida por el sexo
    **D)** mitocondrial

11. **Una persona de grupo AB tiene genotipo...**
    **A)** $I^Ai$
    **B)** $I^AI^B$
    **C)** ii
    **D)** $I^AI^A$

12. **Una persona de grupo 0 tiene en el plasma anticuerpos...**
    **A)** anti-A
    **B)** anti-B
    **C)** ninguno
    **D)** anti-A y anti-B

13. **El donante universal es...**
    **A)** AB+

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**D)** 0−

14. **Una persona Rh− tiene genotipo…**

**A)** DD

**B)** dd

**C)** Dd

**D)** DD o Dd

15. **Si dos padres sanos tienen un hijo afectado, el carácter es…**

**A)** dominante

**B)** codominante

**C)** recesivo

**D)** ligado al Y

16. **En un árbol genealógico, un círculo relleno representa…**

**A)** una mujer afectada

**B)** un hombre afectado

**C)** una mujer sana

**D)** un portador

17. **La fibrosis quística es una enfermedad…**

**A)** autosómica dominante

**B)** autosómica recesiva

**C)** ligada al X

**D)** cromosómica

18. **La enfermedad de Huntington es…**

**A)** autosómica dominante

**B)** recesiva ligada al X

**C)** una trisomía

**D)** mitocondrial

19. **El síndrome de Turner tiene cariotipo…**

**A)** 47, XXY

**B)** 47, +21

**C)** 46, XY

**D)** 45, X0

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**B)** a los adolescentes

**C)** al recién nacido


**D)** a los abuelos

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un cariotipo y cómo se determina el sexo; Por qué el daltonismo afecta más a los hombres; Cómo funcionan los alelos de los grupos sanguíneos; La diferencia entre mutación génica y cromosómica; Cómo se lee un árbol genealógico.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Cariotipo** | Conjunto de cromosomas de una persona ordenados por parejas. |
| **Autosoma** | Cromosoma que no es sexual; los humanos tenemos 22 parejas. |
| **Cromosomas sexuales** | Pareja que determina el sexo: XX en mujeres y XY en hombres. |
| **Carácter poligénico** | Rasgo que depende de muchos genes y varía de forma continua. |
| **Herencia ligada al sexo** | La de los genes del cromosoma X sin pareja en el Y. |
| **Portadora** | Mujer heterocigota ($X^DX^d$) que no manifiesta el carácter pero lo transmite. |
| **Hemicigoto** | Individuo con una sola copia de un gen, como el hombre para los genes del X. |
| **Herencia holándrica** | Transmisión de genes del cromosoma Y, de padre a hijo varón. |
| **Herencia influida por el sexo** | Gen autosómico que se expresa de forma distinta en cada sexo. |
| **Daltonismo** | Dificultad para distinguir colores; recesiva ligada |

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

| | |
|---|---|
| **Antígeno** | Molécula de la membrana del glóbulo rojo que define el grupo sanguíneo. |
| **Factor Rh** | Antígeno D; quien lo tiene es Rh+ y quien no, Rh–. |
| **Árbol genealógico** | Esquema de una familia que muestra cómo se hereda un carácter. |
| **No disyunción** | Fallo en la separación de cromosomas en la meiosis. |
| **Diagnóstico prenatal** | Pruebas durante el embarazo para detectar alteraciones del feto. |
| **Consejo genético** | Información profesional sobre riesgos hereditarios y opciones. |
| **Eugenesia** | Movimiento que pretendía «mejorar» la especie humana; hoy rechazado. |

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué son los autosomas?**

Los 22 pares de cromosomas que no determinan el sexo.

**Genotipos posibles del grupo A**

$I^AI^A$ e $I^Ai$.

**¿Qué es una mujer portadora?**

Una mujer sana que tiene un alelo recesivo en uno de sus X y puede transmitirlo.

**¿Qué es la codominancia?**

Cuando dos alelos distintos se expresan a la vez, como $I^A$ e $I^B$ en el grupo AB.

**¿Qué es una trisomía?**

Tener tres copias de un cromosoma en lugar de dos (ej.: trisomía 21).

**Mujer portadora**

Tiene un alelo recesivo ligado al X; no padece la enfermedad pero puede transmitirla.

**Alelos del sistema ABO**

$I^A$ e $I^B$ codominantes; los dos dominan sobre i.

**Trisomía 21**

Tres copias del cromosoma 21: síndrome de Down.

**Determinación del sexo**

Óvulo siempre X; espermatozoide X (niña) o Y (niño).

**Factor Rh**

Rh+ tiene el antígeno D (DD o Dd); Rh− no lo tiene (dd).

**Donante y receptor universal**

Donante: 0−. Receptor: AB+.

**Pista de un árbol**

Padres sanos con hijo afectado: recesivo. Padres afectados con hijo sano: dominante.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones

1. **B)** 22 parejas de autosomas y una de sexuales.
2. **D)** Las mujeres son XX.
3. **A)** Actúa hacia la séptima semana.
4. **C)** Muchos genes y ambiente.
5. **C)** El alelo normal domina.
6. **A)** Basta un alelo recesivo.
7. **D)** Reciben el $X^h$ del padre.
8. **B)** Herencia holándrica.
9. **A)** El espermatozoide no aporta mitocondrias.
10. **C)** Gen autosómico que se expresa distinto según las hormonas.
11. **B)** Codominancia.
12. **D)** Porque no tiene antígenos A ni B.
13. **D)** No tiene antígenos A, B ni D.
14. **B)** Rh– es recesivo.
15. **C)** Los padres eran portadores.
16. **A)** Círculos = mujeres; rellenos = afectados.
17. **B)** Los padres suelen ser portadores sanos.
18. **A)** Basta un alelo.
19. **D)** Le falta un cromosoma X.
20. **C)** Detecta enfermedades tratables como la fenilcetonuria.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones de los ejercicios

1. 44 autosomas (22 parejas) y 2 cromosomas sexuales (XX o XY).
2. B: $I^BI^B$ o $I^Bi$. O: solo ii.
3. Porque tienen un solo cromosoma X: basta un alelo recesivo para padecerlo, mientras que las mujeres necesitan dos.
4. Tener tres copias de un cromosoma en lugar de dos. Ejemplo: la trisomía 21 o síndrome de Down.
5. Donante universal: O–. Receptor universal: AB+.
6. Porque depende de muchos genes a la vez y de factores ambientales como la alimentación, el sueño o el deporte; por eso varía de forma continua.
7. Todos los óvulos llevan un cromosoma X; los espermatozoides pueden llevar X o Y. Si fecunda uno X, el cigoto es XX (niña); si fecunda uno Y, es XY (niño).
8. Mujer: $X^DX^D$ (visión normal), $X^DX^d$ (portadora, visión normal), $X^dX^d$ (daltónica). Hombre: $X^DY$ (visión normal), $X^dY$ (daltónico).
9. Los idénticos proceden de un mismo cigoto y tienen el mismo ADN; los mellizos proceden de dos óvulos fecundados por dos espermatozoides y comparten la mitad. Comparándolos se estima cuánto influyen los genes y cuánto el ambiente.
10. Recesivas: fibrosis quística y anemia falciforme (o fenilcetonuria). Dominante: enfermedad de Huntington (o acondroplasia). Ligada al X: hemofilia (o daltonismo).
11. Es la extracción de una pequeña cantidad de líquido amniótico, que contiene células del feto, para estudiar su cariotipo o sus genes durante el embarazo.
12. Es el que depende de muchos genes que suman su efecto y presenta variación continua. Ejemplos: la altura y el color de la piel.
13. $I^AI^B$ × ii → $I^Ai$ (A) o $I^Bi$ (B). Nunca AB ni O.
14. Sí, si los dos son heterocigotos ($I^Ai$ × $I^Bi$): cada uno aporta un alelo i.
15. Todas las hijas portadoras ($X^HX^h$) y todos los hijos sanos ($X^HY$).
16. No: el hijo varón recibe el X de la madre, que solo tiene alelos normales.
17. $X^dX^d$ × $X^DY$. Hijas: $X^DX^d$, todas portadoras de visión normal. Hijos: $X^dY$, todos daltónicos.
18. Sí, si los dos son heterocigotos: $I^Ai$ × $I^Bi$ → 1/4 $I^AI^B$ (AB), 1/4 $I^Ai$ (A), 1/4 $I^Bi$ (B) y 1/4 ii (0).
19. De A+, A–, 0+ y 0– (sangre sin antígeno B). Puede recibir Rh– o Rh+ porque es Rh+.
20. Dominante. Los dos padres son heterocigotos (Aa) y el hijo sano es aa: recibió un alelo recesivo de cada uno.
21. Porque a sus hijos varones les transmite el cromosoma Y, no el X. El X de los hijos varones viene de la madre.
22. Casi nunca se hereda: suele deberse a una no disyunción en la meiosis al formarse el óvulo o el espermatozoide. Su probabilidad aumenta con la edad de la madre, y hay pruebas prenatales para detectarlo.
23. No. El daltonismo está en el cromosoma X (herencia ligada al sexo). El gen de la calvicie

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. Ella es $X^DX^d$ y él $X^DY$. Hijos varones: 1/2 $X^DY$ y 1/2 $X^dY$. Hijas: 1/2 $X^DX^D$ y 1/2 $X^DX^d$, ninguna daltónica. P(hijo varón daltónico) = 1/2 entre los varones (1/4 del total); P(hija daltónica) = 0.
25. El hijo es ii dd, así que los padres son $I^Ai$ Dd y $I^Bi$ Dd. P(ii) = 1/4 y P(dd) = 1/4; P(0 Rh−) = 1/4 · 1/4 = 1/16.
26. Autosómica dominante: no se salta generaciones, afecta por igual a ambos sexos y pasa de padre a hijo varón (lo que descarta la herencia ligada al X).
27. P(ambos portadores) = 1/25 · 1/25 = 1/625. P(hijo afectado si ambos son portadores) = 1/4. Total: 1/625 · 1/4 = 1/2.500. Coincide.
28. Madre dd y padre DD o Dd: el bebé puede ser Dd (Rh+). En el primer parto pasan glóbulos rojos Rh+ a la madre, que fabrica anticuerpos anti-D. En un segundo bebé Rh+, esos anticuerpos atraviesan la placenta y destruyen sus glóbulos rojos. Se previene inyectando a la madre anticuerpos anti-D tras el parto, que eliminan los glóbulos del bebé antes de que ella genere memoria.
29. 1) No disyunción en la madre: óvulo XX fecundado por espermatozoide Y. 2) No disyunción en la meiosis I del padre: espermatozoide XY que fecunda un óvulo X.
30. Porque los heterocigotos (portadores) están protegidos en parte contra la malaria, frecuente en esas zonas. La selección natural favorece a los portadores y mantiene el alelo en la población.
31. A favor: pueden dar información sobre antepasados o riesgos y motivar hábitos saludables. Precaución: sus resultados pueden ser poco fiables o malinterpretarse sin consejo profesional; y los datos genéticos son sensibles, revelan información de familiares y podrían usarse sin control.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información